This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

MH
W51
A3


HARVARD
UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

Der Rosenfreund.

Das Recht der Uebersetzung bleibt vorbehalten.

Der Rosenfreund.

Vollständige Anleitung

zur Kultur der Rosen im freien Lande und im Topfe, zum Treiben der Rosen im Winter, sowie Beschreibung und Verwendung der schönsten neuen und alten Arten der systematisch geordneten Gattungen.

Von

Johannes Wesselhöft,

Kunst- und Handelsgärtner in Langensalza, früher Obergärtner der von Eichel'schen Gärten und Lehrer des Obstbaues am Schullehrer-Seminar zu Eisenach.

Mit einem Vorwort

von

H. Jäger,

Großherzogl. Sächs. Hofgärtner.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit 33 in den Text eingedruckten Abbildungen.

Weimar, 1873.

Bernhard Friedrich Voigt.

mh
126.5
W51
R3

Vorwort

zur ersten Auflage.

Vom Verfasser dieses Buches ersucht, ein Vorwort zu demselben zu schreiben, um dieses erste Kind seiner Feder in die Welt einzuführen, hatte ich ganz besonders Veranlassung, diesen Wunsch zu erfüllen, indem ich die Anregung zur Abfassung des „Rosenfreundes“ gegeben hatte. Schon wiederholt war ich aufgefordert worden, eine Anleitung zur Kultur und Verwendung der Rosen für Rosenfreunde zu schreiben, indem die vorhandenen Bücher, welche die Rosen speciell behandeln, sich zu sehr auf ausländische Autoritäten stützten, und einerseits zu viel gärtnerisches Wissen voraussetzten, anderseits zu vollständig für Dilettanten seien. Da nun dringende Berufsgeschäfte und die Ausführung älterer literarischer Pläne mich abhielten, selbst Hand ans Werk zu legen, so veranlaßte ich den Verfasser, der mir als praktischer Rosenzüchter vortheilhaft bekannt war, und dessen sorgfältige Arbeit mit der Feder ich durch seine Mitwirkung an dem Werke: „die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen ꝛc.“ schätzen gelernt hatte, zur Abfassung dieses Rosenbuches, mit der Zusicherung von Rath und That. Es macht mir besonderes Vergnügen, hier öffentlich aussprechen zu können, daß ich mich in dem Verfasser nicht getäuscht habe. Dieser „Rosenfreund“ enthält in gedrängter Kürze alles, was der Rosen-

freund und Ziergärtner zu wissen nöthig hat, und wird sich sicher bald viele Freunde erwerben. Man wird in dem Buche kaum etwas vermissen und eine sorgfältige, dabei gewissenhafte und bescheidene Benutzung der besten Quellen erkennen. Bei dem Kapitel über die Verwendung der Rosen hatte ich noch besonderen Einfluß, indem ich dem Verfasser eine eben im Manuskript fertig gewordene Arbeit über Rosenverwendung (bestimmt für ein jetzt unter der Presse befindliches Buch: „der immerblühende Garten") zur Benutzung überließ.

So wünsche ich denn diesem „Rosenfreunde" Glück auf den Weg und recht viele Freunde, damit die Freundschaft nicht einseitig bleibt.

Eisenach im April 1866.

H. Jäger.

In dem vorangehenden Vorwort meines geehrten Freundes, Herrn Hofgärtner Jäger, für dessen vielfache freundliche Unterstützung ich nicht unterlassen kann, hier meinen wärmsten Dank auszusprechen, wurde schon gesagt, welcher Veranlassung die vorliegende Schrift ihre Entstehung verdankt, wobei ich nur noch den Umstand hervorzuheben habe, daß seit fast einem Decennium nichts Vollständiges über Rosen wieder erschienen war und das Vorhandene, besonders hinsichtlich des bedeutenden Zuwachses von schönen neuen Sorten, der gegenwärtigen Zeit nicht mehr entsprechen will.

Mit diesem Buche beabsichtige ich vorzugsweise den Bedürfnissen der großen Anzahl der Rosenfreunde in allen Ständen und Verhältnissen Rechnung zu tragen, mögen ihnen nun, (zur Pflege der Rosen im freien Lande), große landschaftliche Gärten oder auch nur ein kleines symmetrisches Hausgärtchen, — oder (zur Pflege der Rosen in Töpfen) dazu geeignete Gewächshäuser, Pflanzenkästen, ja auch nur ein Platz am Fenster zur Verfügung stehen.

Für diejenigen, welche sich mit der Vermehrung der Rosen, sei es zum Vergnügen oder zum Erwerb, beschäftigen wollen, giebt der dritte Abschnitt — welcher alle Vermehrungsmethoden, die bei den Rosen in Anwendung gebracht werden, enthält, — hinlängliche Anleitung. Zu den verschiedenen Veredlungsmethoden, sowie auch schon im ersten Abschnitt für das Schneiden der Rosen, sind erläuternde Abbildungen gegeben worden.

In dem Abschnitte über das Treiben der Rosen im Winter habe ich ebenfalls alle vorkommenden Verhältnisse zu berücksichtigen gesucht.

Um dem Rosenfreunde die Auswahl aus den Tausenden von Rosensorten zu erleichtern, ist im letzten Abschnitte eine verhältnißmäßig geringe Anzahl, (und zwar nur die als schön bekannten neuen und alten Rosen), beschrieben, sowie mit näheren Angaben über ihre Eigenschaften und Verwendung versehen worden.

Das Register am Schlusse des Buches dient zur leichteren Auffindung der, zu den verschiedenen Gruppen gehörenden, beschriebenen Rosen.

Außer der Benutzung meiner eigenen vieljährigen, in den verschiedensten Gegenden gesammelten Erfahrungen über Rosenkultur, habe ich nicht versäumt, vor und während der Abfassung dieses Buches mit den berühmtesten Rosengärtnern zu korrespondiren. Auch hat mir der bekannte Rosengärtner, Herr E. Metz in Erfurt, privatim wichtige Mittheilungen gemacht und habe ich überhaupt unter sorgfältiger Prüfung dasjenige Gute benutzt, was über Rosen, theils in den vorhandenen Schriften von Döll, Topf und Otto, theils in Zeitschriften geschrieben worden ist, um dem Rosenfreunde eine möglichst zuverlässige Arbeit zu bieten.

Eisenach im April 1866.

J. Wesselhöft.

Vorwort

zur zweiten Auflage.

Die bei der Veröffentlichung der ersten Auflage gehegten Hoffnungen haben sich schnell verwirklicht: der „Rosenfreund“ hat sich in kurzer Zeit so viel Freunde erworben, daß die erste Auflage gänzlich vergriffen ist und ich vom Verleger die Aufforderung zur Bearbeitung einer neuen Auflage erhalten habe. So schwer mir auch dies in meiner jetzigen Stellung als Handelsgärtner geworden, welchem bekanntlich, besonders in den Frühjahrsmonaten, wegen überhäufter Berufsgeschäfte wenig Zeit zu schriftstellerischen Arbeiten übrig bleibt, so habe ich doch keineswegs unterlassen, die erste Auflage wiederholt auf das Sorgfältigste zu prüfen und das, was mir jetzt überflüssig erschien, zu streichen. Dafür habe ich aber in nicht geringem Maße verbessert und Zusätze gemacht, was besonders bei den Kultur- und Vermehrungsmethoden, sowie im sechsten Abschnitt „Beschreibung der schönsten neuen und alten Rosen“ der Fall ist. Diese Arbeit wurde mir in sofern erleichtert, als ich vom Erscheinen der ersten Auflage an, jede neue eigene und von andern Rosenzüchtern entnommene und geprüfte Erfahrung, sowie alle der Kultur werthen Sorten, sofort zu Papier gebracht, so daß es jetzt nur noch eines Ordnens des angesammelten Materials bedurfte. Daher hoffe ich, daß diese neue Auflage mit Recht als eine „vermehrte und verbesserte“ angesehen werden wird.

Auch darf ich nicht unerwähnt lassen, daß durch die Unterstützung meines hochverehrten Freundes, Herrn Schulrath Looff, bei der Durchsicht der Re-

visionsbogen, manche in der ersten Auflage stehen gebliebene Fehler beseitigt sind.

Möge hiermit diese zweite Auflage sich einer eben so günstigen und freundlichen Aufnahme als die erste zu erfreuen haben.

Langensalza zu Ende des Wonnemonats 1869.

J. Wesselhöft.

Vorwort

zur dritten Auflage.

In kurzen Zwischenräumen sind die beiden ersten Auflagen des Rosenfreundes vergriffen, und zum dritten Male seit kaum sieben Jahren bin ich veranlaßt worden, dem Werke den Wanderpaß zu schreiben. Die freundliche Aufnahme, welche meine Arbeit in den verschiedensten Kreisen gefunden hat, ist mir ein Sporn gewesen, die früheren Auflagen einer möglichst genauen Durchsicht zu unterwerfen, Ueberflüssiges zu streichen, Lückenhaftes auszufüllen, Fehlendes zu ergänzen, das Ganze überhaupt in einer Weise umzugestalten, daß es dem Zwecke und den Ergebnissen der Neuzeit mehr und mehr entspricht. Namentlich erschien es mir nothwendig den fünften Abschnitt „Feinde der Rosen“ nach den neuesten wissenschaftlichen Forschungen und Beobachtungen gänzlich umzuarbeiten, wobei ein lieber, gerade für diesen Gegenstand sich interessirender Freund — Herr Rektor Huth — wesentlich mich unterstützt hat. Ihm spreche ich hiermit meinen wärmsten Dank dafür aus. Den sechsten Abschnitt „Beschreibung der schönsten

neuen und alten Rosen ꝛc." habe ich ebenfalls vollständig umgestaltet, indem ich die Rosengattungen systematisch geordnet und nach ihren wesentlichen Merkmalen möglichst genau beschrieben habe. Möchte er beim Bestimmen einer Gattung einigermaßen als ein Führer und Rathgeber erfunden werden. Selbstredend sind auch wieder eine größere Anzahl werthvoller, in den letzten Jahren in den Handel gekommene Rosen mit aufgenommen worden.

Um das Buch, besonders hinsichtlich der französischen Rosennamen möglichst frei von Fehlern zu halten, hatte wieder Herr Schulrath Looff, sowie auch Herr Rektor Huth die außerordentliche Gefälligkeit, mit einem bedeutenden Aufwande von Zeit die Durchsicht der Revisionsbogen mit zu übernehmen. Beiden hochverehrten Herren spreche ich hiermit meinen innigsten Dank dafür aus.

Inwieweit diese dritte Auflage aber das praktische Bedürfniß berücksichtigt und an bescheidenem wissenschaftlichen Werthe gewonnen hat: dies überlasse ich dem nachsichtigen Urtheile der Rosenfreunde. Möge das Buch zu den alten Freunden sich neue erwerben.

Langensalza in Thüringen im Juni 1873.

J. Wesselhöft.

Inhalts-Verzeichniß.

Einleitung . . . . . Seite 1

Erster Abschnitt.

Kultur der Rosen im freien Lande.

Erstes Kapitel.

Standort und Boden, Bodenverbesserung.

§. 1. Wahl des Standortes S. 5. — §. 2. Die verschiedenen Bodenarten und deren Fähigmachung zur Rosenkultur S. 6. — §. 3. Dungstoffe S. 7. — §. 4. Geeignetste Zeit zur Bearbeitung und Verbesserung des Bodens S. 8. — §. 5. Möglichste Benutzung jeder Bodenart S. 8.

Zweites Kapitel.

Das Pflanzen der Rosen.

§. 6. Zeit des Pflanzens S. 9. — §. 7. Behandlung von auswärts bezogener Rosen vor der Pflanzung S. 9. — §. 8. Behandlung im Treibhaus veredelter Rosen, welche noch nicht an die freie Luft gewöhnt sind, vor der Pflanzung ins Freie S. 10. — §. 9. Verfahren beim Ausgraben und Pflanzen S. 11. — §. 10. Auspflanzen in Töpfen stehender Rosen S. 13. — §. 11. Verfahren bei Veranlassung, Rosen im Sommer zu verpflanzen S. 14.

Drittes Kapitel.

Das Schneiden der Rosen.

§. 12. Mannichfaltigkeit in der Ausführung des Schnittes und die geeignete Zeit dazu S. 14. — §. 13. Zweck des Schneidens S. 15. — §. 14. Regeln beim Schneiden S. 16. — §. 15. Sommerschnitt S. 16. — §. 16. Ausbrechen der Augen S. 17. — §. 17. Der Schnitt bei wurzelächten Rosen. Erziehung der Buschform S. 18. — §. 18. Erziehung der Säulen- und Pyramidenform S. 20. — §. 19. Kletterrosen S. 21. — §. 20. Das Schneiden veredelter Rosen S. 21. — §. 21. Die Kugelform S. 22. — §. 22. Die Pyramidenform S. 27. — §. 23. Trauerrosen S. 28.

Viertes Kapitel.

Das Niederhaken der Rosen §. 24. S. 29.

Fünftes Kapitel.

Sonstige Verrichtungen im Laufe des ganzen Jahres.

1) Bodenlockerung und Düngung §. 25. S. 30.
2) Das Reinigen von Schmarotzern und Insekten §. 26. S. 31.
3) Ausbrechen von Augen und Blüthenknospen, Anbinden der Zweige während der Blüthe, Sommerschnitt §. 27. S. 32.
4) Verjüngung der Rosen §. 28. S. 33. — §. 29. Untergrundsdüngung S. 34.

Sechstes Kapitel.

Der Winterschutz.

§. 30. Verfahren beim Decken der Rosen, welche sich zur Erde biegen lassen S. 34. — §. 31. Verfahren bei solchen Rosen, deren Standort oder zu große Empfindlichkeit es nicht erlaubt, sie im Freien stehen zu lassen S. 37. — §. 32. Verfahren beim Decken von Rosen, welche sich nicht zur Erde biegen lassen S. 37.

Siebentes Kapitel.

Verwendung der Rosen.

§. 33. Stammrosen oder Rosenbäumchen S. 39. — §. 34. Der Rosenbusch S. 40. §. 35. Säulen- und Pyramidenrosen S. 41. — §. 36. Kletterrosen S. 41. — §. 37. Rosenbeete und Rosengruppen S. 42. — §. 38. Noisette-, Bourbon-, Bengal-, Lawrence- und Theerosen S. 44. — §. 39. Roseneinfassungen S. 47. — §. 40. Rosenhecken S. 47. — §. 41. Rosengarten oder Rosarium S. 47.

Zweiter Abschnitt.

Kultur der Rosen in Töpfen.

Erstes Kapitel.

Die zur Topfkultur geeignete Erde und das Einpflanzen der Rosen in Töpfe.

§. 42. Verschiedene Erdmischungen S. 49. — §. 43. Der Erde beizumischende trockene Dungstoffe S. 50. — §. 44. Beschaffenheit der Töpfe, Abzugsmaterialien S. 50. — §. 45. Verfahren beim Herausnehmen der in Töpfe zu pflanzenden Rosen aus dem Lande S. 51. — §. 46. Verfahren beim Einpflanzen in Töpfe und Behandlung nach dem Einpflanzen S. 52. — §. 47. Einpflanzen der Rosen in Töpfe, während ihrer vollen Vegetation S. 54. — §. 48. Regeln für das Begießen S. 54. — §. 49. Düngerguß, Behandlung derjenigen Pflanzen, für welche der Düngerguß nachtheilig geworden ist S. 55. — §. 50. Das Bespritzen. Der Rafraîchisseur als Zimmerspritze S. 55.

Zweites Kapitel.

Ueber das Schneiden der Topfrosen.

§. 51. Allgemeine Regeln für das Schneiden S. 57. — §. 52. Zeit des Schneidens S. 57. — §. 53. Verschiedene Formen, welche man den Topfrosen geben kann S. 58.

Drittes Kapitel.

Das Verpflanzen, Versetzen oder Umtopfen.

§. 54. Allgemeine Grundsätze für das Verpflanzen. Verfahren, um einen zweiten reichen Flor zu erzielen S. 59. — §. 55. Verfahren beim Verpflanzen S. 61. — §. 56. Behandlung nach dem Verpflanzen S. 62.

Viertes Kapitel.

Ueberwinterungslokale.

§. 57. Beschaffenheit der Ueberwinterungslokale S. 63. — §. 58. Orangeriehaus, Gartensalon, Kalthaus S. 64. — §. 59. Glashaus blos zur Rosenkultur S. 64. — §. 60. Frostfreier Kasten S. 65. — §. 61. Frostfreies Zimmer S. 65. — §. 62. Keller S. 66.

Fünftes Kapitel.

Noch einige speciellere Bemerkungen über die Kultur der Topfrosen.

§. 63. Behandlung während des Winters S. 66. — §. 64. Behandlung nach dem Schneiden im Frühjahre S. 67. — §. 65. Behandlung während der Blüthezeit S. 67. — §. 66. Behandlung nach der Blüthezeit S. 68. — §. 57. Beachtung der Reinlichkeit S. 68.

Dritter Abschnitt.

Vermehrung der Rosen.

Erstes Kapitel.

Geschlechtliche Fortpflanzung oder die Vermehrung aus Samen.

§. 68. Allgemeines über die Anzucht aus Samen. Verfahren beim Kreuzen oder Hybridisiren S. 89. — §. 69. Sammeln und Aufbewahren der Samen, Aussäen derselben S. 72. — §. 70. Behandlung der Sämlinge S. 73. — §. 71. Prüfung der Sämlinge beim Blühen, Okuliren derselben auf Wildlinge S. 74. — §. 72. Anzucht von Sämlingen wilder Rosen zur Veredlung auf den Wurzelhals S. 74. — §. 73. Anzucht von Sämlingen wilder Rosen zu Hochstämmen S. 76.

Zweites Kapitel.

Die Vermehrung durch Ausläufer §. 74. S. 77.

Drittes Kapitel.

Die Vermehrung durch Wurzelschnittlinge §. 75. S. 77.

Viertes Kapitel.

Vermehrung durch Ableger.

§. 76. Das Absenken wurzelächter Rosen S. 78. — §. 77. Das Absenken veredelter Rosen S. 79. — §. 78. In einen Wildstamm eingesetzte Edelaugen zu wurzelächten Pflanzen zu bilden S. 79.

Fünftes Kapitel.

Vermehrung durch Stecklinge.

§. 79. Allgemeines über die Vermehrung durch Stecklinge; Zubereitung derselben S. 80. — §. 80. Herrichtung der Beete zur Aufnahme der Stecklinge im Vermehrungshause und Mistbeetkasten, Stecklingsschalen und Stecklingskästen. Behandlung der Stecklinge und Auspflanzen derselben nach ihrer Bewurzelung in kleine Töpfchen S. 80. — §. 81. Kräftige Pflanzen in möglichst kurzer Zeit zur Wintertreiberei heranzuziehen S. 82. — §. 82. In derselben Weise Wildlinge zur Winterveredlung heranzuziehen S. 83. — §. 83. Behandlung der Rosenstecklinge nach Art der Oleandersteckinge S. 83. — §. 84. Stecken der Rosenstecklinge in mit Erde und Wasser gefüllte niedrige Schalen S. 83. — §. 85. Wintersteckinge aus im Spätherbst abgeschnittenen reifem Holze S. 85.

Sechstes Kapitel.

Vermehrung durch Augenstecklinge §. 86. S. 85.

Siebentes Kapitel.

Vermehrung durch Veredelung.

§. 87. Verschiedene zur Veredelung gebräuchliche Unterlagen S. 86. — §. 88. Die Hundsrose (R. canina) und ihre Vorbereitung zum Veredeln S. 87. — §. 89. Vortheile der Veredelung S. 89. — §. 90. Die Okulation S. 89. — §. 91. Das sogenannte Einschieben S. 92. — §. 92. Die Okulation nach der sogenannten Forkert'schen Methode S. 93. — Nota über das Baumwachs S. 94. — §. 93. Veredelung in Töpfe gepflanzter Wildlinge nach dieser Methode S. 95. — §. 94. Winterveredelung S. 96. — §. 95. Besonders zweckmäßiges Verfahren bei der Winterveredelung S. 97. — §. 96. Veredelung auf der Hand S. 99. — §. 97. Vortheile der Topfveredelung S. 100. — §. 98. Beschaffenheit des Edelreises und die Weise, in welcher man es auf die Unterlage aufsetzt S. 100. — §. 99. Pfropfen in den halben Spalt S. 100. — §. 100. Das Kerbpfropfen oder Trianguliren S. 101. — §. 101. Pfropfen in die Rinde S. 101. — §. 102. Pfropfen in die Seite S. 102. — §. 103. Kopuliren S. 103. — §. 104. Anschäften, Anplatten, Schäften S. 103. — §. 105. Das Sattelschäften S. 103.

Vierter Abschnitt.

Das Treiben der Rosen.

Erstes Kapitel.

Das Treiben in Töpfe gepflanzter Rosen.

§. 106. Vorbereitungen zum Treiben S. 105. — §. 107. Die gebräuchlichsten und bewährtesten Treibrosen S. 107. — § 108. Treiben der Rosen in Gewächshäusern, welche zugleich anderen Zwecken dienen S. 108. — §. 109. Durch Pferdemist erwärmter Kasten zum Treiben S. 109. — §. 110. Der holländische Treibkasten S. 109. — §. 111. Treiben der Rosen im Zimmer S. 110. — §. 112. Verfahren mit denjenigen Rosen, welche nicht austreiben wollen

S. 110. — §. 113. Treiben der Topfroſen mit immergrünen Blättern S. 110. — §. 114. Vertilgung der Roſenfeinde bei der Treiberei S. 111. — §. 115. Behandlung der Roſen nach dem Treiben S. 112.

Zweites Kapitel.

Das Treiben im freien Lande ſtehender Roſen.

§. 116. Verlängerung des Roſenflors bis in den Winter hinein S. 112. — §. 117. Antreiben von Roſenbeeten von Ende Januar an S. 113. — §. 118. Verfahren, um blühende Roſengruppen bis Mitte Mai zu haben S. 113. — §. 119. Verfahren, um blühende Roſen zum Abſchneiden den ganzen Winter hindurch zu haben S. 116. — § 120. Antreiben auf ein Beet ausgepflanzter Roſen in einem eigens dazu eingerichteten Treibhauſe; Vorbereitungen dazu S. 116. — §. 121. Das Treiben ſelbſt S. 117. — §. 122. Behandlung nach beendetem Flor S. 118.

Fünfter Abſchnitt.

Feinde der Roſen, deren Abwehrung und Vertilgung.

§. 123. Dem Pflanzenreiche angehörende Roſenfeinde S. 119. — §. 124. Dem Thierreiche angehörende Roſenfeinde S. 125.

Sechster Abſchnitt.

Beſchreibung der ſchönſten neuen und alten Roſen, nebſt Angaben über ihre Verwendung und ſonſtigen Eigenſchaften der ſyſtematiſch geordneten Gattungen.

Eigenſchaften einer guten Roſe S. 142.

A. Blätter nicht bleibend, abfallend.

I. Alle Nebenblätter an den Zweigen von gleicher Form und Größe, der Länge nach mit dem Blattſtiele verwachſen, die oberen Zipfel frei.

1. Rosa pimpinellifolia *L.* — R. spinosissima — Rosier à feuilles de pimprenelle, die Pimpenellroſe; Schottiſche Roſe S. 143. — 2. Rosa pimpinellifolia bifera — Rosier à feuilles de pimprenelle remontante, die mehrmals blühende Pimpinellroſe S. 145. — 3. Rosa damascēna *L.* — Rose de Damas ou R. de Puteaux, die Damascener-Roſe S. 145. — 4. Rosa Damascēna var. omnium calendarum — Rose des quatre saisons, die Vierjahreszeitenroſe S. 147. — 5. Rosa Damascēna bifera — R. Portlandica — Rose perpétuelle, die Perpetuelle oder mehrmals blühende Damascener- und die Trianon-Roſe S. 147. — 6. Rosa lutea *Mill.* — R. eglanteria — Rose capucine, die gelbe Roſe; Kapuzinerroſe; Fuchsroſe S. 149. — 7. Rosa sulphurea *Ait.* — Rose jaune, die gefüllte ſchwefelgelbe Roſe; gelbe Centifolie S. 150. — 8. Rosa centifolia *L.* und centifolia hybrida — Rose centifeuille, die Centifolienroſe; Centifolie; Gartenroſe und ihre Hybriden S. 151. — 9. Rosa centifolia muscosa *Ait.* — Rose mousseuse, die Moosroſe S. 153. — 10. Rosa centifolia muscosa bifera — Rose mousseuse perpétuelle, die mehrmals blühende Moosroſe S. 157. — 11. Rosa bifera hybrida — Rose hybride remontante, die mehrmals blühende

Hybride; Remontante-Rose S. 159. — 12. Rosa gallica *L.* — Rose de Provence ou R. de Provins, die französische Rose; Provinzrose; Zuckerrose; Essigrose; rothe Apothekerrose; Gartenrose S. 191. — 13. Rosa arvensis *Hud.* — R. capreolata — Rose Ayrshire, die Ayrshire-Rose; Feldrose; Ackerrose S. 193.

II. Nebenblätter an den blühenden Aestchen deutlich breiter und anders geformt als die an den blüthenlosen.

1) Früchtchen in der Kelchröhre langgestielt (so lang als die Früchtchen).

14. Rosa alba *L.* — Rose blanche, die weiße Rose S. 195. — Zu dieser Abtheilung gehörig: 1. Rosa canina *L.*, die Hundsrose; Hagebutte; Heckenrose S. 196. — 2. Rosa pomifera *Herm.* (R. villosa *L.*), die Apfelrose S. 196. — 3. Rosa tomentosa *Sm.*, die filzblätterige Rose S. 196. — 4. Rosa coriifolia *Fries.*, die lederblätterige Rose S. 197. — 5. Rosa rugosa *Thunb.* (Regeliana Linden et André) S. 197. —

15. Rosa rubiginosa *L.* — Rosier églantier, die rostfarbige Rose; die Weinrose; wohlriechende Zaunrose S. 197.

2) Früchtchen in der Kelchröhre kurzgestielt.

16. Rosa alpina *L.* — Rose des Alpes, die Alpenrose; Boursaultrose S. 198. — Zu dieser Abtheilung gehörig: 1. Rosa lucida *Ehrh.* (R. baltica *Rth.*), die glänzend blätterige oder spiegelnde Rose S. 200. — 2. Rosa rubrifolia *Vill.*, die rothblätterige Rose S. 200. — 3. Rosa cinnamomea *L.*, die zimmetbraune Rose; Zimmetrose; Pfingstrose; Mairose S. 200. — 4. Rosa turbinata *Ait.*, kreiselfrüchtige Rose; Tapeten-Rose; Frankfurter Rose.

B. Blätter immer bleibend und nicht abfallend.

I. Zweige hängend.

17. Rosa Banksiae *Brown.* — Rose de Banks, die dreiblätterige Rose S. 201. — 18. Rosa multiflora *Thunb.* — Rose multiflore, die vielblumige Rose S. 202. — 19. Rosa rubifolia *Brown.* — Rosier de prairie, die brombeerblätterige Rose; Prairie-Rose; Michigan-Rose S. 203. — 20. Rosa sempervirens *L.* — R. scandens *Mill.* — Rosier toujours vert, die immergrüne Rose; Kletterrose S. 205. — 22. Rosa mycrophylla *Roxb.* — Rosier à petites feuilles, die kleinblätterige Rose S. 207.

II. Zweige aufrecht oder schlank zurückgebogen.

23. Rosa indica Borbonica — Rosier île Bourbon, die Bourbonrose S. 208. — 24. Rosa indica Noisettiana *Ser.* — Rose noisette ou R. de Noisette, die Noisetterose S. 214. — 25. Rosa indica odoratissima *Hort.* — R. fragrans *Red.* — R. tea *Hort.* — Rose thé, die Theerose S. 218. — 26. Rosa indica semperflorens *Ser.* oder R. Bengalensis *Pers.* — Rose Bengale, die immerblühende Rose; bengalische Rose; Monats-Rose S. 226. — 27. Rosa indica minima oder Lawrenciana *Sweet.* — Rose liliputienne, die Lawrence- oder Liliput-Rose S. 228. — 28. Rosa hybrida — Rose hybride, die Hybride-Rose S. 229.

Eine Auswahl der schönsten Rosen zu verschiedenen Zwecken S. 232.

Anhang. Bezeichnung der Rosen S. 235.

Register sämmtlicher angeführter Rosen S. 239.

Einleitung.

So reich unsere Gärten und Gewächshäuser an herrlichen Zierpflanzen sind und noch alljährlich mehr damit bereichert werden, so behauptet doch die Rose nach wie vor, durch ganz Asien und Europa hindurch, von China und Indien bis Spanien sammt Portugal, ihren Rang als Königin unter den Blumen, wie die Nachtigall unter den gefiederten Sängern, und wird ihn auch fort und fort behaupten. Nie vermochte die wechselnde Gunst der Mode ihr den Rang streitig zu machen, sondern stets wurde ihr, sowohl im Garten, im Gewächshause und Blumenfenster des Reichen, als auch im einfachsten Gärtchen und niedrigsten Stubenfenster des Unbemittelten, ein Ehrenplatz angewiesen. Während hunderte von Zierpflanzen nach kurzem Auftauchen wieder in den Hintergrund gedrängt, manche blos von einzelnen Liebhabern mit Vorliebe fortgepflegt werden, — wo Rosen winken, bleiben die seltensten Blumen unbeachtet.

Was ihnen diese einzig dastehende Bevorzugung nicht nur bei uns, sondern bei allen Völkern, wo der Himmel Rosen wachsen läßt, verschafft hat, brauchen wir nicht erst zu untersuchen. Die zarten, schönen, oft so lieblich duftenden Blumen sind vorzugsweise die Lieblinge des weiblichen Geschlechts, die Rosen insbesondere das Sinnbild und die Zierde der Jungfrau. Das kleinste Mägdlein greift, wenn es die Auswahl hat, sicher zuerst nach der Rose; zur Jungfrau aufgeblüht, läßt es oft den prächtigsten Strauß liegen und schmückt sich einfach und doch für Jedermann zur vollen Genüge — mit der schönsten vollen Rose; der Bräutigam weiß seiner hol-

den Braut nichts Sinnigeres zu bringen, als — eine frische, zart erröthende Rose, der früh verblichenen theuern Gattin und Mutter kalte Hand hält noch im Sarge — eine weiße Rose!

Aus diesem Grunde möchten auch wir die Frauen und Jungfrauen vor Allen zur Pflege dieser ihrer Lieblinge, zur Beförderung der Rosenzucht aufrufen. Ja, die Damen sollten sich nicht blos der Blumen erfreuen, sondern sich auch ihrer Pflege und besonders der Rosenzucht nach aller Möglichkeit widmen, was so leicht und unterhaltend ist. Bleibt ja ohnehin der Hausfrau, der erwachsenen Tochter so oft der Garten mit all seinen Schätzen und Zierden ganz und gar überlassen, während der Mann seinem Amte oder seinen bürgerlichen Geschäften obliegen und nachgehen muß und erst nach vollbrachter Arbeit Ruhe, Erholung und Erheiterung im trauten Kreise der Seinen draußen im grünenden, blühenden, duftenden Garten beim Glanze der Abendsonne und dem Abendliede der Vögel finden kann. — Daß aber die Dornen die zarten Damenhände nicht verwunden, dafür ist schon längst durch niedliche Damen-Rosenscheeren gesorgt. Ist aber der Handschuh, welcher die Haut gegen die brennende, bräunende Sonne schützt, von etwas soliderem, stärkerem Stoff gewählt, so können jene Waffen der Blumenkönigin den zarten Fingern ohnehin nichts anhaben.

Zur Schönheit der Rose kommt aber auch noch ihre große gärtnerische Nutzbarkeit. Keine Zierpflanze läßt sich so mannichfaltig verwenden und so verschiedenen Verhältnissen und Formen anpassen, wie sie. Hat man im Freien auch nur über eine Wand zu verfügen, welche sich weder zur Anpflanzung eines Weinstocks, noch eines anderen Spalierobstbaumes eignet; so läßt sich doch noch eine Rose daran ziehen. Im kleinsten Raum eines wenige Quadratruthen haltenden Gärtchens, welches verschiedenen Zwecken dient, lassen sich auf den Rabatten Rosen in verschiedenen Formen anbringen, ohne daß die andern Pflanzen dadurch benachtheiligt werden. Eine Laube, ein Bogen oder förmlicher Bogengang läßt sich mit verschiedenen Arten von Kletterrosen bekleiden. Ihre mannichfaltigste Verwendung aber finden die Rosen in den landschaftlichen Gärten. Bald pflanzt man sie als Hochstamm einzeln oder in Gruppen auf den Rasen, bald alleeartig zu beiden Seiten eines Weges, bald in wurzelächtem oder in niedrig veredeltem Zustande auf größere oder kleinere Beete, oder als einzelnen, seinem freien Wachsthum überlassenen und graciös überhängenden Busch. Bald auch verwendet man die schlingartigen Rosen zur Bekleidung alter Baumstämme, zur Dekoration von Felsenpartieen und alten Mauern, oder zur Verbergung das Auge beleidigender Gegenstände. Selbst für die sterilsten Stellen

und heißesten Abhänge, wo eine andere Pflanze noch kaum im Stande ist, das Leben zu fristen, giebt es noch Rosen, welche daselbst gedeihen.

Noch ein Hauptvorzug der Rose besteht darin, daß sie sich bei einiger Aufmerksamkeit mit dem besten Erfolge auch in Töpfen ziehen läßt und sich hier ebenfalls den verschiedensten Verhältnissen anbequemt. Nicht selten kommt es vor, daß eine zärtliche, dabei aber sehr schöne Rose besonders in unserm nördlichen Klima, im Freien nicht gedeihen will, wenigstens bei regnerischer, kühler Witterung ihre Blumen gar nicht, oder nur sehr mangelhaft entfaltet, während sie, in den Topf gepflanzt und, wenn es nöthig, unter Glas gehalten, die herrlichste Blüthe gewähren. Aber, davon abgesehen, wie viele Rosenliebhaber und Liebhaberinnen giebt es nicht, welche weder über ein kleines Beet, geschweige denn über einen Garten zu verfügen haben, sondern im günstigsten Falle auf ein Gewächshäuschen, oder einen Kasten, meistens aber nur auf ein Blumenfenster oder Blumenbrett vor dem Fenster angewiesen sind? Für diese gewährt die Kultur der Rosen in Töpfen noch einen besondern Genuß und sie können sich auch während der Zeit, wo die Natur erstarrt ist, blühender Rosen erfreuen. —

Endlich aber ist noch ein herrlicher geheimer Nutzen der lieben Gartenkunst überhaupt und besonders der Rosenzucht für Frauen und aufblühende Mägdlein wohl zu beachten, den wir um keinen Preis übergehen möchten. Diese urälteste paradiesische Kunst (1. Mos. 2, 8. 15) ist gewiß nicht vom gütigen Schöpfer umsonst durch seinen Schreiber genannt, sondern zu dem Zwecke, uns darauf aufmerksam zu machen, daß — sie sich für Jedermann als ganz vorzüglich gesund für Leib und Seele von selbst empfiehlt, was von allen Stuhl- und Stubenkünsten nicht gerühmt werden kann, so edel sie auch sind. Wir bedürfen munterer Thätigkeit und Bewegung, und zwar ganz vorzüglich in Gottes frischer, freier Luft. Es muß Abwechselung sein! Die bleichen Wangen, die leichte Erkältlichkeit, die beständige Neigung zu Husten und Schnupfen, zu Halsbeschwerden und Rheumatismen, zu Magen- und wer weiß was für Schwächen, Nervenabspannung, Geistesabmattung, Gemüthsverstimmung u. s. w. weichen nur, bei sonst wohlgewählter und geordneter Lebensordnung für Geist und Körper, dem unverdrossenen täglichen Genuß von Gottes freier Natur zu jeder Jahreszeit und an etlichen Stunden des Tages, verbunden mit einer angenehmen und nützlichen Thätigkeit. Wo kann man das aber schöner haben, als in einem Garten! Darum auf, geborene Freundinnen der Rosen, und beim Morgenroth und Abendroth sie insbesondere gepflegt, jetzt mit dem leichten blinkenden Spaten, jetzt mit der niedlichen Hacke und dem hübschen Rechen,

oder dem scharfen Gartenmesserchen und etwa nöthigen Bändern *)! Was gilt's, der Purpur des Himmels und der Rosen wird auf die Wangen gezaubert werden! —

Um nun aber die Rosen in den verschiedensten Verhältnissen mit wirklichem Erfolge zu ziehen, ist eine möglichst genaue Kenntniß ihrer Individualität, ihrer Neigungen, Bedürfnisse u. s. w. unerläßlich. Hierzu sollen allen Gartenfreunden die nachstehenden Blätter dienen, sowie auch Mittel und Wege angeben, wie diese Gewächse zu behandeln und zu verwenden sind. Und der Verfasser wird sich freuen, wenn wohlwollende Männer vom Fach und Freunde und Freundinnen der ältesten Kunst es dazu brauchbar finden.

---

*) Es versteht sich von selbst, daß die Vor-, Frühjahrs- und Herbstarbeiten einen kundigen Mann erfordern.

Erster Abschnitt.

Kultur der Rosen im freien Lande.

Erstes Kapitel.

Standort und Boden, Bodenverbesserung.

1. Zum guten Gedeihen der Rosen ist die richtige Wahl des Standortes und ein entsprechendes Erdreich das Haupterforderniß. Aber nur selten werden alle Umstände so günstig zusammentreffen, daß uns in Bezug auf Lage und Boden nichts zu wünschen übrig bliebe; vielmehr werden wir in den meisten Fällen genöthigt sein, uns den lokalen Verhältnissen anzubequemen.

Der geeignetste Standort für Rosen ist eine freie, mehr sonnige als schattige, mehr luftige (jedoch nicht zugige) als zu warme Lage, welche im Durchschnitt allen Rosen zusagt. Ist dieselbe gegen Nord-Ost durch Gebäude oder Naturgegenstände geschützt, so können die zarteren Rosensorten um so eher mit verwendet werden. Der Standort muß insofern frei und luftig sein, daß derselbe sich weder unter Bäumen und Sträuchern, noch in solchen Lagen befindet, wo der Zutritt der Sonne und eine freie Bewegung der Luft gehemmt ist.

Ausnahme hiervon machen die Schling- oder Kletterrosen, von denen die meisten, sowohl zur vollkommenen Entwickelung ihrer Blüthen, als auch zu einer kräftigen Vegetation eine sonnige Mauer oder andere Wände verlan-

gen, damit sich ihre langen üppig gewachsenen Ranken eher verholzen und hierdurch fähig werden, wieder neue Seitenzweige zur Bildung der Blüthen zu erzeugen.

Ferner machen diejenigen Rosen, wenn sie auch nicht zu den rankenden gehören, eine Ausnahme, welche — zumal in wurzelächtem Zustande — auf Unkosten der Entwickelung der Blüthen zu üppig wachsen; sowie die Pimpinellrosen; diesen muß ein der Sonne recht ausgesetzter und mehr trockener Standort gegeben werden, wodurch nebst einem mäßigen Beschneiden das allzuüppige Wachsthum und zwar zu Gunsten der Blüthenerzeugung gemäßigt wird.

Gestatten lokale Verhältnisse die Anpflanzung zärtlicher Rosensorten nicht, so wähle man dankbar blühende Sorten aus Gattungen, welche gegen die Ungunst der Lage und des Bodens weniger empfindlich sind (s. im sechsten Abschnitt), oder man beschränke sich auf die Topfkultur, welche, mit Umsicht und Sorgfalt betrieben, nie ohne lohnenden Erfolg bleibt. Ist aber nur ein ungünstiger Boden dem Gedeihen der Rosen hinderlich, so ist diesem Uebelstande in den meisten Fällen mit einigen Opfern abzuhelfen.

2. Ein nahrhafter, lockerer, milder, lehmiger und tiefgrundiger Boden ist wohl der allen Rosen entsprechendste. Obgleich jede andere Bodenart, wenn sie nur tiefgrundig und nicht naß ist, den Rosen genügt, so erreichen sie doch niemals eine solche Vollkommenheit in ihrem Wachsthume und in der Entfaltung der Blumen, als wie in dem oben bezeichneten oder in einem besonders für sie zubereiteten Boden.

Ist die Erde schwer und fett, ohne zum Wasserabzug durchlassenden Untergrund, so hält sie die Feuchtigkeit zu lange und kann diese der geringen Porosität wegen nur langsam verdunsten. Bei anhaltendem Regen wird ein solcher Boden so von Nässe gesättigt, daß nicht nur die in denselben gepflanzten feineren Rosensorten sehr leiden oder gar zu Grunde gehen, sondern auch die härteren, obgleich sie vor Ueppigkeit strotzen, jener Krankheit verfallen, welche durch Uebermaß von Feuchtigkeit, verbunden mit Ueberfüllung von Nahrungsstoffen, hervorgerufen wird.

Um solchen Boden zur Rosenkultur fähig zu machen, ist ein 0,63 bis 1 Meter tiefes Rigolen, wobei Steine und andere Abzugsmaterialien zu unterst gebracht werden, nöthig; kann man ihn außerdem noch mit Sand oder Kohlenstaub untermischen, so wird die Porosität noch erhöht und er mithin zur Aufnahme feinerer Rosen noch geeigneter.

Ein nasser Thon- oder Lettenboden muß ebenfalls erst entwässert werden. Man verbessert ihn sehr durch gebrannten Kalk, wodurch er ge-

lockert und erwärmt wird. Ist Kalk nicht zu haben, so benutze man Sandmergel oder nur Sand. Außerdem vermag klarer Torf, mit Jauche gesättigte Komposterde, Holz- und Rasenasche seine Befähigung zur Rosenkultur am besten zu bewirken.

In schwerem Boden pflanze man vorzugsweise auf Wildling (Rosa canina) veredelte Rosen an, welche, wenn es an der nöthigen Nahrung nicht fehlt, in diesem noch besser gedeihen, als in zu leichtem.

Der Torf- und Moorboden pflegt in der Regel zu arm an mineralischen Bestandtheilen zu sein, als daß die Rosen darin gedeihen könnten; er ist aber durch eine vorangegangene Entwässerung, durch Brennen, und Beimischen von Sand, Thon, Kalk, (welche man häufig unter der sauern Humusschicht gleich selbst antrifft), Asche, verwittertem Lehm, (altem Bauschutt), durch gehörige Bearbeitung und Düngung zu einem trefflichen Boden umzugestalten, so daß dann die ihm anvertrauten Rosen das üppigste Wachsthum entfalten.

Kalkboden verlangt nur eine Beimischung von Humus, was am zweckmäßigsten durch Torferde, Erde aus Holzställen oder von Zimmerplätzen geschieht und oft bewundernswürdig wirkt.

Ein sandiger Boden, wenn er auch etwas Humus enthält, muß dennoch durch fetten Dünger, Lehm, Kompost oder durch Beimischung anderer nahrhafter Erdarten verbessert werden. Ließe man ihn in seinem Naturzustande, so würden die Wurzeln durch allzugroße Trockenheit und Wärme, wovon der Sandboden an heißen Tagen zu leiden hat, benachtheiligt werden; dagegen wird durch eine Beimischung von etwas schwerem, aber humusreichem Boden die schnelle Abwechselung der Erdtemperatur gemindert.

Die meisten Schwierigkeiten verursacht ein kiesiges, grandiges Erdreich. Am ersten gedeihen noch in solchem Boden die Pimpinell-, Kapuziner- und Ayrshire-Rosen. Will man aber an einem solchen Ort andere Rosen pflanzen, so muß, außer Beibehaltung etwa vorhandener vegetabilischer Erdtheile, die sich durch ein Erdsieb vom Kies trennen lassen, der Kies auf 0,63 Meter tief ganz entfernt werden. Zum Ausfüllen bediene man sich einer guten Kompost- oder auch lockeren, fetten Rasenerde. Stehen diese Erdarten nicht zu Gebote, so kann man mit bestem Erfolge eine gute Garten-, Ackerland- oder Teichschlammerde verwenden.

3. Die zweckmäßigsten Düngstoffe für die Rosen bleiben die Stalldünger in nicht zu frischem Zustande. Ueberhaupt wirkt ein jeder kräftiger Dünger (wie Abtritt-, Hühner-, Taubenmist und Guano), nicht in Uebermaß gegeben, auf ein gutes Gedeihen der Rosen. Knochenmehl, Horn-

späne, alte Lumpen u. dgl. nützen den Rosen erst nach ihrer vollkommenen Verwesung.

Flüssige Düngmittel wendet man vor oder während des Regens an. Läßt dieser zu lange auf sich warten, so muß ein dem Düngerguß entsprechendes gleiches Quantum reinen Wassers nachgegossen werden. Ein solcher Düngerguß ist von großem Vortheil, sowohl vor dem ersten Austrieb und kurz vor der Knospenbildung, als auch bei den Herbstrosen *), besonders, nachdem der erste Flor vorüber ist und der zweite Trieb beginnt. Besonders ist das später beschriebene Eingraben von Drainröhren zum Eingießen von flüssigem Dünger, wie es bei Obstbäumen geschieht, zu empfehlen.

4. Es ist für das Gedeihen der Rosen von besonderem Nutzen, wenn die für eine Rosenanpflanzung sich nöthig machenden Bodenbearbeitungen und Verbesserungen noch vor dem Winter ausgeführt werden, damit der Boden bis zur Pflanzzeit im Frühjahr erst den wohlthätigen Einwirkungen der Sonne, der Luft, des Regens, Schnees und Frostes völlig ausgesetzt ist.

5. Mit Vorhergehendem soll nun keineswegs die unbedingte Behauptung ausgesprochen werden, daß alle Rosen nur in ein und demselben Boden gedeihen können, sondern unter ihnen befinden sich viele, wie z. B. die meisten Sommerrosen, die stark wachsenden Remontanten, Noisetten, Bengalen und mehrere andere, welche auch mit einem geringen oder schwereren Boden fürlieb nehmen, auf solchem nicht nur sehr gut gedeihen, sondern auch einen reicheren und vollkommeneren Flor entwickeln. Die Pimpinellrose gedeiht sogar auf dem schlechtesten Sande und erträgt unglaubliche Trockenheit. Daraus geht hervor, daß man mit einiger Umsicht jede Bodenart benutzen kann, wenn man eine, den vorhandenen Bodenverhältnissen angemessene Auswahl der zu pflanzenden Rosen trifft.

---

*) Unter Herbstrosen versteht man diejenigen, welche, außer der gewöhnlichen Blüthe im Sommer, dieselbe noch ein- oder mehreremal bis in den Spätherbst wiederholen, unter Sommerrosen, die nur einmal im Jahre blühen.

Zweites Kapitel.

Das Pflanzen der Rosen.

6. Dem Pflanzen der Rosen muß die größte Vorsicht und Sorgfalt gewidmet werden, weil das künftige kräftige Gedeihen davon abhängt. Die dazu geeignetste Zeit ist die, wo sich die Rosen im Ruhestande befinden, also entweder im Herbste — in wärmeren Lagen und vorausgesetzt, daß eine etwa vorher nöthig gewesene Bodenbearbeitung schon einige Zeit früher ausgeführt worden — oder im Frühjahr in kälteren Gegenden, sobald es die Witterung erlaubt. Der Boden muß sich in weder zu nassem noch zu trocknem, sondern in einem milden, lockeren Zustande befinden. Empfindlichere Rosen pflanze man nur im Frühjahr, und selbst wenn man härtere Rosen im Herbst pflanzt, ist zu rathen, den Boden einige Centimeter hoch mit Laub oder Mist zu bedecken, damit er nicht durch den Frost gehoben wird, — wodurch die Wurzeln leicht blos gelegt werden, — und auch dem, für die ohnehin angegriffenen Wurzeln nachtheiligen, öfteren Temperaturwechsel weniger ausgesetzt ist.

7. Muß man sich die zu pflanzenden Rosen von auswärts kommen lassen und haben sie längere Zeit unterwegs zugebracht, so sind besondere Vorsichtsmaßregeln zu beobachten. Vor allem ist es Schuldigkeit des Absenders, sie mit aller nöthigen Sorgfalt nicht nur herausnehmen, sondern auch verpacken zu lassen. Kommen sie dennoch in sehr vertrocknetem Zustande an, wie es bei trocknem Frühjahrswetter oft der Fall und leicht an der eingeschrumpften Rinde zu erkennen ist, so lege man sie vor dem Pflanzen 1 bis 2 Tage ins Wasser, bedecke sie dann noch 8 Tage mit feuchter Erde oder Moos, in welcher Zeit sie sich wieder erholen, wenn sie überhaupt noch Leben haben. Dann ist es sehr zweckmäßig, die ganze Pflanze mit einem aus Lehm und Rindsmist bereiteten Brei zu überziehen. Hochstämmige Rosen bindet man wohl auch dünn in Stroh oder Moos ein, um sie in der ersten Zeit gegen die austrocknende Luft zu schützen. Das beste Schutzmittel aber, wo es sich anwenden läßt, ist, die hochstämmigen Rosen, nach ihrer Pflanzung zur Erde zu biegen, an derselben vermittelst Haken, oder übers Kreuz gesteckter Hölzer zu befestigen, Krone und Stamm 7 — 9 Centimeter mit Erde zu bedecken, sie so lange unter derselben zu lassen, bis die

frischen Triebe der Krone durch die Erddecke kommen, und dann erst bei trübem, womöglich regnerischem Wetter in die Höhe zu richten und an den beigesteckten Pfahl zu befestigen. Um das Niederbiegen zu erleichtern, pflanzt man die Stämme nach der Richtung, nach welcher sie gebogen werden sollen, etwas schräg, was durchaus nicht hindert, sie nach dem Aufrichten doch ganz senkrecht am Pfahl anzubinden. Nach dem Aufrichten tritt man den Boden rings um den Stamm, für den Fall, daß die Wurzeln etwas locker geworden sind, noch einmal fest und giebt einen durchdringenden Guß.

Derartige Vorrichtungen tragen allerdings nicht zur Verschönerung bei, sind jedoch besser, als wenn man die Rosen lange Zeit kümmern sieht und schließlich ganz verliert. Ein- bei trocknem Wetter öfteres Bespritzen und Beschatten während der heißesten Zeit des Tages trägt ebenfalls sehr zu einer baldigen Erholung bei. Haben einzelne von den frisch gepflanzten Rosen bis Anfangs Juli noch nicht ausgetrieben, so nehme man sie nochmals aus der Erde heraus, beschneide von Neuem die Wurzeln und pflanze sie wieder. In den meisten Fällen wird nach dieser Operation alsbald das Austreiben erfolgen, wenn sie überhaupt noch Leben haben. Sehr oft treiben sie noch im Spätsommer aus und entwickeln kräftige Triebe mit Blüthen.

Erhält man eine Rosensendung bei Frostwetter und ist der Frost in den Ballen eingedrungen, so hat dies in den meisten Fällen nichts auf sich; man darf nur die gefrornen Ballote Anfangs gar nicht öffnen, sondern sie so lange an einem frostfreien Orte liegen lassen, bis der Frost allmählig ganz herausgezogen ist.

8. Nicht selten kommt es aber auch vor, besonders wenn es sich um neue, eben erst in den Handel gekommene Sorten handelt, daß man im Treibhaus veredelte, kaum gewachsene, mit einem ganz zarten Trieb versehene und noch gar nicht an freie Luft gewöhnte Rosen erhält. Diese verlangen, um sie am Leben zu erhalten, besondere Pflege. Bekommt man sie nicht in Töpfen, so ist es nöthig, sie wieder in Töpfe zu pflanzen, und der Rosenfreund, welcher nicht im Besitze eines Gewächshauses oder hohen Mistbeetkastens ist, um darin solche Schwächlinge, bevor sie an ihren Bestimmungsort kommen, hinlänglich erstarken zu lassen, muß ihnen irgend einen geeigneten Platz in einem Zimmer nahe am Fenster, oder zwischen Doppelfenstern geben, wo sie aber, so lange der Trieb noch sehr weich ist, gegen zu starke Sonne geschützt und nach und nach ans Freie und die volle Sonne gewöhnt werden müssen.

9. Hat man die Rosen, welche man pflanzen will, selber, so nimmt man sie, wie sie gebraucht werden, mit sorgfältiger Schonung der Wurzeln aus ihrem bisherigen Standorte heraus. Man steche daher in derjenigen Entfernung, in welcher die Wurzeln sich ausbreiten, rings herum mit dem Spaten so tief als möglich; bei stärkeren Exemplaren räumet man die Erde ganz weg, bis fast alle Wurzeln behutsam gelöst worden sind, und hebe dann mit einem unterhalb des Wurzelballens geführten Spatenstich die Rose heraus. Bevor man sie wieder pflanzt, schneide man die Zweige, je nachdem sie schwächer oder stärker sind, auch die Beschaffenheit der Wurzeln es erfordert, auf 2 bis 6 Augen zurück, und entferne die alten und kahlen, sowie die krüppelig und unzweckmäßig stehenden ganz, wozu man sich am besten einer Rosenscheere oder in deren Ermangelung eines scharfen Messers bedient.*) Der Schnitt muß scharf und glatt sein und muß immer hinter dem Auge, niemals vor dem Auge geführt werden. Pflanzt man im Herbste, so ist es besser, das Beschneiden der Zweige zu unterlassen und erst im Frühjahr nachzuholen, ausgenommen, daß man die etwa noch daran hängenden Blätter, die noch krautartigen Spitzen und unnützen Zweige entfernt. Die beschädigten Wurzeln werden bis auf den unverletzten Theil zurückgeschnitten, die im Absterben begriffenen ganz entfernt. Bei veredelten Rosen sind auch sogleich alle etwa vorhandenen Wurzelausläufer des Wildlings dicht an ihrer Basis wegzuschneiden. Ferner trage man Sorge, daß die Wurzeln nicht erst an der Luft betrocknet werden. Kann das Wiedereinpflanzen nicht sofort geschehen, so schlage man sie einstweilen in Erde ein, oder schütze sie auf andere Weise, z. B. durch Eintauchen in einen Brei von Lehm und Rindsmist, durch Bedecken mit feuchten Tüchern oder dergl. mehr. Die Pflanzlöcher müssen so groß gemacht werden, daß die Wurzeln hinreichend ausgebreitet werden können und nicht gebogen werden müssen. Sollte die Erde, in welche die Rosen gepflanzt werden sollen, nicht von einerlei guter Beschaffenheit sein, so verwendet man die feinere und bessere der aus den Pflanzlöchern bei Seite gelegten Erde zur nächsten Umgebung der Wurzeln, die gröbere und schlechtere bringt man oben auf. Nachdem die Wurzeln sorgfältig ausgebreitet, die Erde dazwischen gebracht und sie vollständig damit bedeckt sind, drückt man sie mäßig — kleine Pflanzen mit feinen Wur-

---

*) Ein geschickter Messerschmied in hiesigem Orte setzt mich in den Stand, Rosenscheeren in verschiedener Größe, Rosenpräsentirscheeren zum Abschneiden der Blumen, sowie alle Sorten Gartenmesser in bester Qualität zu soliden Preisen zu liefern.

zeln am besten mit den Händen — an und macht eine kesselartige Vertiefung um den Stamm, damit beim Angießen das Wasser nicht ablaufen und auch besser eindringen kann. Sind sie durchdringend angegossen, so wird die Erde mit einem Rechen geebnet, wobei die zum Angießen gefertigten Kessel zugefüllt werden, damit die stark durchnäßte Erde nicht durch die Sonne gehärtet wird. Wird die Pflanzung im Herbst bei hinlänglich durchfeuchtetem Boden vorgenommen, so unterläßt man das Angießen ganz, ebenso auch, wenn dieselbe zeitig im Frühjahr geschieht. Bei eintretender und anhaltender trockner Witterung muß dasselbe dann aber nachgeholt werden.

Pflanzt man Rosen einzeln, auf vorher nicht gründlich durcharbeiteten Boden, z. B. auf Rasenplätze, so ist es nöthig, je nach Beschaffenheit des Erdreichs, ein 1 bis 1,31 Meter breites und 0,63 bis 1 Meter tiefes Loch auszuwerfen. Auf den Grund, wenn er nicht an und für sich schon durchlassend ist, bringt man auch erst eine 16 bis 32 Centimeter hohe Schicht irgend eines Abzugsmaterials (zerklopfte Ziegelsteine, Holz-Kohlenstücke u. s. w.). Die schlechteste Erde ist ganz zu entfernen und die zum Pflanzen verwendbare bessere mit den ihr etwa fehlenden Düngstoffen ꝛc., wie §. 3 angegeben, zu vermischen. Das Loch füllt man, soweit es das Wurzelvermögen des zu pflanzenden Exemplars erfordert, wieder zu, wobei die Erde etwas fest getreten wird; unterbliebe dies, so würde die Rose durch das Setzen der Erde sehr bald zu tief kommen.

Bei eintretender heißer und trockner Witterung ist es von außerordentlichem Vortheil und schützt es die Erde vor zu starkem Austrocknen, wenn man auf die Rosenbeete, oder auf die Pflanzscheiben einzeln stehender Rosen eine dünne Schicht kurzen Stallmistes bringt, über welchen man, um ihn zu verbergen, wieder so viel Erde breitet, als nöthig ist. Auch kann man statt dessen Moos, Lohe oder irgend ein anderes Material benutzen.

Beim Pflanzen wurzelächter Rosen schadet es durchaus nicht, wenn sie auch etwas tiefer zu stehen kommen, als sie vorher gestanden haben. Schon alte Stöcke lassen sich dadurch verjüngen, indem sie oben Wurzel schlagen. Veredelte Rosen dagegen pflanzt man nicht tiefer, als daß die obern Wurzeln gerade mit Erde bedeckt sind. Bei einem zu tiefen Pflanzen entwickeln die Unterlagen nicht nur noch mehr ihre lästigen Ausläufer, sondern die Wurzeln werden auch des wohlthätigen Einflusses der Luft und der atmosphärischen Niederschläge zu sehr beraubt. Selbst niedrig veredelte Rosen möglichst tief zu pflanzen, um sie zu wurzelächten zu machen, ist nicht rathsam, da jene in Ansehung der Schönheit und des Reichthums der Blüthe, wie auch in der Kraft des Wachsthums diese weit über-

treffen. Will man aber veredelte Rosen zu wurzelächten machen, so muß entweder schon bei der Anzucht darauf Rücksicht genommen werden, indem man den Wildling auf den Wurzelhals veredelt, wo sich dann leicht die Veredelungsstelle mit in die Erde bringen läßt und das Edle ebenfalls Wurzeln schlägt. Ist jedoch die Veredlungsstelle etwas höher, so häufelt man bis über dieselbe die Erde an, oder pflanzt das Stämmchen schräg ein, um den Edeltrieb in die Erde zu bringen und zum Wurzelschlagen zu veranlassen.

Dem Pflanzen hochstämmiger und Säulen-Rosen muß das Einschlagen der Pfähle, woran sie vermittelst dünner Weiden oder einem anderen geeigneten Bindematerial gebunden werden, vorausgehen, indem durch das Einschlagen der Pfähle nach dem Pflanzen häufig Wurzeln verletzt werden. Die Pfähle müssen stets stärker sein, als die daran zu bindende Pflanze, um derselben Widerstand leisten zu können, und so lang sein, daß sie, im Boden feststehend, bei hochstämmigen Rosen noch bis in die Mitte der Krone reichen, um diese nöthigen Falls in der Blüthenzeit an denselben befestigen zu können, welche Vorsicht besonders bei den ein- und zweijährigen Veredelungen nothwendig ist. Besitzt die veredelte Rose schon ein Krone, d. h. sind außer den Grundzweigen schon Mutter- und Seitenzweige vorhanden, die eine Krone bilden, so werden diese ebenfalls auf 2 bis 6 Augen geschnitten und alle diejenigen schwachen Zweige entfernt, welche nicht nur der Form schaden, sondern auch keine kräftigen Augen zur Erzeugung von Blüthen besitzen.

Das Anbinden, als die letzte Verrichtung beim Pflanzen, geschieht am besten in Form einer liegenden Achte (∞), indem man das Band zwischen Stamm und Pfahl einmal dreht, dann aber, noch einmal um Stamm und Pfahl legt und ordentlich fest zieht, um das bei windigem Wetter leicht entstehende Reiben zu verhüten. Anfangs wird das Band blos lose, damit es das gewöhnlich noch erfolgende Setzen der Pflanze nicht verhindert, und später in der angegebenen Weise fest gebunden.

10. Will man in Töpfen stehende Rosen, welche in Gewächshäusern, Mistbeetkästen, Zimmern oder Kellern überwindert worden waren, ins freie Land pflanzen, so kann dies erst später im Frühjahr geschehen, nachdem sie an die freie Luft vollständig gewöhnt worden und keine starken Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Bevor man sie pflanzt, entfernt man die sogenannte Unterlage (Scherben u. dergl.), welche man bei der Topfkultur zu geben pflegt, und sind sie stark bewurzelt, so schneidet man mit einem scharfen Messer den äußeren Wurzelfilz weg und lockert außerdem mit einem spitzen Hölzchen den Wurzelballen noch etwas auf. Kommen die Wurzel-

spitzen eben erst durch die Erde durch, so läßt man sie unberührt und verfährt im Uebrigen beim Pflanzen in derselben Weise, wie oben beschrieben.

11. Nicht selten ist man Umstände halber genöthigt, Rosen im Sommer zu verpflanzen; z. B. wenn ein Platz geräumt werden muß. Aber noch häufiger geben Engerlinge dazu Veranlassung, deren Vorhandensein sich bemerkbar macht, sobald die Spitzen anfangen zu welken. Man nehme die Rose heraus, durchsuche den Boden nach den Engerlingen, beschneide die benagten Wurzeln, sowie die gewelkten Spitzen, und pflanze sie wieder, gieße sie tüchtig an, wiederhole es, so oft die Erde anfängt trocken zu werden, und bespritze bei trocknem Wetter in den ersten Wochen öfterer die ganze Pflanze: ebenfalls ist gegen die heißen Sonnenstrahlen Beschatten sehr zweckmäßig, indem man ein Tuch darüber ausspannt, oder grüne Aeste darum steckt. Am meisten empfiehlt sich auch hier das auf S. 9 angegebene Bedecken mit Erde. Diese Rosen entwickeln oft, wenn das Verpflanzen nicht zu spät hat vorgenommen werden müssen, im Herbst noch einen ganz hübschen Flor.

Drittes Kapitel.

Das Schneiden der Rosen.

12. Das Schneiden ist eine der wichtigsten Arbeiten bei der Rosenkultur; zugleich ist es aber auch etwas schwierig, sich darin Fertigkeit zu erwerben und es mit Erfolg anzuwenden.

Die Schwierigkeit entsteht hauptsächlich durch die große Ausdehnung des Geschlechtes, welche durch die Varietäten und Hybriden (Bastarde), die so sehr von einander im Habitus und Charakter abweichen, herbei geführt wird. Es ist daher eine große Mannichfaltigkeit bei der Anwendung des Schnittes erforderlich, und man hat folgende Punkte streng ins Auge zu fassen: erstlich den Charakter der Pflanzen kennen zu lernen, sodann den gegenwärtigen Zustand des zu schneidenden Exemplars, ob gesund oder krank, von kräftigem, mittelmäßigem oder schwachem Wuchse, und endlich sich zu vergegenwärtigen, welchen Zweck man durch den Schnitt erreichen will.

Es ist einleuchtend, daß stark treibende Arten einem andern Schnitt zu unterwerfen sind, als schwach treibende, daß eine kräftig vegetirende Pflanze weniger geschnitten werden darf, als eine durch ungünstige Einwir-

kung zurückgekommene, daß, um eine Krone zu bilden, anders verfahren werden muß, als wenn man eine Säulenrose zu ziehen beabsichtigt, und daß endlich Rosen, welche ihre Blumen am vorjährigen Holz entwickeln, oder nur an den Spitzen, anders zu behandeln sind, als diejenigen, welche an den diesjährigen Trieben blühen und wo alle gut ausgebildeten Augen solche Triebe entwickeln.

Den Sommerschnitt (dessen später Erwähnung gethan werden wird) abgerechnet, giebt es nur zwei Perioden, in denen das Schneiden mit Vortheil geschehen kann. Rosen, welche im Winter gedeckt werden müssen, schneidet man am zweckmäßigsten im Spätherbste vor dem Niederlegen, dagegen können diejenigen, welche keines Winterschutzes bedürfen, zeitig im Frühjahr geschnitten werden.

13. Vom richtigen Gebrauch des Messers — resp. der Scheere — hängt die vollständige Ausbildung der Rosen mehr oder weniger ab, und es sind dabei folgende Hauptzwecke zu berücksichtigen:

a) Eine Pflanze in voller Gesundheit und Kraft zu erhalten. — Ueberläßt man eine Rose sich selbst, so wird sie eine Menge Triebe und Blüthen hervorbringen, aber sowohl Triebe als Blüthen werden dünn und unvollkommen sein. Die Pflanze wird mit jedem Jahre kraftloser, schwindet dahin, zeigt ein ungesundes Ansehen, und das Schneiden ist das nächste Mittel zu ihrer Genesung.

b) Eine dem Auge angenehme Form zu geben, welche zugleich vortheilhaft für die Entwickelung der Blüthen ist. — Auf eine schöne Gestaltung ist ebenfalls Gewicht zu legen, wobei Geschmack und Rücksicht auf die Bestimmung der einzelnen Exemplare allein maßgebend sein können; aber schon in der ersten Jugend derselben muß man mit sich im Klaren sein, welche Gestalt sie annehmen soll, um den Schnitt danach einzurichten. Die Formung muß beständig überwacht werden, denn eine Vernachlässigung läßt sich oft erst in Jahren wieder gut machen. Die den Rosen zu gebende Form muß jedoch auch ihrem Charakter entsprechen. So werden die Kletterrosen zur Bekleidung von Säulen, Lauben, Wänden, Spalieren und andern Gegenständen benutzt; andern Rosenarten giebt man gern eine Halboval-, Kugel- oder Pyramidenform. Zu einer guten und zweckmäßigen Form gehört, daß alle Zweige und Triebe die nöthige Luft und Sonne erhalten und die Blüthen sich frei präsentiren können.

c) Einen reichen und vollkommenen Flor zu erzielen. — Durch das Schneiden wird also die Kraft und Gesundheit einer Pflanze hauptsächlich befördert. Beabsichtigten wir die Erzeugung eines reichen und

vollkommenen Flors, so haben wir vor allen Dingen den Charakter der Rose, die wir schneiden wollen, allseitig zu prüfen. Man muß wissen, ob die zu behandelnde Sorte eine Sommer- oder Herbstrose, eine kräftig wachsende oder schwachwüchsige ist, ob die Blüthen sich aus den unteren, mittleren oder oberen Augen der Triebe entwickeln. Nur bei genauer Kenntniß und Beachtung dieser Punkte ist ein zweckmäßiges Schneiden möglich und auf einen guten Erfolg zu rechnen.

14. Eine Hauptregel beim Schneiden der Rose ist: Je kräftiger der Wuchs, desto mehr Triebe müssen ausgeschnitten, und die bleibenden dürfen desto weniger verkürzt werden. Rosen mit kurzen Trieben bringen die vollkommensten Blumen aus den untersten Augen, wie es meistens bei den Herbstrosen der Fall ist; diejenigen mit langen Trieben aus den mittleren oder Endaugen, wenn das Holz gut gereift ist.

Jeder beim Ausschneiden zu entfernende Zweig muß dicht am Stamm weggenommen werden, damit er nicht aus einem stehen gebliebenen Auge desto kräftiger wieder austreibe und die Schnittwunde leichter verwachsen kann.

Da die Rosen gleich den meisten Gehölzpflanzen jährlich zwei Triebe, einen Frühjahr und einen Sommertrieb machen, einige Herbstrosen in kurzen Zwischenräumen den ganzen Sommer und Herbst hindurch treiben, so fragt es sich, von welchem die vollkommensten Blumen zu erwarten sind. Im Allgemeinen erzeugt das Sommerholz einen vollkommeneren Flor, da aber bei den Schneiden auf die Form Rücksicht zu nehmen ist, so wird es in den meisten Fällen nöthig sein, auf das Frühjahrsholz zurückzuschneiden und das Sommerholz nur zu benutzen, wo es die Form erlaubt.

15. Den Sommerschnitt wendet man nach dem Verblühen der Rosen an. Alle diejenigen Rosen, welche am vorjährigen Holze blühen, besonders die gelben und Pimpinellrosen, und ein Zurückschneiden erfordern, schneide man nach der Blüthe zurück, damit sich das neue Holz besser entwickeln und ausbilden kann. Bei der Noisette Chromatella und anderen sehr kräftig wachsenden Sorten zwicke man während des Sommers, wenn die Triebe eine Länge von 24 bis 26 Centim. erreicht haben, die krautartigen Spitzen derselben mit den Fingernägeln ab, wonach sich die Augen zu reichblühenden Trieben entwickeln. Dasselbe Resultat erreicht man auch dadurch, daß man die Zweige herunterbiegt oder spiralförmig dreht, vorausgesetzt, daß die Form der Krone nicht darunter leidet. Ferner besteht der Sommerschnitt darin, daß man nicht nur alle zu dünnen und schwächlichen,

sondern auch die stärkeren, sobald sie sich mit einander kreuzen oder sonst eine unvortheilhafte Stellung haben, wegnimmt. Dadurch entwickeln sich die stehengebliebenen Triebe ungemein kräftig, das Holz reift besser, und die Blätter nehmen an Ueppigkeit zu. Die Augen der Herbstrosen treiben danach der ganzen Länge nach aus und entwickeln einen reichen Herbstflor; die Sommerrosen dagegen setzen gewöhnlich ihren Wuchs nur durch die Verlängerung der Haupttriebe fort und ihre Augen bleiben schlafend.

16. Von großem Vortheil für eine kräftige Entwickelung der Triebe und für eine schöne gleichmäßige Gestaltung der Pflanzen ist auch das Ausbrechen der Augen, welches während der ganzen Wachsthumsperiode vorgenommen werden kann und die Stelle des Ausschneidens der sich entwickelnden überflüssigen Triebe vertritt. Man erreicht dadurch noch dreierlei wichtige Vortheile. Einmal hat man später nicht nöthig einen Trieb wegzuschneiden, der, wenn er stehen geblieben wäre, auf Unkosten anderer und besserer wie ein Schmarotzer gelebt hätte. Sodann sind die Augen, wenn sie auch noch so zahlreich am Zweige sitzen, leichter zu übersehen, als die daraus entwickelten und wild in einander gewachsenen Triebe. Endlich schützt das Ausbrechen der Augen die Pflanze vor einer Verunstaltung und Schwächung, welche durch die Operation des Auslichtens sehr leicht entstehen kann.

Beim Ausbrechen der Augen sind folgende Regeln zu beobachten: Je kräftiger eine Pflanze ist, desto größer muß der Abstand zwischen den stehenbleibenden Knospen werden, damit die stärkeren Triebe hinreichend Luft und Licht erhalten, sich auszubilden; je schwächer aber die Pflanze, desto mehr Augen dürfen gelassen werden.

Bei vielen mäßig- und schwachwachsenden Sorten indeß stehen die Augen einander so sehr genähert, daß man deren weit mehr hinwegnehmen muß, als bei starkwachsenden. Alle Augen, welche die Form in Unordnung zu bringen drohen, werden entfernt. Wo Lücken auszufüllen sind, lasse man 1 bis 2 recht kräftige Augen stehen. Auch sind sogenannte schlafende Augen, wenn es nöthig ist, zum Austreiben zu bewegen, wenn man über ihnen einen Querschnitt bis auf das Holz macht.

Alle Augen, die sich in der Nähe der Veredlungsstelle zeigen, müssen ausgebrochen werden, da sie Neigung zu senkrechter Erhebung haben.

Besonders wichtig ist das Ausbrechen der Augen bei Erziehung von Säulen- und Trauerrosen. Hier nimmt man an den Haupttrieben so viele Knospen weg, daß die bleibenden 12 bis 16 Centim. von einander entfernt zu stehen kommen; jedoch an den Seitentrieben, welche zur Erzeu-

gung eines reichen Flors bestimmt sind, dürfen nicht zu viele Augen entfernt werden.

Nach diesen Bemerkungen über das Schneiden (bezüglich Augenausbrechen) im Allgemeinen, betrachten wir seine Anwendung insbesondere rücksichtlich der verschiedenen Formen.

17. Eine wurzelächte Rose, wenn sie nicht von kletternder oder schlingartiger Natur ist, muß hart über der Erde einen schön abgerundeten und je nach der Kraft der Pflanze mehr oder weniger starken Busch bilden. Bei dieser Rosenform entwickeln sich alljährlich neue Triebe aus der Wurzel oder an der Basis der Aeste, und man benutzt sie, um erschöpftes oder schlecht gestelltes Holz immer wieder zu erneuern.

Eine wurzelächte Rose zu einem Stamm erzogen, entwickelt sich niemals so schön, als in der ihrer Natur am meisten angemessenen Buschform, weil sie sonst bald in einen kraftlosen Zustand verfällt; auch verliert man zugleich den Vortheil, die Pflanze mehr oder minder vollständig durch die aus der Wurzel oder an der Basis entspringenden Ausläufer verjüngen zu können.

Man giebt der wurzelächten Rose von weniger hohem Wuchs gewöhnlich eine runde Form, indem man die Zweige eine kreisrunde Stellung nehmen läßt. Die Mitte hält man weniger dicht und läßt hier nur einige Zweige. Im Allgemeinen schneidet man sie länger, als die veredelte, da die kräftigsten Augen, aus denen sich in den meisten Fällen kräftige Blüthenzweige entwickeln, von der Basis der Ausläuferzweige ziemlich weit entfernt sind. Auch würde ein zu kurzer Schnitt Zweige und kräftige Ausläufer an der Basis des Stockes zur Entwickelung kommen lassen und den Flor dadurch beeinträchtigen. Bei kräftigen Pflanzen werden alle Ausläufer und an der Basis des Stockes entstandenen Zweige im Mittel auf 31 Centim. geschnitten,



Fig. 1. Fig. 2.

bei schwächeren auf 16 Centim. Länge, bei ungewöhnlich starkwüchsigen Sorten hingegen auf 1 Meter.

Fig. 1 stellt eine wurzelächte Rose im ersten Jahre dar. Die junge, aus einem Steckling oder Ableger gewonnene Pflanze besitzt einen oder mehrere ziemlich schwache, an einem kleinen Stamme entwickelte Triebe. Man behält zwei oder drei dieser Triebe bei und schneidet sie mittellang. Im zweiten Jahre schneidet man den Busch hart über der Erde weg. In Folge dieses Schnittes entwickeln sich mehrere kräftige Triebe aus dem Wurzelhalse, welche schon einen hübschen Busch bilden. (Fig. 2.)

Im dritten Jahre wählt man aus diesen die besten Zweige aus und schneidet sie auf 16 Centim. und mehr, um von jedem 2 bis 3 Blüthenzweige zu erhalten. Die anderen aber schneidet man hart über der Erde weg. Auf diese Weise fährt man fort, indem man immer die stärksten Triebe beibehält und dazu hauptsächlich diejenigen wählt, welche regelmäßig genug gestellt sind, um den geforderten rundlichen Busch zu bilden. (Fig. 3.)

Fig. 3.



Man schneidet, wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, alle erschöpften und abgeblühten Zweige hart über den Boden weg, wenn man sie durch junge gerade und kräftige Zweige ersetzen kann, die sich unten am Stock oder unmittelbar aus der Wurzel entwickelt haben. Auch alle schwachen Nebenzweige werden entfernt.

Ist einmal der Busch fertig, so schneidet man die konservirten Zweige in gleicher Höhe je nach der Kraft mehr oder minder hoch, bei Stöcken von mittlerer Kräftigkeit 16 — 52 Centim. Jedes Jahr wird der Schnitt in

derselben Weise ausgeführt, um so immer den Stock aufs Neue zu verjüngen und kräftig zu erhalten.

18. Diejenigen kräftig wachsenden Sorten, welche auf 0,80 bis 1,30 M. geschnitten werden müssen, zieht man zweckmäßiger in Säulen- oder Pyramidenform und verwendet hierzu Pfähle mit kurzen Querhölzern, wozu sich am besten Fichtenstämmchen, an welchen man die Aeste 16 bis 31 Centim. lang oder länger stehen läßt, eignen, indem man an diesen Aststumpfen die Zweige vertheilt anbindet, so daß das Innere hohl bleibt und alle Triebe sich ausbilden können.

Obgleich nun die meisten Rosensorten zu Säulen, niedrig oder hoch gezogen werden können, so sind doch die Arten, die man gewöhnlich unter dieser Benennung versteht, solche, die zum mindestens die Höhe von 2 Meter erreichen. Es giebt viele schöne Sorten, die dies thun, und einige, wenn sie sich erst bewurzelt haben, wachsen, als wenn kein Ende für sie wäre. Um ein kräftiges Wachsthum anzuregen, schneidet man im ersten Jahre ihre Schossen bis auf 2 Augen weg. Von den nun neu sich bildenden nimmt man bald einen Theil hinweg, damit die verschont gebliebenen 2 bis 3 Triebe desto kräftiger sich entwickeln. Um ihre Augen zu gleichmäßiger Ausbildung zu bringen, legt man die Zweige auf den Boden und befestigt sie, damit sie nicht vom Wind bewegt werden, vermittelst Haken. Wenn die Augen anfangen auszutreiben, werden sie dann an den zu bekleidenden Gegenstand aufgebunden oder um ihn herumgeleitet. Unterläßt man das Niederlegen, so bleiben die unteren Augen schlafend und die Säule wird nicht von unten bis oben, wie sich gehört, mit Zweigen bekleidet.

Bei dem im folgenden Jahre vorzunehmenden Schnitt nimmt man wiederum alle neugebildeten Schossen an der Basis bis auf 2 oder 3 der kräftigsten hinweg, um die Pflanze recht dicht und laubreich zu machen. Je weiter man die Säule nach oben verfolgt, um so mehr wird ausgeschnitten, und man wählt zwei der stärksten und am besten gestellten Triebe für die Verlängerung der Säule aus und heftet sie an. Die Seitentriebe von kurzem Wuchse mit gut gereiftem Holze sind diejenigen, welche gewiß Blüthen bringen, und diese schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück, die längeren auf 13 bis 18 Centim.; diejenigen Triebe aber, welche entstandene Lücken ausfüllen sollen, werden auf 2 bis 3 Augen zurückgeschnitten. Diese Verfahrungsweise wird von Zeit zu Zeit fortgesetzt, die Leittriebe werden aufgebunden, bis der zu bekleidende Gegenstand in der gewünschten Höhe bedeckt ist, welche füglich nicht 4 Meter überschreiten sollte.

Während des Sommers und Herbstes pflegen die Säulenrosen in der Regel mehrere kräftige Schossen aus dem Wurzelstocke hervorzutreiben, welche, sobald sie sich zeigen, entfernt werden müssen, bis auf zwei zu Reservezweigen, um gelegentlich entstandene Lücken auszufüllen oder die Säule zu verjüngen. Denn im Allgemeinen behaupten die Zweige der Säulenrosen ihre Kraft nicht für viele Jahre, was wahrscheinlich an dem geringen Schneiden, dem sie unterworfen sind, liegen mag; es gewähren daher die starken Triebe, die aus dem Wurzelstocke hervorkommen, die einzige Möglichkeit einer vollkommenen Wiederherstellung. Auch in den oberen Theilen der Säulenrosen ist es nothwendig, die unnöthigen starken Schossen zu entfernen; das Holz der andern wird dann weit vollkommener und reifer und leidet nicht so leicht von Fröſten.

Geschieht das Schneiden der Säulenrosen zweckmäßig, so muß die Säule schön und regelmäßig bekleidet und in der Blüthezeit von der Spitze bis zum Boden mit Blumen bedeckt sein. Ist die Pflanze einmal gebildet, so sind Massen von Blüthen das, was man sucht, und nicht die Größe der einzelnen. Die Scheere darf dann nur wenig angewendet werden, es sei denn, daß eine Verjüngung nothwendig wäre.

19. Unter Kletterrosen, welche von vielen als gleichbedeutend mit Säulenrosen betrachtet werden, versteht man die noch kräftiger wachsenden Sorten, welche einen windenden Stamm und hängenden Habitus besitzen. Man wendet sie mit Vortheil da an, wo kahle Bodenflächen zu bedecken oder Gitterwerk, Mauern, Einfriedigungen, Lauben, Bogen u. dergl. zu bekleiden sind. Der Schnitt solcher Rosen weicht nur wenig von dem im vorhergehenden §. beschriebenen ab, und ist auch hier das Bedürfniß der beste Rathgeber. Tiefschnitt wird nothwendig, wenn man einige lange Triebe erzeugen will, Hochschnitt, wenn sich viele weniger lange Triebe bilden sollen. Ist die ebene oder bogige Fläche vollkommen bekleidet, dann kommt es allein auf Erzeugung eines reichen Blüthenansatzes an, was man durch Auslichten schwacher, schlecht gewachsener und veralteter Zweige, sowie hauptsächlich durch sehr mäßiges Stutzen der Triebe blos um wenige Augen, erreicht.

20. Das Schneiden der veredelten Rosen unterliegt denselben Regeln, welche bei den wurzelächten zu beobachten sind; nur muß man dabei stets Rücksicht auf die der Krone gegebene Form nehmen. Doch in gewisser Hinsicht erleiden hier die allgemeinen Regeln des Beschneidens einige Ausnahmen. Durch die Veredelung werden manche starkwüchsige Sorten, welche sonst wurzelächt ungern blühen, in ihrem üppigen Wachsthum gezähmt

und dadurch zur Erzeugung vieler Blüthen gleichsam gezwungen, wie dies bei den meisten Noisette-Rosen der Fall ist. Die von Natur zart- und schwachtreibenden Rosen hingegen werden durch die Veredlung oft gekräftigt, oft aber auch noch schwächer, als sie vorher waren. Hier muß die Erfahrung lehren, welche Rosen den Tief- oder Hochschnitt erfordern.

Die Formen, welche man den veredelten Rosen giebt, bedingen ein verschiedenes Verfahren beim Beschneiden, um die gewählte Gestaltung zu erzielen.

Zu besserem Verständniß mögen nachfolgende Benennungen dienen, als, die ersten Edelzweige: Grundäste; das daraus erwachsene Holz: Mutterzweige; und das demselben entspringende: Tochterzweige.

21. Die Erzielung der Kugelform wird wie bei jeder andern Form schon gleich nach dem ersten Jahre der Veredlung begonnen. Ist die Rose an zwei Stellen veredelt, und haben sich die Edelaugen zu Trieben von 31 Centim. Länge entwickelt (Fig. 5 D), so werden sie an einen 63 Centim. langen Stab (E), welchen man am Stamme zweimal befestigt, so daß er ohngefähr 36 Centim. über denselben hinausgeht, angebunden, um sie in vertikale Richtung zu bringen und gegen das Abbrechen zu sichern. Der aus dem Edelauge entstandene Zweig, also der spätere Grundast, entwickelt sich, wenn es sonst eine kräftig wachsende Sorte ist, zu ansehnlicher Länge. Ist die Sorte von weniger kräftigem Wuchse, so bringt der Edelzweig, wenn er die Länge von 36 Centim. erreicht hat, ein Blumenbouquet, dessen Erhaltung jedoch den Stock bedeutend schwächt. Um diesem Nachtheile vorzubeugen, schneidet man den Edeltrieb, wenn er 31 Centim. lang geworden ist, auf 21 Centim. zurück. Durch diese Operation entwickeln sich die seitlichen Augen und es wird dadurch schon im ersten Jahre eine Art von Krone gebildet. — Theerosen aber dürfen wegen ihrer besonderen Vegetationsweise nicht, wie eben angegeben, behandelt werden. Die seitlichen Zweige des Haupttriebes entwickeln sich kräftig, auch ohne daß sie durch das Schneiden oder Auskneipen hervorgelockt werden. — Von Vortheil ist es, die Blumen im ersten Jahre ganz zu unterdrücken, hauptsächlich bei denjenigen Sorten, welche schon an ganz kurzen Trieben blühen und somit eine schwache Krone bilden. Wenn man aber die Blumen wegnimmt, so hüte man sich wohl, einen Theil des Zweiges mit wegzuschneiden, um etwa ein Bouquet zu binden, denn auch dadurch wird der Stock geschwächt.

Ist einmal der Rosenstock an den für ihn bestimmten Platz gepflanzt, so schneidet man ihn jedes Jahr, um der Krone eine passende Form zu sichern. Eine Rosenkrone, wenn sie schön sein soll, muß auf einem Hoch-

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6.



stamme eine Laubkugel bilden, auf der die Blumen regelmäßig vertheilt sind. Es handelt sich also darum, alljährlich im Bereich der Krone eine passende Anzahl von jungen blühenden Zweigen zu erzeugen, welche regelmäßig in einen rundlichen Kopf gestellt sind. Um dieses Resultat zu erzielen, verfahre man nach folgenden Grundsätzen.

Eine Krone entwickelt sich bei der Rose in der Weise, daß jeder Mutterzweig zwei Tochterzweige erzeugt. Im ersten Jahre haben wir also den Stamm, welchem die beiden Edelaugen (Fig. 4 A) aufgesetzt sind*); im zweiten Jahre bilden sich, wenn man auf das schlafende Auge okulirt hat, die beiden Gründäste, dann auf jedem derselben zwei Mutterzweige; im dritten Jahre treten auf jedem Mutterzweige zwei Tochterzweige auf, so daß wir deren im ganzen acht besitzen. Hat man erst diese Anzahl erhalten, so vermehrt man sie nicht weiter, wenn nicht der Stock besonders kräftig ist. Meistens aber ist diese Anzahl ausreichend, denn jeder dieser

*) Siehe Kap. 7. §. 86 im dritten Abschnitt: „Vermehrung durch Okulation."

acht Tochterzweige erzeugt in jedem Jahre drei oder vier Blüthenzweige, so daß jährlich 25 blühende Zweige auf eine Krone kommen, wenn der Stock von mittlerer Kraft ist. Hat man einmal die hinreichende Zahl von Mutterzweigen, so nimmt man beim Schneiden Rücksicht, daß man nur immer diese Zahl behält.

Der Schnitt eines Zweiges hat also die Folge, daß er sich theilt, indem sich aus seinen Endaugen 2 bis 3 Verzweigungen (Fig. 6) entwickeln. Wollte man aus diesen auch drei Holzzweige bilden, so würden dieselben meistens eine ungleiche Stärke enthalten. Der dritte, zu unterst gestellte, würde schwächer werden, als die beiden andern. Man muß deshalb nicht mehr als zwei Tochterzweige auf einem Mutterzweige für ein Jahr erzeugen wollen.

Nehmen wir also an, es habe der Rosenstock auf den Grundästen je zwei Mutterzweige gebracht (Fig. 7), letztere würden im Juli auf 21 Centim.

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.



geschnitten, um sie zur Entwickelung neuer Triebe anzuregen, so haben wir dann vier Zweige. Im zweiten Jahre entwickelt jeder dieser vier Zweige wieder mehrere Verzweigungen, von denen man aber auf jedem wieder nur zwei Zweige läßt, was zusammen acht giebt (Fig. 8.). Diese acht Zweige werden weiterhin nicht mehr vermehrt. Bei jedem Schnitt schont man nur denjenigen Tochterzweig, welcher am kräftigsten ist, die beste Stellung hat und zugleich der Basis des Mutterzweiges am nächsten steht, wobei man den Vortheil erhält, bei jedem Schnitte die Länge desselben reduciren zu können (Fig. 9).

Indeß darf man doch nicht auf eine zu große Verkürzung des Mutterzweiges hinarbeiten und etwa mehr als zwei Jahre altes Holz wegnehmen, weil dadurch zu bedeutende Verwundungen entstehen und die Krone zu

Fig. 10.



Grunde gerichtet werden würde. Man ſchneidet auch über den Räuberzweigen, welche an der Baſis ſtarker Aeſte hervorzukommen pflegen, das alte Holz nur in dem Falle weg, wenn dieſes ſchlecht, unkräftig und zu lang, eine Verjüngung der Krone mithin wünſchenswerth geworden iſt.

Schneidet man nun fernerhin, ſo unterſucht man erſt den Beſtand an Tochterzweigen. Aus dieſen wählt man die hinreichende Anzahl kräftiger Zweige, welche zugleich ſo geſtellt ſind, daß ſie einen regelmäßigen, innen lichten Kopf bilden, ſchneidet alles über ihrem Anheftungspunkte ſtehende alte Holz weg, und entfernt auch ſonſt alle unnütze, zu ſchwache, ſchlechtgeſtellte Zweige (Fig. 10). Die ſchwachen Reiſer werden jederzeit vollſtändig unterdrückt, wenn man ſie nicht etwa dazu braucht, entſtandene Lücken durch ſie und ihre Ausſchößlinge auszufüllen. Gleichfalls unterdrückt man alle Zweige, welche in das Innere der Krone hineingewachſen ſind, die erdwärts gerichteten, Knorren alten Holzes und ſteril gewordene Zweige; ebenſo auch die Räuberzweige, welche ſich an der Baſis der Aeſte und an dem Veredlungswulſt gebildet haben, wenn man ſie nicht zum Erſatz alten oder zu ſehr verlängerten Holzes nöthig hat *).

*) Ich empfehle hier nochmals das in §. 16 angegebene Ausbrechen der überflüſſigen Augen. Wird dies richtig betrieben, ſo hat man ſelbſtverſtändlich nicht

Es ist sehr nachtheilig, die Krone alljährlich bis auf die jungen an der Basis erzeugten Zweige abzuwerfen, indem man dadurch bedeutende Verwundungen verursacht und einen wahren Weidenkopf macht. Dazu darf man nicht eher seine Zuflucht nehmen, als bis es vortheilhaft ist, die Krone vollständig umzuformen. Man darf nicht vergessen, daß jede starke Verletzung den Organismus abschwächt. Ein Rosenstock, der einmal im Zuge ist, hat, wie vorhin bemerkt, acht Tochterzweige, welche in Vasenform geordnet sind. Man schneidet sie alle in gleicher Höhe, auf zwei oder drei kräftige gut gestellte Augen, d. i. ohngefähr 10 Centim. Die weiter unten angehefteten Zweige werden, wenn der Schnitt bei ihnen mit den Schnitten bei den höher stehenden in gleichem Niveau sein soll, etwas länger gelassen. Uebrigens ist die Kraft der Vegetation für einen höheren oder tieferen Schnitt maßgebend, wie schon früher bemerkt worden ist.

Häufig gründet man die Krone auf die Basis der Grundäste und jeder neue Schnitt geht auf sie zurück. Man bezweckt zwar durch diese Praxis ein gedrängteres Wachsthum, aber die zahlreichen auf eine Stelle sich zusammendrängenden Wunden und Narben führen bald den Ruin der Krone herbei, wie aus Fig. 12 auf Seite 27 ersichtlich ist. Es ist daher zu vermeiden, die erste Theilung der Zweige aus der Basis des Edelreises entspringen zu lassen. Die Veredlung an sich hält schon die freie Cirkulation des Saftes auf; die Geburtsstätte der zweiten Generation ist wieder ein Punkt, an welchem der Saft anhält, um sich gewaltsam durchzuarbeiten. Es ist somit leicht begreiflich, daß der Saft, wenn diese zwei Punkte und vielleicht noch ein dritter Anhaltepunkt unmittelbar übereinander liegen, in seinem Laufe doppelt und dreifach gehemmt sein muß. Darum hat man stets Bedacht darauf zu nehmen, daß der erste Theilungspunkt 10 bis 14 Centim. über der Veredlungsstelle liegt (Fig. 11). Diese Praxis gewährt, wie sich aus dem vorigen ergiebt, den Vortheil einer leichteren Cirkulation des Saftes und günstige Gelegenheit, die Krone, wenn sie übel geformt sein sollte, zu erneuern.

Es ist nicht in allen Fällen und immer ganz genau möglich, diesen Angaben Folge zu leisten. Denn manche Rosen, bei denen die Grundlage der Krone nicht nach den angegebenen Grundsätzen gelegt wurde, zeigen ein gar zu unregelmäßiges Wachsthum, als daß obige Vorschriften in ihrer ganzen Bestimmtheit ausgeführt werden könnten. Aber doch muß man beim

---

nöthig, die daraus später und zwar schon zum Nachtheil der Pflanze entstandenen unnützen Zweige zu entfernen.

Fig. 11.

Fig. 12.



Schneiden das Gesagte soviel wie möglich im Auge behalten, wenn man eine leidlich regelmäßige Krone haben will. — Sehr häufig nimmt man die Zweige, wo sie sich finden, schneidet sie sehr kurz, schneidet dabei stark auf altes Holz und erhält schließlich eine wirre Krone, verunstaltet durch Narben und vertrocknete Knorren.

22. Beim Schnitt der Pyramidenform verfährt man im Allgemeinen nach denselben Grundsätzen, wie sie im vorhergehenden §. angegeben worden. Die Höhe des Stammes ist in keiner Weise für den Schnitt maßgebend, jedoch sollte derselbe niemals über 63 Centimeter hoch sein. Vielmehr hat man beim Schnitt sein Hauptaugenmerk darauf zu richten, daß die Zweige, die sich den Umrissen einer Pyramide gemäß in verschiedener Länge entwickeln sollen, auch in verschiedener Weise geschnitten werden müssen, während bei der Kugelform der Schnitt ein ziemlich gleichmäßiger ist.

Die Grundlage einer Rosenpyramide bilden ein oder zwei lange Triebe, welche sich, nachdem man die ersten Erzeugnisse des jungen Rosenstocks beim Schneiden eben so behandelt, als wie bei der wurzelächten Rose und dem Kronenstamme angegeben wurde, im zweiten Jahre an der Basis entwickeln, die man ungehindert wachsen läßt. Die älteren an der Basis befindlichen Zweige werden auf 3 bis 5 Augen geschnitten; die eben gedachten Triebe schneidet man nur in soweit zurück, als das Holz nicht reif geworden ist.

Mehr als zwei solcher Triebe dürfen nicht geduldet werden, die überflüssigen müssen schon im Entstehen unterdrückt werden. Bei diesen beiden Trieben hat man darauf zu sehen, daß alle Augen vom untersten bis zum obersten gleichmäßig austreiben, was man dadurch erreicht, daß man die Triebe, sowie die neue Vegetation beginnt, in eine horizontale Lage bringt. Sind die Augen 1 bis 3 Centim. lang ausgetrieben, so giebt man den Zweigen ihre natürliche vertikale Stellung wieder, damit die jungen Triebe nach allen Seiten hin gleichmäßig sich ausbreiten.

Die neugebildeten Seitentriebe werden im folgenden Jahre wieder auf 3 bis 5 Augen geschnitten und rücksichtlich auf den pyramidalen Umriß hält man die unteren länger, die oberen kürzer.

Außer den verschiedenen Varietäten der Remontante-, Bourbon- und Noisettegruppe, der Noisette-, Bourbon- und Bengalhybride, der weißen Rose (R. alba), der Centifolie und der Damascenerrose eignen sich viele der sogenannten rankenden Rosen dazu, vorzüglich schöne Pyramiden zu bilden. Letztere brauchen weit weniger Zeit, um die ganze Anmuth der Form zu entfalten, wie die zuerst genannten Sorten. Die Zweige der rankenden Rosen sind meist sehr lang gezogen und schwach, so daß sie sich nicht selbst tragen und gestützt werden müssen. Zu diesem Behufe schlägt man einen Pfahl von 4 Meter Länge neben der Rose in die Erde. Rund um denselben in einem Kreise von 63 Centim. Halbmesser werden 6 bis 8 47 Centim. lange Pflöcke so tief in den Boden getrieben, daß sie nur 3 Centim. über der Erde stehen. An diese Pflöcke befestigt man galvanisirten Eisendraht, zieht denselben über den Pfahl hinweg, schlingt ihn um einen an der Spitze des letzteren eingeschlagenen starken Nagel und führt ihn auf der entgegengesetzten Seite wieder herunter, wo man ihn an dem entsprechenden Pflock befestigt. An diesem Drahtgerüst werden die langen Zweige, denen man nur ihre nicht ausgereiften Spitzen nimmt, gleichmäßig vertheilt und mit dünnen Weidenruthen oder Bast angeheftet, welche Arbeit so oft, als sie sich nöthig macht, wiederholt werden muß. Da derartige geformte Rosen nicht gut gedeckt werden können, so sind harte Sorten, welche keines Winterschutzes, oder wenigstens nur eines leichten Mantels von Nadelreisig, Stroh oder Rohr bedürfen, wobei die Pflanze aufrecht stehen bleiben können, zärteren weit vorzuziehen.

23. Trauerrosen nennt man die auf Hochstämmen gezogenen Rosensorten von starkem Wuchse und hängendem Habitus. In der ersten Zeit der Erziehung schneide man die Zweige kurz, damit sie recht kräftige Triebe entwickeln; die dünnen Triebe schneide man aus. Beim nächsten Schnitte

entferne man alle senkrecht in die Höhe gehenden Triebe, wiederhole das Auslichten der Krone und verkürze die Haupttriebe um einige Centimeter. Von jetzt an lasse man die Haupttriebe ungestört wachsen, bis sie den Boden erreichen, und stutze nur die Seitentriebe um einige Augen ein. Durch die hängende Lage der Zweige wird der Zufluß des Saftes mehr ausgeglichen, die Augen werden regelmäßig der ganzen Länge nach ausbrechen, von oben bis zum Boden die ganzen Zweige entlang Blüthen erzeugen und so in Gestalt einer schönen Halbkugel eine einzige Blumenmasse bilden. Haben sich die Zweige zu einiger Länge entwickelt, so bringe man, um sie gegen die zerstörende Einwirkung des Windes zu sichern und sie zweckmäßig ordnen zu können, im Innern der Krone einen Reifen oder ein Drahtgeflecht in Form eines Schirmes an. Man kann auch die Zweige vermittelst starker Bastfäden an in den Boden geschlagenen Pflöcken befestigen.

Viertes Kapitel.

Das Niederhaken der Rosen.

24. Das Verfahren, die Zweige der Rose niederzulegen und an der Oberfläche des Bodens mittelst hölzerner Haken zu befestigen, wendet man nicht nur, wie hier und da gebräuchlich, bei Monatsrosen an, um dadurch eine Art von Blumenteppich zu bilden, sondern es läßt sich auch mit gutem Erfolg bei Rosen aus anderen Gruppen anwenden. Selbstverständlich lassen sich hierzu nur wurzelächte oder niedrig veredelte Rosen verwenden. Besonders ist es bei solchen Sorten vortheilhaft, die lange starke Triebe bilden, welche die Pflanzen verunstalten, aber doch nicht weggeschnitten werden können, weil es sonst an Holz fehlt und sich immer mehr ähnliche Triebe bilden.

Beabsichtigt man die Zweige der Rosen niederzulegen, so darf während des Sommers nur dann geschnitten werden, wenn eine Lücke in der Verzweigung ausgefüllt werden soll. In diesem Falle nimmt man einen Zweig weg, um zwei oder mehrere dafür wieder zu erhalten. Bei schon vollständig ausgebildeten Rosen, die man im nächsten Frühjahre niederzuhaken gedenkt, schneide man im Herbste das alte und kraftlose Holz hinweg, kürze

die jungen Triebe um einige Centimeter, und im Fall es gegen Frost empfindliche Sorten sind, lege man sie nieder und schütze sie durch eine Erddecke oder ein anderes Deckmaterial, wie im sechsten Kapitel angegeben. Im Frühjahr, sobald kein zu starker Frost mehr zu erwarten ist, wird die Decke entfernt und die Zweige werden nach allen Richtungen hin regelmäßig vertheilt, auf den Boden, oder noch besser auf 5 — 8 Ctm. über dem Boden ausgespannten Draht, ausgebreitet und befestigt. Während bei den in ihrer natürlichen Stellung verbleibenden Zweigen nur die oberen Augen zur Entwickelung kommen, die unteren aber in schlafendem Zustande verharren, treiben bei den niedergehakten alle Augen, vom obersten bis zum untersten, gleich kräftig aus und erzeugen eine Menge von Blumen, welche sich auch noch durch besondere Vollkommenheit auszeichnen.

Da durch das Niederhaken der Zweige die Saftbewegung in dem horizontal ausgebreiteten Holze verlangsamt wird, so werden im Frühjahr mehrere sehr kräftige Triebe zur Entwickelung kommen. Dieselben sind aber zu geil, um schon im Laufe des Sommers einen Flor zu erzeugen, dagegen liefern sie einen reichen Beitrag zum Herbstflor, so daß durch diese Methode die Florzeit verlängert wird. Ferner pflegen Sorten, welche häufig verkrüppelte Blumen hervorbringen, an niedergehakten Zweigen einen vollkommenen normalen Flor zu erzeugen.

Die niedergehakten Zweige werden im Herbste, wenn die Blüthe vorüber ist, weggeschnitten, dafür aber treten die neuen Triebe ein und müssen in der angegebenen Weise gegen den Frost geschützt werden.

Fünftes Kapitel.

Sonstige Verrichtungen im Laufe des ganzen Jahres.

---

1. Bodenlockerung und Düngung.

25. Nach Entfernung des Winterschutzes von denjenigen Rosen, welche einen solchen erfordern, sowie dem Beschneiden, wenn es nicht schon im Herbste geschehen ist, muß der Boden unter sorgfältiger Schonung der Wurzeln gelockert und zugleich gekräftigt werden. Hierzu bedient man sich am

besten eines fetten, vollständig verwesten Düngstoffes, oder eines guten, aus verwestem Kuhlager oder Abtrittsdünger, altem Lehm, Ofenruß und Lauberde bestehenden Kompostes, womit man den Boden gleichmäßig überzieht und mit untergräbt. Stehen derartige Dungstoffe nicht zu Gebote, so gebe man, wenn keine starken Fröste mehr zu erwarten sind, bei warmem Regenwetter, oder an trüben Tagen einen kräftigen Düngerguß, bestehend in Kuh- oder Abtrittsjauche, Guano-, Malzkeim- oder Hornspänewasser, welchen man beim Erscheinen der Knospen und nach der Blüthe beim Beginn des zweiten Triebes wiederholt. Das Auflockern der Oberfläche des Bodens muß im Laufe des Sommers ebenfalls wiederholt werden, so oft als sie in Folge des Gießens oder starker Regengüsse anfängt hart zu werden. Das bei trocknen Sommern sich nöthig machende häufige Gießen läßt sich dadurch bedeutend vermindern, daß man das in §. 9 schon angegebene Bedecken des Bodens mit kurzem Stallmist anwendet.

Beim Auflockern und Düngen im Frühjahr erneuert man zugleich auch die schadhaft gewordenen Pfähle der hochstämmigen und Säulen-Rosen, alle lose und zu schlecht gewordenen Bänder, womit die Rosen befestigt sind, ferner alle unleserlich werdenden Etiketten.

2. Das Reinigen von Schmarotzern und Insekten *).

26. Mit den im vorhergehenden §. angegebenen Arbeiten wird zugleich auch das Reinigen der Rosen von Moos und Flechten und den in den Spalten der Rinde versteckten Insekten vorgenommen. Am besten bewirkt man dies durch Ueberpinseln mit Kalkwasser oder durch Bürsten mit Lauge oder Seifenwasser.

Bei fortschreitender Entwickelung der neuen Triebe hat man ferner stets ein wachsames Auge auf den Rosenblattwickler zu halten, welcher, wenn ihm gestattet ist, seine Verwüstungen fortzusetzen, den frühen Blumen sehr verderblich ist. Das wohl einzig wirksame Mittel ist, in den ersten Wachsthumsperioden die jungen Triebe fleißig zu durchsuchen und die Zerstörer zu tödten. Die Blattlaus ist überall in Menge, aber es fehlt auch nicht an Mitteln, sie zu vermindern und zu vertilgen, z. B. durch Abkehren mit einer weichen Bürste in ein darunter gehaltenes Gefäß, durch Bespritzen mit einem Absud von Tabak oder einer Auflösung von Aloe succotrina. Durch Bepudern mit Tabaksstaub und Ruß, nachdem man vorher

*) Ausführlicher im fünften Abschn.: „Feinde der Rosen."

die Pflanze befeuchtet hat, damit der Puder daran hängen bleibt, werden sie ebenfalls vernichtet. Sobald aber dieses Mittel seine Wirkung vollbracht hat, muß man die ganze Pflanze tüchtig mit reinem Wasser abbrausen, damit sie wieder rein wird. Ein gutes Mittel ist auch, die Pflanzen mit Tabak einzudämpfen. Um dies im Freien zu bewerkstelligen, steckt man zwei sich gegenüberstehende Pfähle an die Pflanze, spannt von einem Pfahl zum andern einen Reifen über die Krone, darüber bringt man ein Tuch (welches ordentlich naß gemacht werden muß, damit es dicht wird), von der Größe, daß es die ganze Krone einhüllt und unterhalb derselben zugebunden werden kann; hierauf wird vermittelst des Räucherblasebalges der Tabaksdampf hineingeblasen.

3. Ausbrechen von Augen und Blüthenknospen, Anbinden der Zweige während der Blüthe, Sommerschnitt.

27. Sobald sich Augen zu überflüssigen Trieben entwickeln wollen, wird mit dem in §. 16 besprochenen Ausbrechen derselben begonnen. Die bei Stammrosen oft aufschießenden Wurzelausläufer und am Wildstamm hervorkommenden Triebe sind, wenn sie sich zeigen, ebenfalls zu entfernen, da sie die Pflanze entkräften. Bei den von unten aus dem Boden kommenden Ausläufern ist es nöthig, die Erde behutsam wegzunehmen, um sie dann dicht an ihrem Entstehungspunkte wegschneiden zu können.

Sobald sich die Blumenknospen gebildet haben, und man großen Blumen den Vorzug vor der Menge giebt, ist es vortheilhaft, zuerst diejenigen, welche unvollkommen, sodann die, welche die kleinsten sind, sowie die, welche am meisten noch zurückgeblieben erscheinen, wegzukneipen. Bei denjenigen Rosen, welche in Büscheln blühen, ist es gut, die Mittelknospe auszubrechen, da sie oft unvollkommen gebildet ist und durch ihre Entfernung mehr Raum für die sie umgebenden gewonnen wird, die dann desto schöner blühen.

Während der Blüthezeit hat man bei den hochstämmigen Rosen darauf zu sehen, daß kein Zweig durch die Last der Blüthen, oder vom Winde stark hin und herbewegt, abbricht. Solche Zweige müssen an den Pfahl oder andere stärkere Zweige angebunden werden.

Nach der Blüthezeit werden die abgeblühten Zweige sehr mäßig (bis auf das nächste kräftigste Auge, es pflegt meistens das zweite von oben herab zu sein) beschnitten und dabei das in §. 15 angegebene Verfahren des Sommerschnittes angewendet.

Beim Eintreten des Herbstes sorge man dafür, daß alle im Laufe des Sommers erzeugten Triebe noch gehörig ausreifen, um den Winter ungefährdet überstehen zu können. Zur Erleichterung der von der Natur zu verrichtenden Arbeit trägt das Abschneiden der Blätter und der noch krautigen Spitzen dazu bei.

4. Verjüngung der Rosen.

28. Fangen die Rosen an, schwache Triebe zu machen, die selten die gehörige Reife erlangen, und ist das Laub von kümmerlichem, krankhaftem Ansehen, werden auch die Blumen kleiner und verkrüppeln sogar, so ist es hohe Zeit, eine Verjüngung vorzunehmen, um ihnen durch diese Operation neue Lebenskraft zu verleihen. Um dies zu bewerkstelligen, hebe man die Rosen zeitig im Herbste aus und verkürze die gewöhnlich sehr stark entwickelten, aber aller Saugfasern entbehrenden Wurzeln, welche nicht mehr im Stande waren, Nahrung aufzusuchen und aufzunehmen. Ist man genöthigt, sie wieder auf denselben Standort zu bringen, so schlage man sie einstweilen gut ein, bedecke sie gegen Frost und verschiebe das Pflanzen bis zum Frühjahr. (Hat man einen andern Platz für sie bestimmt, so läßt man sie auf ihrem alten Standort stehen, bis das Umpflanzen vor sich gehen kann.) Den sie wieder aufnehmenden Boden rigole man 63 Centim. tief, versorge ihn reichlich mit gutem, völlig verwestem Dünger, oder entferne die alte Erde ganz und ersetze sie durch eine gute kräftige neue. Diese totale Erneuerung wirkt um desto günstiger auf ein zukünftiges kräftiges Wachsthum. Beim Zurückschneiden der Zweige, welches, wenn die Pflanzung im Herbste vorgenommen wird, erst im darauf folgenden Frühjahre geschehen darf, entferne man alles schwache, überflüssige Holz gänzlich und lasse nur die zur guten Form der Pflanze nöthigen Leitzweige stehen, welche man, je nachdem es der Zustand der Wurzeln und überhaupt der ganzen Pflanze erfordert, auf 2 bis 4 Augen zurückschneidet. Im ersten Jahre muß man allerdings auf vollkommene Blüthen verzichten und es ist überhaupt besser, dieselben gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, sondern sie sogleich bei ihrem Erscheinen zu Gunsten der Vegetation zu entfernen. Im zweiten Jahre dagegen wird man die vorher hinfällige Rose wieder in vollem Blätter- und Blüthenschmuck prangen sehen.

An einzelnstehenden veredelten Rosen, bei welchen man überhaupt die Verjüngung nur beim dringendsten Bedürfnisse und zwar mit großer Vorsicht vornehmen darf, wird schon dadurch ein sehr günstiger Erfolg erzielt, wenn

man im Frühjahre rings um die Wurzeln, ungefähr 31 Centim. tief und 16 Centim. breit, die ausgesogene Erde herausnimmt, und sie durch die oben angegebene Kompostmischung wieder ersetzt.

29. Von eben so großem Vortheile ist es, sogleich beim Pflanzen an jedem Stocke, mindestens $\frac{1}{8}$ Meter vom Stamm entfernt, zwei Drainröhren gegenüberstehend senkrecht in die Erde zu stecken und, so oft als es nöthig thut, in diese von einem der oben angegebenen Düngerwasser zu gießen, um hierdurch eine Untergrundsdüngung zu bewirken. Durch die Drainröhren wird auch noch ein zweiter Vortheil hervorgerufen, nämlich die auf das Gedeihen der Pflanze so wohlthätig wirkende Bodenlüftung.

Sechstes Kapitel.

Ueber den Winterschutz*).

30. Beim Herannahen des Winters biegt man die gegen Frost empfindlichen, sowohl wurzelächten, als hoch- und niederstämmigen Rosen zur Erde und hält sie vermittelst hölzerner Haken oder über das Kreuz gesteckter Pfählchen nieder. Die Stammrosen sind jedes Jahr nach ein und derselben Seite zu biegen, da sie sehr leicht abbrechen, wenn sie nach einer andern Seite, als der gewohnten, gebogen werden. Kann man sogleich die an Ort und Stelle befindliche Erde zum Bedecken benutzen, so muß es geschehen, noch bevor der Boden zu fest friert. Ist man dagegen genöthigt, anderes Deckmaterial beizuschaffen, so ist nichts versäumt, wenn dies über die niedergelegten Rosen erst gebracht wird, wenn der Boden schon etwas fest gefroren ist; aber jedenfalls geschehe es vor eintretendem Schneewetter, indem dadurch die Arbeit sehr erschwert und unangenehm wird. Das zu frühzeitige Decken verzärtelt die Pflanzen. Auch entferne man die Decke nicht zu spät, um die Rosen nicht zu früh zum Austreiben zu veranlassen und gegen Spätfröste um so empfindlicher zu machen. Schon im März sorge man dafür,

*) Welche Rosen des Winterschutzes in unserm nördlichen Klima bedürfen, ist im sechsten Abschnitt näher angegeben.

das Deckmaterial aufzulockern und zu verdünnen, damit sich die Pflanzen nach und nach an die freie Luft wieder gewöhnten, und einige Wochen später entferne man bei trüber Witterung dasselbe ganz. Die hochstämmigen Rosen befestige man jedoch nicht sogleich an den Pfählen, indem der festangebundene Stamm bei noch etwa nachfolgenden starken Frösten leichter leidet, als wenn er vom Winde frei bewegt werden kann.

Auf trocknem Boden ist eine 10—16 Centim. hohe Erdbedeckung einer jeden anderen vorzuziehen. Auf nassem Boden kann man sich dadurch helfen, daß man unter der Krone erst einen kleinen Hügel von Erde, Lohe, Sägespänen, gesiebter Steinkohlenasche oder dergl. anbringt. Die Erde, welche man über die Krone bringt, muß ebenfalls in einem runden oder länglichen Hügel, je nachdem es die zusammengebundenen Zweige erfordern, aufgeworfen und dann mit dem Schaufelrücken noch glatt gedrückt werden, damit die Feuchtigkeit von oben weniger eindringen kann, sondern mehr nach den Seiten abläuft. Bei vielen zarteren Rosen, besonders aus den Gruppen der Thee-, Bengal-, Bourbon- und Noisetterosen ist jedoch eine bloße Erddecke nicht hinreichend, sondern man muß über den Erdhügel noch eine Schicht Laub und darüber Nadelreisig bringen.

Wo man nicht mit Erde decken kann, da empfiehlt sich für die meisten weniger zärtlichen Rosen ganz besonders das Nadelreisig von Fichten oder Weißtannen. Unter einer solchen Decke genießen sie nicht nur hinreichenden Schutz, sondern auch Luft genug, um darunter weder zu ersticken, noch durch die zu große Nässe des Thauwetters oder Regens von Fäulniß befallen zu werden. Bei Rosen, welche auf Beeten nahe beisammen stehen, kann man in der Mitte desselben eine Stange oder Latte, auf gabelförmigen Pfählen ruhend, oder sonst an gewöhnlichen Pfählen befestigt, anbringen; auf beiden Seiten werden dünne Pfähle an die Stange angelegt und mit Weiden oder Bindfaden befestigt, darauf kommt nun das Nadelreisig zu liegen. Hierunter haben die Rosen von der Last des Reises nicht zu leiden und erhalten doch hinlänglichen Schutz, selbst gegen strenge Kälte.

Bei runden Beeten schlägt man einen starken Pfahl in der Mitte des Beetes ein, legt so viel Stangen, als nöthig sind, das Reisig zu tragen, von der Peripherie aus an den Pfahl an zu einem runden Dache und befestigt sie an demselben vermittelst Nägel oder durch ein Geflecht von Weiden oder Bindfaden. Will man zartere Rosen in dieser Weise schützen, so ist es auch nöthig, dem Boden erst eine Decke von trocknem, nicht leicht faulendem Laube, als von Eichen, Buchen, Platanen oder Nadelstreu zu geben, und über das Reisig bringt man noch ein Stroh- oder Schilfdach, wodurch

die Nässe gänzlich und auch die Kälte noch mehr abgehalten werden kann. Auch empfiehlt es sich, bevor man den Boden bedeckt, um die Wurzelhälse herum die Erde heranzuziehen, um dieselben gegen das Erfrieren zu schützen. Bei gelindem Wetter gestattet man Luftzutritt vermittelst einiger Oeffnungen, welche leicht herzustellen sind, unterlasse jedoch das Lüften so lange, als es inwendig noch gefroren sein sollte, indem der schroffe Wechsel von Frost und Wärme am nachtheiligsten auf die Pflanzen einwirkt.

Ferner benutzt man außer den schon angeführten Materialien, besonders für zartere Rosen, Moos, Sägespäne, Lohe, klare Holzabfälle aus Holzställen und Holzlagern, gesiebte Steinkohlenasche, Holzkohlenstaub, Holzasche, feinen Fluß- oder Grubensand und Flachsscheben. Letztere eignen sich besonders wegen ihrer Leichtigkeit und Trockenheit, wobei sie dennoch ziemlich dicht liegen, zur Bedeckung zarter Rosen. Die Trockenheit des Materials ist es, welche die Pflanzen weit mehr vor dem Erfrieren schützt, als die große Menge. Ebenso genügt es nicht, einen gewissen Stoff überhaupt anzuwenden, sondern ihn so anzuwenden, daß er seine Trockenheit möglichst bewahrt, und dieses wird nur dadurch erreicht, daß man ihn in einem abgedachten Hügel aufwirft, von welchem das Wasser leicht nach allen Seiten ablaufen kann und nicht in das Innere dringt. Ueber diesen Hügel bringt man noch eine dünne Laubdecke, durch welche das Wasser vollständig nach außen geleitet wird, wenn man die Vorsicht gebraucht, mit dem Schichten des Laubes von der Mitte aus anzufangen, wodurch die Blätter dachziegelartig übereinander zu liegen kommen. Das Laub bedeckt man noch mit etwas Nadelreisig, damit es nicht vom Winde weggeführt werden kann.

Hat man zum Decken blos Laub und Nadelreisig, so ist es nöthig, die Krone erst ganz mit Nadelreisig zu umgeben, darüber bringt man eine 16 Centim. starke Laubdecke und über diese so viel Zweige, als nöthig sind, das Laub gegen die Einwirkung des Windes zu schützen. Kann man ein Rosenbeet oder auch die niedergelegten Kronen einzeln stehender Rosen mit einem Bretter- oder Strohdach gegen Nässe schützen, so kann das Laub (vorausgesetzt, daß es trocken ist) unmittelbar auf die Zweige gelegt werden.

Es sei noch besonders bemerkt, daß das Eingehen der meisten zarteren Rosen während des Winters nicht sowohl seinen Grund hat im Erfrieren, als vielmehr in dem Vermodern der Rinde der nicht hinlänglich gereiften Herbsttriebe durch zu warme und ungeeignete Bedeckung, welche unmittelbar an die Pflanze selbst gebracht ist. Nicht zu empfehlen sind das Laub von Kastanien, Linden, Akazien, Birken u. s. w. oder sonstige krautige leicht faulende Ueberbleibsel aus dem Garten. Selbst Stroh in unmittelbare Be-

rührung mit den zu deckenden Rosen zu bringen, ist oft nachtheilig; und wo man genöthigt ist, es zu verwenden, sollten um die Pflanzen herum erst Pfähle gesteckt werden.

Ebenso verwerflich sind solche Deckmaterialien, welche Mäuse heranlocken, als Stroh, Mist und andere mit Stroh gemischte Streu. Selbst unter andere weiche Bedeckungen ziehen sich oft Mäuse und richten durch Benagen der Zweige großen Schaden an. Ist man vor solchem Ungeziefer nicht sicher, so ist es gut, die zu bedeckenden Rosen mit stechenden Wachholder- oder Fichtenzweigen zu umgeben.

Die Wildstämme der veredelten Rosen, obgleich sie in ihrer natürlichen Stellung von Frost nicht zu leiden pflegen, verlangen, wegen der durch das Niederbiegen herbeigeführten Spannung des Bastes und der Rinde ebenfalls einen leichten Schutz, um hauptsächlich das Glatteis davon abzuhalten. Junge Stämme besonders, deren Rinde sich noch nicht zu Borke verdichtet hat, gehen oft zu Grunde, während das Edelholz wohl erhalten bleibt. Man bedeckt sie daher auch mit Nadelreisig, oder bindet sie dünn in Stroh ein.

31. Pflanzt man Rosen von besonders empfindlicher Natur, oder erlaubt es der Standort nicht, sie im Winter stehen zu lassen, so nimmt man sie im Herbste heraus und pflanzt sie in Töpfe ein, bei welchem Verfahren es jedoch durchaus nothwendig ist, daß sie ein recht faserreiches Wurzelvermögen besitzen. Mehr zu empfehlen ist, sie sogleich in an den Seiten durchlöcherte Töpfe oder Körbe gepflanzt, in die Erde zu setzen, um sie im Herbste desto bequemer und, ohne die Wurzeln zu verletzen, herausnehmen zu können und frostfrei zu durchwintern; denn durch das Ausgraben im Herbste und Wiedereinpflanzen im Frühjahre werden bedeutende Störungen verursacht, so daß man sich selten eines üppigen Wachsthums und reichen Flors erfreuen wird.

32. Stammrosen, welche an Stellen stehen, wo ein Niederbiegen nicht zulässig ist, oder deren Stämme so stark geworden sind, daß sie überhaupt nicht mehr niedergebogen werden können, bindet man, je nachdem es eine mehr oder weniger empfindliche Sorte ist, stark mit Stroh, Schilf oder Tannenzweigen ein und befestigt sie gut an einen entsprechenden starken Pfahl, damit sie vom Winde nicht losgerissen und abgebrochen werden können.

Bei noch empfindlicheren Sorten bringt man zwischen die von Blättern entblößte und zusammengebundene Krone (was selbstverständlich bei allen zu deckenden Rosen vorausgehen muß), und um dieselbe herum noch trockne Sägespäne, indem man auf folgende Weise verfährt: Dicht unter der Krone wird das um dieselbe herumgelegte Stroh fest zusammengebunden, ein Mann hält

dann mit den Armen oder durch loses Herumschlingen eines Strickes oder Strohseils das Stroh um die Krone zusammen, während ein zweiter von oben die Sägespäne einfüllt. Ist die Krone ganz damit bedeckt, so wird über ihr das Stroh fest zusammengebunden, man setzt dann darüber noch eine Strohkappe, bei welcher die Aehren nach unten gerichtet sein müssen, damit die Nässe nach unten ablaufen kann, und legt um das Ganze noch einige Bänder. In dieser Weise verwahrte empfindliche Rosen überstehen schon bedeutende Kältegrade. Nach dem Entfernen des Strohes und der Sägespäne im Frühjahre ist es auch nöthig, die Krone für einige Zeit noch etwas mit Nadelreisig zu umgeben, bevor man sie der freien Luft und Sonne wieder ganz aussetzt. Dieses Verfahren hat jedoch nicht immer günstigen Erfolg, wie der harte Winter von 1870 auf 1871 bewiesen hat, in welchem auf diese Weise verwahrte Rosen zum größten Theile zu Grunde gegangen sind. Wo es irgend geht, müssen die gegen starken Frost empfindlichen Rosen zur Erde gebogen und mit einem der oben angegebenen Materialien bedeckt werden*).

Gegen Frost und Glatteis empfindlichen Rosensäulen oder Pyramiden, sowie an Wänden, Bäumen, Lauben oder anderen Gegenständen angebrachten Schlingrosen giebt man ebenfalls, um das etwas mühsame Losschneiden im Herbste und das Anheften im Frühjahre zu ersparen, einen Mantel von Deckreisig, Schilf oder Stroh. Sehr empfindliche Rosen halten jedoch unter einem solchen Schutz nicht aus, sondern müssen auch niedergelegt werden und eine der oben angegebenen Deckungen erhalten.

---

*) Es sei hier sogleich noch die Bemerkung angeknüpft, daß bei dieser für Mitteldeutschland allerdings seltenen Kälte (bis 26 Grad R.) die gewöhnlichsten harten Landrosen, als Centifolien, Moosrosen ꝛc., so weit, als sie nicht vom Schnee bedeckt waren, abgefroren sind. Die gelbe persische Rose (Persian yellow) hat sich als die härteste erwiesen; selbst Hochstämme, welche aufrecht stehen geblieben und am Pfahle festgebunden, waren bis in die äußersten Spitzen gut geblieben. Nicht vom Schnee bedeckte Kletter- und Trauerrosen (R. arvensis, sempervirens, rubifolia etc.), welche bei gewöhnlichen Wintern bis zu 20 Grad Kälte sehr gut ohne Decke aushalten, waren ebenfalls abgefroren.

Siebentes Kapitel.

Verwendung der Rosen*).

Die Rosen lassen sich — wir haben es schon in der Einleitung gerühmt — wie kein anderer Blüthenstrauch, den verschiedenartigsten Zwecken anpassen und verdienen schon aus diesem Grunde, sowohl im kleinen Hausgarten, als in großen landschaftlichen Anlagen den bevorzugtesten Platz. In letzteren kann man besondere Abtheilungen von günstiger Lage zu besonderen Rosengärten oder sogenannten Rosarien bestimmen. Die gewöhnlichste Verwendung ist aber die, daß man sie entweder einzeln aufstellt, oder ganze Beete oder Gruppen damit bepflanzt. Die sogenannten Schling- oder Kletterrosen benutzt man, wie schon gesagt, zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen, Baumstämmen, Mauern, oder, um durch sie Gegenstände, welche dem Auge noch sorgfältiger entzogen werden sollen, zu verbergen. Manche Sorten lassen sich auch zu Einfassungen und Hecken verwenden.

33. Beginnen wir mit der gegenwärtig unter den Rosen beliebtesten Form, den Stammrosen oder Rosenbäumchen. In kleinen symmetrisch angelegten Gärten pflanzt man sie in gleichmäßiger Entfernung, jedoch nicht unter 1,60 Meter, auf die längs den Hauptwegen laufenden Blumenrabatten und an Wegründern. In größeren Gärten und selbst an öffentlichen Stadtpromenaden, stellt man sie alleeartig in 2 bis 4 Reihen auf und umschlingt die hohen nackten Stämme mit zierlichen Schlingpflanzen aus der Gattung Ipomaea, Tropaeolum, Cajophora, Eccremocarpus u. a. m., und bildet von einem Stamm zum andern Guirlanden. Die am besten hierzu geeigneten Schlingpflanzen sind die zierliche Cephalandra quinqueloba und Pilogyne suavis.

In landschaftlichen Gärten bringt man die hochstämmigen Rosen an geeigneten Stellen gruppenweise in möglichst ungleichen Entfernungen auf den Rasen. Das Bepflanzen ganzer Beete oder Gruppen mit hochstämmigen Rosen verschiedener Sorten und Größe ist nicht sehr zu empfehlen; träfe man auch wirklich Alles in Bezug auf Höhe, Wuchs und Gleichheit der Kronen, was aber nur höchst selten der Fall ist, so sieht ein solches Beet mit den nackten Stämmen und Pfählen doch nie schön aus, selbst wenn auch

*) Ueber die Verwendung der Rosen sind ebenfalls im sechsten Abschnitt speciellere Angaben zu finden.

der Boden mit darauf gepflanzten anderen Blumen bedeckt ist. Schon bei weitem besser macht sich ein solches Beet, wenn man blos nach der Mitte einige Hochstämme und um dieselben eine oder noch besser zwei Reihen wurzelächter oder der Erde gleich auf rosa canina veredelter Rosen bringt, welche jedoch so hoch werden müssen, daß sie die Stämme der in der Mitte stehenden Rosen decken und so das Ganze eine nach allen Seiten hin gleichmäßig abfallende Gruppe bildet.

Was die Höhe der Stämme anbelangt, so hängt diese einestheils von dem Geschmack des Eigenthümers, anderntheils aber von der Oertlichkeit und der Art der Aufstellung ab, welche Rosen von jeder Höhe erfordern kann. Eine Höhe von 1,20 bis 1,50 Meter — also Augenhöhe — ist jedenfalls die vortheilhafteste, im Fall nicht eine besondere Aufstellung niedrigere Rosen erfordert. So sind z. B. beim Pflanzen einzelner Rosen gruppenweise auf Rasen Stämme verschiedener Höhe nothwendig, indem die äußersten niedriger sein müssen. An gewissen Plätzen sind aber auch höhere Stämme von 1,80 Meter und mehr, besonders wenn sie von oben herab, z. B. von Fenstern oder einem sonstigen erhöhten Standpunkte aus besehen werden können, sehr schön und ihre Pracht wird hauptsächlich noch dadurch erhöht, wenn es Sorten mit großen Blumen von recht leuchtenden Farben sind, deren Wirkung eine bessere aus einer gewissen Entfernung, als aus der Nähe gesehen, ist.

Die sogenannten Trauerrosen (s. §. 23) sollten keinen Stamm unter 2 Meter Höhe haben, denn je höher bei diesen die Stämme sind, desto graciöser erscheinen die herabhängenden dünnen, lange Blüthenrispen bildenden Zweige und berühren nicht sobald den Boden, wie dies bei niedriger veredelten häufig der Fall ist, wodurch sie viel an ihrer Pracht verlieren. Besonders schön nehmen sie sich, wie alle Hänge- oder Trauerbäume, auf kleinen Anhöhen oder an Abhängen aus.

34. Nach der Stammform ist der Rosenbusch, ohne weitere künstliche Form, am gebräuchlichsten zur Einzelnpflanzung in den Gärten. Hierzu eignen sich hauptsächlich viele Sorten von niedrigem Wuchs, welche sich nur mit Mühe oder gar nicht hoch ziehen lassen, z. B. die Pimpinellrosen (R. pimpinellifolia), verschiedene französische Rosen (R. gallica), viele Noisette- und Bourbonrosen, manche Hybriden; von letzteren sei hier blos der herrlichen weißen Madame Plantier gedacht, welche sich selbst überlassen einen ziemlich ausgebreiteten, graciös überhängenden, selten über 0,94 bis 1,25 Meter hohen Busch bildet, dessen glänzend hellgrün belaubte, fast stachellose Zweige mit einer großen Menge von Blumen bedeckt sind. Diese

Rosenbüsche lassen sich durch Auseinanderbinden auch noch erweitern, indem man ringsum Stäbe in den Boden steckt, welche jedoch möglichst unsichtbar angebracht werden müssen, damit sie der Schönheit weiter keinen Abbruch thun. An diese befestigt man die Zweige. Noch besser läßt sich dies durch ein Drahtgestell von beliebiger Form erreichen. Sehr kurztriebige Sorten dagegen, namentlich die Pimpinellrosen, lassen sich durch Beschneiden, was sich jedoch, um das Blühen nicht zu beeinträchtigen, nur auf das Nöthigste beschränken darf, leicht zur Kugelform bilden. Für landschaftliche Anlagen sind diejenigen schon etwas höher wachsenden Sorten zum Rosenbusch am geeignetsten, welche sich ohne weitere Nachhülfe locker und malerisch mit überhängenden Zweigen bauen, wie die verschiedenen Varietäten der gelben Kapucinerrose (R. lutea), welche, wie die Pimpinellrose, jedoch nur für sonnige, trockne Lagen, so auch an sonnigen Felsenpartieen verwendbar ist; die nicht zu schlank wachsenden Hybriden der Alpenrose (R. alpina), die Weinrose (R. rubiginosa), sowie manche Varietäten aus den Gruppen der Damascener- und Weißen Rose (R. alba) u. a.

35. Höher wachsende Rosen lassen sich zweckmäßiger in Säulen- und Pyramidenform (s. §. 18) ziehen, von 1,50 bis zu 3 Meter Höhe und nach Belieben höher. Für viele Sorten ist diese Form die naturgemäßeste und diejenige, in welcher sie am meisten ihre Blumenpracht entfalten können. In einem regelmäßig angelegten Garten kann man sie sowohl einzeln pflanzen, z. B. auf die Ecken der Rabatten, oder in den Mittelpunkt, wo sich die Hauptwege kreuzen, als auch reihenweis, etwa mit Rosenbäumchen abwechselnd. Auch lassen sie sich gleich den Rosenbäumchen, entweder allein, oder mit diesen abwechselnd, in größeren Gärten zur Bildung von Alleen verwenden; besonders reizend machen sie sich bei dieser Verwendung, wenn man sie vermittelst der am kräftigsten wachsenden Triebe guirlandenartig verbindet. In landschaftlichen Anlagen verwendet man sie ebenfalls wie die Stamm- und Buschrosen, hält sich jedoch nicht so streng an die Form, sondern gestattet ihnen ein mehr freies Wachsthum, indem man einzelne Zweige frei herauswachsen läßt. Zu Säulen- und Pyramidenrosen, welche von unten auf vollständig bezweigt sein sollen, eignen sich nur wurzelächte oder auf den Wurzelhals veredelte Rosen und es lassen sich fast alle bekannten Gartenrosen von hohem Wuchs so ziehen. Sorten von raschem Wuchse, welche die gewünschte Höhe in möglichst kurzer Zeit erreichen, verdienen allerdings den Vorzug. Zu hohen Säulen und Pyramiden gelangt man am raschesten, wenn man Kletterrosen dazu benutzt.

36. Die Kletterrosen (s. §. 19), unter welchen hier nicht nur die-

jenigen Sorten gemeint sein sollen, deren schwache Aeste sich nicht allein halten können und bei manchen Arten förmlich sich schlingen (daher auch häufig Schlingrosen genannt), sondern auch jede andere hochwachsende Sorte mit dünnen, biegsamen Zweigen, welche sich zur Bekleidung von Wänden und andern Gegenständen verwenden lassen, gehören zu den reizendsten Erscheinungen und ihre Verwendung ist sehr mannichfaltig. Am meisten benutzt man sie an Gebäuden und Geländern; aber noch manche andere Vorrichtungen und Oertlichkeiten sind zur Bekleidung mit Kletterrosen geeignet, namentlich halbkreisförmige Geländer um Sitzplätze, Lauben, einzelne Bogen über den Wegen, besonders am Anfange derselben und an den Kreuzungsstellen, oder auch viele Bogen hinter einander, wodurch ein Laubengang entsteht, der weit schöner ist, als eine geschlossene Veranda, an welcher die meisten Blüthen gar nicht zu sehen sind. Ferner kann man verschiedenartig geformte Draht- und Holzgestelle, wie man sie häufig in den Gärten für Schlingpflanzen hat, mit Kletterrosen bekleiden; ja es lassen sich ganze tempelartige Gebäude, sogenannte Rosentempel, welche ganz aus Gitterwerk und Rosen bestehen, bilden. In landschaftlichen Gärten verwendet man Kletterrosen gern zur Bekleidung alter Baumstämme, deren Laubkronen jedoch nicht zu dicht sein dürfen, indem sie sonst leicht darunter verkommen; ferner zur Dekoration von Felsenpartieen und alten Mauern, wo man sie ungezwungen herunterhängen läßt. Manche Sorten, wie z. B. die Ayrshirerose (R. arvensis), gedeihen noch in dem kargsten Boden, weshalb sie sich zu letzteren Zwecken und zur Bedeckung von kahlen Stellen und vegetationsarmen Hügelabhängen verwenden lassen.

Für alle diese Verwendungen sollte man vorzugsweise solche Sorten wählen, die keines Winterschutzes bedürfen, oder höchstens nur ein dünnes Behängen mit Nadelreisig erfordern, indem das Losbinden und Niederlegen im Herbste und das Wiederanheften im Frühjahre sehr mühsam ist. Solche giebt es in den Gruppen der R. alpina, arvensis und sempervirens, während die aus Amerika stammenden Prairie oder Michigan-Rosen (R. rubifolia) schon etwas empfindlicher sind, noch mehr R. multiflora, moschata und Banksiana, welche letztere drei nur in südlichen Gegenden im Freien zu ziehen sind.

37. Wurzelächte und ganz niedrig veredelte Rosen von weniger hohem Wuchse finden ihre zweckmäßigste Verwendung beim Anlegen von größeren oder kleineren Rosenbeeten (Beete von regelmäßiger Form, wie sie in symmetrische Anlagen passen), und Rosengruppen (Beete von unregelmäßiger Form, daher besser für landschaftliche Anlagen passend).

Ein großes Rosenbeet, auf welchem viele Sorten angebracht werden sollen, so zu bepflanzen, daß es untadelhaft dasteht, hat seine Schwierigkeiten und gelingt nur in den seltensten Fällen. Die Schwierigkeit liegt in der Verschiedenheit des Wuchses der verschiedenen Sorten; es ist daher ein Haupterforderniß bei der Anpflanzung von Rosenbeeten, zu wissen, welche Höhe eine jede Sorte erreicht. Wer darin nicht eigene Erfahrung besitzt, mag bei Bestellung von Rosen den Verkäufer um Angabe der Höhe ersuchen und ihm auch lieber die Wahl überlassen. Aber selbst wenn man die Höhe der Sorten kennt und sie blühend gesehen hat, kommt es dennoch vor, daß einige ganz anders wachsen, als man erwartete, daß eine hohe vorn, eine niedrige in der Mitte steht. Da bleibt nichts anderes übrig, als umzutauschen. Kleine Ausartungen der Höhe lassen sich leicht durch den Schnitt und das Niederbinden der Aeste im Frühjahre beseitigen. Am wenigsten läßt sich aus bunt durcheinander gepflanzten Remontanten, Bourbon-, Noisette-, Thee- und Bengalrosen ein gleichmäßig wachsendes und reichblühendes schönes Beet bilden, man müßte denn ganz niedrig veredelte Stämmchen in Sorten von gleichem Wuchse pflanzen, da die wurzelächten von zu ungleichmäßigem Wuchse sind. Am rathsamsten ist es daher, zu umfangreichen Beeten, welche aus starken Rosenbüschen bestehen und in der Blüthe von effektvoller Wirkung sein sollen, nur die schönsten einmal blühenden Rosen zu benutzen. Hat man Raum für mehrere Rosenbeete, so sollte man die Sorten so vertheilen, daß nur einige, gut zusammenpassende auf einem Beete stehen. Z. B. ein Beet von großen Centifolien, darunter die interessant schöne Kopfkohlrose (centifolia bullata), die Kammrose (centifolia cristata) und Moosrosen, umgeben von Pomponrosen (centifolia minor), und als Einfassung Dijon- oder Burgunderröschen (centifolia parviflora). Ein Beet von Provencerrosen (Roses de Provence). Ein Beet der schönsten Damascenerrosen, als da sind: Bouvet, Déesse de Flore, Eudoxie, Madame Soëtmans, vor Allem die prächtige weiße Madame Hardy, sowie die dunkelste der Damascener la négresse u. a. Hierbei sind auch die mehrmals blühenden Damascenerrosen, die sogenannten Perpetuellen oder Vierjahreszeitenrosen mit zu verwenden, vor allem die herrliche Königsrose (du roi), außerdem Adèle Maugé, D'Esquermes, Anne de Mélun, Joasine Hanet, Yolande d'Aragon u. a. m. Viele Abwechselung in Höhe und Farbe bieten auch die Französischen oder Essigrosen (R. gallica). Zur Bepflanzung von Beeten eignen sich folgende: Belle cramoisie, Cardinal Chévérus, Duc d'Aremberg, Général Lafayette, la Moscowa, rouge admirable, Turenne u. a. Die gelben Rosen (R. lutea), pflanze man

lieber allein, indem sowohl ihr Laubwerk als auch die Farbe nicht gut zu andern Rosen paßt. Die empfehlenswertheste ist die gelbe Persische (persica lutea oder Persian yellow), welche man entweder allein oder mit andern Kapucinerrosen auf ein Beet zusammenpflanzt.*)

Gegen Rosenbeete von nur einmal blühenden Sorten läßt sich nun allerdings einwenden, daß sie den größten Theil der schönen Jahreszeit blüthenlos dastehen. Dem läßt sich aber dadurch abhelfen, daß man die Rosen etwas weitläufiger pflanzt und andere schöne Blumen dazwischen bringt, welche, nachdem der Rosenflor vorüber ist, zu blühen anfangen. Damit diese die Rosen weiter nicht benachtheiligen, gebe man ihnen in der Mitte eine Entfernung von 1,50 bis 2 Meter, nach außen 1,20 bis 1,50 Meter und sorge bei solchen Zwischenpflanzungen dafür, daß der Boden reichlichen Ersatz an Düngung erhält. Bei Rosengruppen, welche aus hohen Büschen bestehen, kann man nach der Mitte Georginen oder Malven, vor diese hohe Sommerblumen, als Astern, Kalliopsis, Tagetes, Zinnien u. a. und am Rande niedrigere Sommerblumen anbringen, so daß die Beete den ganzen Sommer hindurch blühend sind. Zwischen niedrigeren Rosen genügen auch niedrigere Zwischenpflanzungen; unter andern von Phlox Drummondi, niedrigeren Astern, Convolvus tricolor, Nemophila insignis, Reseda, Valeriana rubra, Delphinium formosum, Gladiolen und viel andere.

38. Die niedrigen wurzelächten Rosen aus den Gruppen der Remontante-, Noisette-, Bourbon-, Bengal-, (semperflorens), Lawrence- und Theerosen, welche vom Juni bis zum Herbst blühen, weshalb sie auch oft mit dem gemeinschaftlichen Namen Monatsrosen bezeichnet werden, obgleich man als solche nur die chinesische oder Bengalrose zu betrachten hat, eignen sich besser zur Bepflanzung kleinerer Gruppen und zwar mit Rücksichtnahme, daß sie im Winter bedeckt werden müssen. Viele der ächten Noisetterosen pflegen bei nahrhaftem Boden und hinlänglichem Winterschutz eine ziemliche Höhe, oft bis 2,50 Meter zu erreichen und besitzen die Eigenschaft, mit kleinen Blumen in großen Büscheln zu blühen, welche auf den Spitzen starker langer Sommertriebe erscheinen, weshalb sich die meisten auch mehr zu gruppenartigen kleinen Beeten eignen, indem man nur 3 bis 5, am besten recht verschiedenfarbige Sorten, zusam-

*) Ich muß hier allerdings sogleich die Bemerkung beifügen, daß in Folge des so bedeutenden Sortenreichthums an öfterblühenden Rosen, die einmalblühenden mit Ausnahme einer nur geringen Anzahl aus den Gärten fast verdrängt worden und kaum noch käuflich zu haben sind.

menpflanzt. Die mäßiger wachsenden Sorten, welche, zumal wenn sie uf nicht zu fettem Boden stehen, in einer Höhe von 63 bis 90 Centim. gehalten werden können, eignen sich auch zur Bepflanzung größerer Beete. Werden einzelne Triebe zu hoch, so entspitzt man sie, oder bindet sie nieder, bevor die Knospen sich färben.

Diejenigen Sorten, welche durch Kreuzung mit der Theerose entstanden sind, daher auch durch größere einzelnstehende Blumen von den andern ganz abweichen, als z. B. die schöne blaßgelbe America, die ebenfalls gelbe Ophirie und Solfatare und ähnliche Sorten pflanzt man lieber allein auf kleine Beete, oder man kann auch höhere Noisetterosen damit umgeben. Am prächtigsten entwickeln sich aber diese Sorten auf Hochstamm veredelt. Zugleich sei noch bemerkt, daß diese Theehybriden empfindlicher sind, als die ächten Noisetten und daher eines sorgfältigeren Winterschutzes bedürfen.

Die Bourbonrosen bilden zuweilen ebenfalls Büsche von 2 Meter Höhe, bleiben aber gewöhnlich niedriger und eine Anzahl Sorten eignen sich vorzüglich zu Beeten. Unter allen steht die prächtige und allbekannte Souvenir de Malmaison obenan, sodann die der Malmaison ähnliche Émotion und reine des vierges, Apolline, Hermosa, Louise Odier, Louise Margottin, Lewison Gower u. a. Da der Wuchs der Bourbonrosen meistens etwas dünn und sparrig ist, so füllt man die damit bepflanzten Beete am besten dadurch, daß man diese Rosen auf ein 16 bis 31 Centim. über dem Boden angebrachtes Drahtgeflecht zieht. Bei dieser Verwendung sollten jedoch nicht verschiedene Sorten untereinander gepflanzt werden; allenfalls kann man zur äußersten Reihe eine andere Farbe nehmen.

Unter den Noisette-Rosen ist es besonders die glänzend karmosinrothe und durch rasches Wachsthum und reiches Blühen sich auszeichnende „Fellenberg," welche sich zur Massenpflanzung eignet.

Die werthvollsten zu niedrigen Rosenbeeten sind die eigentlichen Monatsrosen, auch Semperflorens-, Bengal- und Chinesserrosen genannt. Stehen auch ihre flatterigen, halbgefüllten und schwachriechenden Blumen andern Rosen bedeutend nach, so sind sie in einiger Entfernung immer schön. Für die Landkultur sind aber nur wenige geeignet und gerade die schönsten sind es, welche, obgleich ebenfalls unter guter Bedeckung aushaltend, dennoch kein volles schönes Beet bilden. Die beste und auch am meisten verbreitete ist die gemeine Monatsrose, wovon es eine kleinblumigere blasse, (R. semperflorens pallida) und eine dunklere mit größeren gefüllteren Blumen (R. semperflorens centifolia), giebt. Letztere ist vorzuziehen und eben so hart. In unserm nördlichen Klima verlangen sie eben

falls guten Winterschutz, frieren dennoch oft bis auf den Boden zurück, treiben aber sehr gut wieder aus und blühen nur etwas später. Um ein niedriges Beet mit gleichhohen Pflanzen zu bekommen, ist es nöthig, sie vermittelst hölzerner Haken niederzulegen und keinen starken Trieb aufkommen zu lassen, bei welchem Verfahren sie allerdings nicht so reich blühen, als wenn man sie frei wachsen läßt. Außer semperflorens pallida und centifolia empfehlen sich zur Landkultur noch Ducher (weiß), Fabvier, Lucullus, la fraîcheur, Aetna, Anemoniflora, Cramoisi supérieur, Gloire de Rosomène, Triomphante u. a.

Die kleinen interessanten Lawrencerösch en (R. indica minima oder Lawrenceana), welche selten höher als 21 Centim. werden, kann man auf besondere kleine Beetchen pflanzen oder man benutzt sie als Einfassung um andere Rosenbeete. Trotz guter Bedeckung frieren sie ebenfalls bei uns meistens bis auf den Boden zurück, treiben aber gut wieder aus, wenn die Wurzeln nicht vom Frost berührt worden sind.

Die Theerosen, obgleich zu den schönsten Rosen gehörend, sind doch für die Landkultur wegen ihrer Zartheit von geringer Bedeutung, und obschon sie nicht sehr hoch werden, so eignen sie sich doch nicht zu ganz niedrigen Beeten, indem beim Niederhaken die an den schwachen Stielen sitzenden großen Blumen auf der Erde liegen und vom Regen und Gießen beschmutzt werden würden; sie eignen sich daher mehr zur Einzelnpflanzung. Die meisten derselben entwickeln ihre Blumen am vollkommensten und schönsten, wenn sie auf Hochstamm veredelt sind. Die wenigen dauerhaften Sorten, welche in wurzelächtem Zustande zur Bepflanzung von Beeten geeignet sind, blühen auch nur dann gut, wenn diese recht geschützt, sonnig und möglichst trocken — etwa an einer Mauer — gelegen sind. Die vorzüglichste und fast noch unübertroffene ist die herrliche Gloire de Dijon (auch vielfach zu den Noisetterosen gerechnet). Außerdem sind die geeignetsten: Adam, Devoniensis, Homère, Madame Bravy, Niphetos, Safrano, Sombreuil, Triomphe de Luxembourg u. a.

Beispielsweise will ich hier noch einige Rosen anführen, welche sich zu einer immerblühenden niedrigen Gruppe besonders gut eignen. Zum mittleren Theil wählt man Souvenir de Malmaison; um diese zunächst pflanzt man einen Kranz von Hermosa, und als Einfassung benutzt man die kleine Lawrenceana semperfl. anemoniflora, oder Cramoisi supérieur. Noch einen besondern Effekt gewährt diese Gruppe, wenn man als Mittelpunkt eine hübsche Pflanze von Araucaria imbricata, Thuja aurea oder dergl. anbringt. Zu einer hochwachsenden Gruppe, bei welcher Gloire de Dijon,

oder General Jacqueminot den mittleren Theil einnehmen soll, wählt man als Einfassung Cramoisi, supérieur, oder anemoniflora. Eine ganze Gruppe von Cramoisi supérieur mit Lawrenceana eingefaßt, macht sich ebenfalls sehr gut.

39. Der Verwendung der Rosen als Einfassung ist bereits schon gedacht worden. Außer dem Liliput- oder Lawrence- und Pompon- oder Burgunderröschen lassen sich auch niedergehakte oder an einen Draht geheftete Monats- und Remontanten-Rosen, sowie auch jede andere astreiche Sorte um größere Rosenbeete oder ganze Rosenplätze benutzen, in welcher Stellung sie sehr dankbar blühen. Andere Beete als Rosenbeete damit einzufassen, ist nicht zu empfehlen.

40. Rosenhecken sind sehr schön, eignen sich jedoch nicht dazu, um nach außen Schutz zu gewähren, sondern mehr, um bloße Abtheilungen zu begrenzen. Die geeignetsten Rosen hierzu sind die Pimpinellrosen, welche von unten auf dicht und buschig wachsen und außerdem fast weiter keiner Pflege bedürfen, als daß man von Zeit zu Zeit das alte Holz ausschneidet. Zu höheren Hecken lassen sich viele andere kräftig wachsende und harte Sorten verwenden und solche Hecken können besonders schön werden, wenn man sie spalierförmig macht und die Aeste zu beiden Seiten anbindet.

Zu einer ordentlichen Rosenhecke, welche auch nach außen Schutz gewährt, möchte sich die Weinrose (R. rubiginosa) am meisten eignen; dieselbe wird auch in neuerer Zeit vielfach hierzu empfohlen.

41. Wer eine große Rosensammlung und überhaupt einen größeren Garten besitzt, kann den für Rosen geeignetsten Platz zur Anlegung eines Rosengartens oder sogenannten Rosariums benutzen, wobei alle in diesem Kapitel angedeuteten Erziehungs- und Aufstellungsformen zu einem geschmackvoll angeordneten Ganzen vereinigt werden können. Unzählige von Plänen können hierzu in Ausführung gebracht werden; jedoch ist denjenigen der Vorzug zu geben, welche einfach und leicht herzustellen sind, eine vortheilhafte Aufstellung der Pflanzen zulassen, sowie auch die Besichtigung eines jeden einzelnen Exemplars gestatten. Da eine derartige Anlage sehr von der Beschaffenheit des Terrains, sowie auch von dem Geschmack des Besitzers abhängig ist, so gebe ich darüber nur allgemeinere Andeutungen.

Jedenfalls sollte die Anpflanzung von der Art sein, daß man von einem Standpunkte aus, sei es vom Wohnhause, einem Gartensalon, einer Laube, einem in der Mitte des Rosariums befindlichen Hügel u. s. w., seine Sammlung im Ganzen übersehen kann. Soll das Rosarium z. B. auf einer vor dem Wohnhause, Gartensalon, oder irgend einem Ruheplatze

ausgedehnteren Rasenfläche von ebener Beschaffenheit angelegt werden, so ist es ganz passend, wenn man dem Ganzen eine Halbkreis- oder Halboval-form im Aeußeren giebt. Den in diesem Halbkreis oder Halboval gelegenen Raum kann man durch strahlenförmig auseinandergehende Wege in verschiedene Theile theilen, und in diese Rasentheile bringt man die Beete und Beetchen in symmetrischer Anordnung, welche die Rosen aufnehmen sollen. Aber auch jede andere Eintheilung, sofern sie ein harmonisches Ganze bildet, ist zulässig. Bei der Anpflanzung sind die Rosen nach ihrer verschiedenen Größe und Stärke zu ordnen, so daß die ganze Pflanzung von dem Punkte aus, von dem man die Gesammtansicht genießen will, nach den Seiten hin sanft ansteigt. Umgekehrt ist es, wenn der Gesammtansichtspunkt höher liegt und das Terrain nach den Seiten hin abschüssig ist; da läßt man auch die Rosen nach den Seiten hin abfallen, wobei man den Vortheil genießt, auch wieder von der entgegengesetzten Seite eine Gesammtansicht über die ganze Anlage zu haben. Ist der Punkt, von dem aus man das Rosarium übersehen will, in der Mitte, so ist auch hier eine kreis- oder ovalförmige Anordnung die geeignetste, und die Rosen müssen, wenn der Mittelpunkt nicht hügelartig erhaben ist, von der Mitte aus nach den Seiten hin sanft ansteigen. Ist dagegen die Mitte erhaben, so läßt man ebenfalls das Gegentheil stattfinden, indem man die Rosen von der Mitte aus nach den Seiten hin sanft abfallen läßt.

Die Beete können mit Buxbaum eingefaßt werden, oder mit den zu Einfassungen geeigneten niedrigen Rosen; liegen sie im Rasen, so bedürfen sie auch gar keiner Einfassung. An die Stammrosen, besonders wenn sie die äußerste Reihe einnehmen, setze man starkwachsende Schlingpflanzen, z. B. Pilogyne suavis, Cephalandra quinqueloba, Adlumia cirrhosa, Tropaeolum Lobbianum, Lophospermum u. a. m., um schöne, von einer Krone zur andern hinüber zu leitende Festons zu bilden. Es sei hier überhaupt noch bemerkt, daß es nicht durchaus nothwendig ist, einen Rosengarten ausschließlich nur mit Rosen zu bepflanzen. Um einer solchen Anlage mehr Mannichfaltigkeit zu verleihen, besonders nachdem der Hauptflor vorüber ist, rathe ich sogar sehr, andere Blumen entweder allein auf einzelnen Beete oder auf den Rosenbeeten selber mit zu verwenden, wie schon in §. 37 bei Besprechung der Rosenbeete bemerkt wurde. Die kleinen runden Beetchen, welche die einzelnstehenden Hochstämme aufnehmen, eignen sich z. B. sehr gut für niedrige, zierliche Sommerblumen, als verschiedene Sorten von Lobelia, verschiedene Nemophila, Sanvitalia procumbens, einfach und gefüllt, die gefüllten und einfachen Portulaca, Oxalis tropaeoloides, Reseda und viele andere.

Zweiter Abschnitt.

Kultur der Rosen in Töpfen.

Erstes Kapitel.

Die zur Topfkultur geeignete Erde und das Einpflanzen der Rosen in Töpfe.

42. Hinsichtlich der Unterschiede, welche unter den zahlreichen Varietäten der verschiedenen Gruppen herrschen, machen die in Töpfen zu kultivirenden Rosen auch verschiedene Ansprüche an das nährende Erdreich. Außerdem muß man darauf bedacht sein, daß der kleine Raum des Topfes, in dem die Wurzeln die Nahrungsstoffe finden müssen, einen möglichst großen Vorrath davon einschließe. Sie gedeihen alle ohne Unterschied am besten in einem nahrhaften Erdreich, dessen Bestandtheile gut verwest und mehrere Male mit Kuh- oder auch Abtrittsjauche durchtränkt wurden. Solche Komposthaufen sind jedoch im entferntesten Winkel des Gartens oder Hofes anzubringen, damit man von ihren Ausdünstungen nicht belästigt wird.

Die zarteren und schwachwüchsigen Rosen verlangen eine leichtere, die härteren und starkwüchsigen Sorten eine schwerere Erde. Um die erstere zu erhalten, mische man 2 Theile Erde, die sich aus vollkommen verwesten Rasenstücken gebildet hat, mit 1 Theile gut verrottetem strohlosen Kuhdünger, 1 Theil kräftiger Lauberde und dem fünften Theile reinen Flußsandes; oder 1 Theil alten Lehm (von Wohnungen u. dgl.), 1 Theil Rasenerde, 2 Theile

Lauberde, 1 Theil Holzerde (aus alten verwitterten Stämmen von Eichen, Erlen, Weiden ꝛc. in Ermangelung aus Holzställen und von Sägespänen) und den fünften Theil Sand; oder 2 Theile Rasenerde, 2 Theile Mistbeet- oder Komposterde (aus allen Abgängen des Gartens und des Hauses entstanden), 2 Theile Lauberde und den fünften Theil Sand. Statt der Rasenerde, wenn diese gerade nicht vorhanden sein sollte, kann auch, einige Zeit der Luft ausgesetzter, Teich- oder Grabenschlamm benutzt werden, sowie statt der Holzerde Haideerde. Um die schwerere Erde herzustellen, nehme man zu obigen Mischungen noch einen Theil fetten Lehm und statt des Kuhdüngers oder der Komposterde 2 Theile mit Triftrasen gut zusammengefaulten Abtrittsdünger. Der Rosenfreund jedoch, welcher nur auf seine Wohnung beschränkt und über keinen Raum zur Anlage eines solchen Erdmagazins zu verfügen hat, suche sich die Erde, welche die Maulwürfe auf Wiesen, Feldern und Gärten ausgeworfen haben, zu verschaffen, sowie aus dem Walde Haideerde, oder in Ermangelung derselben Holzerde, und bringe zu 3 Theilen Maulwurfserde 2 Theile Holzerde und den fünften Theil Sand. Damit nun diese Erde gekräftigt werde, füge er etwas feine Hornspäne, Guano, Knochenmehl oder Malzkeime hinzu. Ein Zusatz von Ofenruß zu diesen Mischungen trägt zur Erzeugung eines recht dunkeln, saftig grünen Laubes noch besonders bei. Auch können denselben die Würmer nicht gut vertragen und entfernen sich aus den Töpfen, besonders wenn man Güsse von Ofenruß anwendet. Bevor die Erde benutzt werden soll, siebt man sie durch ein ganz grobes Sieb oder eine Erdrolle, um die etwa noch unverwest gebliebenen größeren Brocken abzusondern.

43. Die der Erde beizumischenden trocknen Düngstoffe, als Malzkeime, pulverisirter Tauben- oder Hühnermist, Guano, Hornspäne, Knochenmehl u. a. m., dürfen nur in einer sehr mäßigen Quantität beigegeben werden, so daß sie etwa blos den zehnten Theil von der ganzen Mischung ausmachen. Niemals darf man aber derartige Düngstoffe für die Topfrosen kurz vor dem Winter benutzen, indem solche unverweste Zuthaten in der Verwesung fortschreiten und die doch mehr in Ruhe verharrenden Wurzeln dadurch von der Fäulniß angegriffen werden.

44. Die Töpfe seien leicht und gut gebrannt und mehr hoch, als weit und flach, so daß die obere innere Weite ungefähr in gleichem Verhältniß mit der Höhe steht. Glasirte Töpfe sind ganz zu meiden. Oben müssen sie breiter und etwas nach außen gebogen sein, damit beim Umtopfen der Wurzelballen nicht zerrissen wird. Hauptsächlich achte man auch auf das Abzugsloch, damit das am Boden sich sammelnde Wasser leicht und schnell

abfließen kann, was verhindert wird, wenn das Loch, anstatt von innen nach außen, von außen nach innen gestoßen ist, wodurch gewöhnlich ein kleiner Rand entsteht, welcher das Loch umgiebt, den wegzunehmen der Töpfer sich selten die Mühe nimmt. Auch muß der Boden selbst von dem Rande des Topfes nach dem Loche hin etwas vertieft sein, damit das Wasser vollständig abfließen kann.

Vor dem Einpflanzen wird das Abzugsloch mit einer Scherbe belegt. Da es leicht vorkommen kann, daß die Scherbe das Abzugsloch zu dicht schließt, indem sich in Folge anhaltender Nässe die Erde fest um dieselbe ansetzt, so muß man außer dieser Scherbe den ganzen Boden des Topfes je nach Verhältniß zu seiner Größe und je nachdem auch die Pflanze von kräftigerem oder schwächerem Wuchse ist, noch mit einer schwächeren oder stärkeren Schicht klein geschlagener Scherben, oder besser noch, in kleine Stückchen geschlagener Holzkohlen oder Ziegelsteine, auch klein geschlagener Steinkohlenschlacken, oder mit grobem Kies, oder reinem Moos, welches den anderen Abzugsmaterialien fast noch vorzuziehen, bedecken.

45. Sollen Rosen aus dem freien Lande in Töpfe gepflanzt werden, so ist die geeignetste Zeit entweder im März und April, oder von Mitte September bis dahin, wo es der Frost nicht mehr gestattet. Man darf weder zu alte noch kränkliche Exemplare benutzen: mit letzteren geschieht es blos ausnahmsweise, wenn es eine sehr gute und zärtliche Sorte ist, der die Kultur im freien Lande nicht zusagt. Beim Ausheben der Rosen aus dem Lande ist darauf zu sehen, daß die Wurzeln so wenig als möglich verletzt werden; besonders sind die sogenannten Faserwurzeln zu schonen, weil diese es sind, welche eine schnelle und sichere Anwurzelung befördern. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Mit einem guten scharfen Spaten sticht man, je nach der Stärke der Pflanze, in einer Entfernung von 31 — 47 Centim. vom Stamme rings herum in den Boden, bei dem letzten Male wird der Spaten mit einem kräftigen Drucke unterhalb der Wurzeln geschoben, gleichzeitig erfaßt man mit der einen Hand die Pflanze, während man mit der andern den Spaten niederwärts drückt und somit die Rose aus dem Boden hebt. Besonders sind die veredelten Rosen beim Ausheben sorgfältig zu behandeln, weil bei diesen sehr häufig, wenn auch der Unterstamm anwächst, doch die Veredlung abstirbt.

Bevor die Rosen in Töpfe gepflanzt werden, sind sie mit einem scharfen Messer oder der Rosenscheere zu beschneiden, welche Verrichtung, je nach der Zeit der Einpflanzung, verschieden ist. Geschieht das Einpflanzen im Frühjahr, so werden die Zweige sogleich auf 2 bis 3 Augen zurückgeschnit-

ten; geschieht es dagegen im Spätherbste, so entfernt man nur alle schwachen und unregelmäßig gestellten Triebe, das Zurückschneiden der verbleibenden läßt man bis zum Frühjahr.

Die beim Ausgraben beschädigten Wurzeln werden sogleich beschnitten und die längeren und stärkeren nach Bedürfniß zurückgeschnitten. Pflanzt man veredelte Rosen ein, so sind die etwa im Entstehen begriffenen Wurzelausläufer des Wildstammes dicht an ihrer Basis ebenfalls sogleich wegzuschneiden, damit sie nicht später wieder von Neuem austreiben.

46. Die Töpfe für die einzupflanzenden Rosen müssen deren Wurzelvermögen völlig entsprechen, damit auch die Rose für die Dauer eines Jahres hinreichende Nahrung findet; es darf daher mit der Größe der Töpfe nicht gegeizt werden, ausgenommen man wollte kränkliche, zarte Rosen einpflanzen; denn diesen müssen die Töpfe etwas knapper und auch die Erde etwas magerer gegeben werden.

Beim Einpflanzen selbst verfährt man auf folgende Weise: Zuerst wird das Abzugsloch mit einer flachen Topfscherbe belegt und darüber kommt eins der oben angegebenen Abzugsmaterialien. Hierüber bringt man so viel von der zubereiteten Rosenerde, daß beim Hineinsetzen der Pflanze die oberen Wurzeln ungefähr 1 — 2 Centim. tiefer zu liegen kommen, als der Topfrand ist. Darauf wird so viel Erde, bei einigen Malen Rütteln und sanftem Aufstoßen des Topfes, damit sich die Erde ordentlich um und zwischen die Wurzeln setzt, nachgefüllt, bis der Topf voll ist, und dann mäßig fest angedrückt.

Die im Frühjahre eingepflanzten Rosen stellt man, um sie gegen Luftzug und Sonnenschein schützen zu können, bis zur vollständigen Anwurzelung in einen kalten Mistbeetkasten, möglichst nahe dem Glase. Der Boden, worauf sie zu stehen kommen, kann entweder Sand, Steinkohlenasche oder klare Holzkohle sein. Letztere ist in jeder Hinsicht vorzuziehen und verhindert auch am ersten das Eindringen der Regenwürmer in die Töpfe. Ein niedriges Gewächshaus, die Doppelfenster oder ein dazu geeignetes Zimmer müssen in Ermangelung eines Kastens dessen Stelle vertreten. Hat man über nichts derartiges zu verfügen, so muß man die Töpfe im Freien in ein Kohlen- oder Sandbeet bis an den Rand eingraben und gegen die austrocknende Ostluft und starken Sonnenschein vermittelst Tücher, Matten ꝛc. schützen.

Hat man die Töpfe unter Fenster bringen können, so hält man diese in den ersten Tagen ganz geschlossen, überspritzt die Rosen täglich, bei sehr warmer, trockner Witterung womöglich einigemal, mit lauwarmem oder von der Sonne erwärmtem Wasser, welches sehr zu ihrer Kräftigung bei-

trägt. Gewahrt man an der Entwickelung kräftiger Triebe die vollständige Anwurzelung der Rosen, so gestattet man ihnen mit allmählicher Steigerung immer mehr Zutritt frischer Luft und Sonnenschein, bis sie endlich der freien Luft und Sonne ganz ausgesetzt werden können.

Hierauf werden die Töpfe in entsprechender Entfernung, so daß keine Pflanze die andere berührt und Luft und Sonne hinlänglich auf sie einwirken können, auf ein Sand- oder Kohlenbeet gestellt und bis an den Rand eingelassen, wobei man, um das Durchwachsen der Wurzeln zu verhüten, unter jeden Stock ein Scherben- oder Schieferstück legt. Finden die Wurzeln den Weg in den Erdboden, so werden sich nur wenige in dem Topf bilden, und die Folge ist zwar ein sehr üppiger, aber minder vollkommner Wuchs, und wenn es dann nöthig wird, die Pflanzen während ihrer Blüthezeit wegzubringen, so werden sie eine unangenehme Störung erleiden. Eine südöstliche Lage des Beetes ist allen anderen vorzuziehen, indem sie die stärkste Mittags- und Nachmittagshitze nicht gut ertragen, und noch viel weniger die Hitze den Blüthen zuträglich ist.

Die Töpfe auf Stellagen zu stellen, ist nur dann zu empfehlen, wo ein feuchtes und kühles Klima durch das Eingraben nachtheilige Folgen herbeiführen kann. Ist man dagegen in wärmeren Gegenden wegen Mangel an einem andern Platz genöthigt, sie auf Stellagen zu bringen, so sollte man die Bretter oder Latten — welche nicht ganz dicht an einander liegen dürfen, damit das Wasser besser ablaufen kann und sie länger der Fäulniß widerstehen — noch mit schmalen Brettern, welche der Höhe der Töpfe entsprechen, umgeben, damit man zwischen die Töpfe, um sie gegen zu starkes Austrocknen zu schützen, Moos bringen kann. Ist man zur Aufstellung seiner Topfrosen nur auf ein Zimmerfenster oder auf ein Blumenbrett vor dem Fenster angewiesen, so sollte man ebenfalls für eine Vorrichtung zur Aufnahme von Moos oder Sägespänen, zum Einfüttern der Töpfe, sorgen, sowie während der Zeit, wo die Sonne am heißesten scheint, für hinlängliche Beschattung durch eine Markise, was besonders bei blühenden Rosen zu beachten ist, weil man sich dann ihres Flors weit länger erfreuen wird. Kann man sie nur innerhalb des Fensters anbringen, so müssen sie selbstverständlich während der wärmeren Jahreszeit durch Offenhalten des Fensters dem Einwirken der freien Luft stets ausgesetzt sein, da sie im entgegengesetzten Falle spindelig und kümmerlich wachsen und sehr bald von Ungeziefer befallen werden.

Die im Herbst eingepflanzten Rosen können, wenn sie in einen Kasten gesetzt worden sind, darin für den Winter verbleiben. Bis zu eintretender

Kälte hält man die Fenster entfernt und legt sie blos, besonders wenn es schon Spätherbst ist, bei anhaltendem Regenwetter aber auf, damit sowohl die Töpfe, als auch das Innere des Kastens nicht zu sehr durchnäßt werden. Ein mäßiges Bespritzen bei heiterem und warmem Wetter mit weichem Wasser, nachdem sie nicht mehr von der Sonne beschienen werden, ist ihnen sehr zuträglich. In Ermangelung eines Kastens kann man sie auch bis zum Bezug ihres Winterquartieres im Freien an einem nicht zu sonnigen und zugigen Ort aufstellen und bringt sie, nachdem man alle im Absterben begriffenen Blätter entfernt hat, um sie während des Winters ganz im Ruhestand verharren zu lassen, in einen frostfreien, hellen, luftigen Keller, oder in ein frostfreies Zimmer nahe den Fenstern, oder zwischen Doppelfenster.

Weniger zarte Sorten lassen sich im Nothfall, zumal in milderen Gegenden, auch im Freien überwintern, nur hat man dafür zu sorgen, daß die Töpfe gegen das Eindringen des Frostes vollständig verwahrt werden, indem sie sonst leicht zerfrieren und auch die Wurzeln der Rosen leiden. Man füttert daher die Töpfe in Laub, Moos, Sägespäne oder in irgend ein anderes Material ein und bringt dann reichlich 16 Centimeter hoch Laub noch darüber. Beim Eintritt des Frühjahrs verfährt man dann in der bereits angegebenen Weise.

47. Nicht selten ist man Umstände halber genöthigt, seine Rosen während ihrer vollen Vegetation aus dem Lande heraus zu nehmen und in Töpfe zu pflanzen. Dies kann ebenfalls ohne großen Nachtheil für die Pflanze ausgeführt werden, wenn das beim Einpflanzen der Rose im Frühjahr angegebene Verfahren recht sorgfältig beachtet wird. Ein Zurückschneiden der Zweige beim Einpflanzen unterläßt man hier auch und entfernt vor der Hand nur alle schwachen und unregelmäßig gestellten Triebe.

48. Das Begießen geschehe mit Vorsicht, d. h. man muß nur denjenigen Pflanzen Wasser reichen, die es wirklich nöthig haben, und dann sei man nicht sparsam, damit nicht etwa der untere Theil des Wurzelballens vertrocknet, während die obere Hälfte beständig von Feuchtigkeit strotzt. Im Allgemeinen sind beim Begießen folgende Regeln festzustellen: 1) Man verwende nur Wasser, welches mindestens die Temperatur der Luft hat, gebe aber nie zu kaltes Wasser, denn dieses macht nur kranke Pflanzen. Hat man nur frisches, d. h. kaltes Wasser im Hause, so gieße man stets etwas warmes darunter, denn es ist besser, das Wasser eher etwas wärmer zu nehmen, als daß es eine Temperatur unter 15 Grad hat; 2) ist zu beachten, ob eine Pflanze ruht oder stark wächst, ob sie frisch umgepflanzt oder

stark durchgewurzelt ist; in ersteren Fällen gieße man wenig und selten, in den letzteren stark und oft, wo nöthig, mehrmals hinter einander. Gießt man ruhende, nicht zehrende und frisch umgesetzte Pflanzen viel, so werden sie unfehlbar krank; 3) man gieße bei warmer Temperatur mehr und öfter, als bei kälterer. Dasselbe ist auch in Bezug auf trockne und feuchte Luft zu beachten. Außerdem gewöhne man sich, die Pflanzen nicht auf den Stamm zu gießen, indem dies oft Nachtheil bringt, und sehe darauf, daß um den Stamm herum die Erde etwas höher ist und nach dem Rande zu abfällt, damit das Wasser mehr den feinen Saugwurzeln zu Gute kommt. Auch sollte man niemals gießen, wenn die Töpfe noch von der Sonne beschienen werden, sondern erst, nachdem die Sonne einige Zeit davon weg ist, oder bevor sie darauf kommt. Im Sommer ist die Abendzeit, im Winter der Morgen besser zum Gießen geeignet.

49. Ein schwacher Düngerguß von im Wasser aufgelösten Hornspänen, Guano, (auf 1 Liter Wasser 16 Grm. Guano), Hühner- oder Taubendünger, Malzkeimen oder Kuhjauche mit der Hälfte Wasser verdünnt, zur rechten Zeit und mäßig angewendet, ist meistens von gutem Erfolg. Zu stark angewendet, macht er kranke Wurzeln. Sobald man dies an dem kränklichen Aussehen der Pflanze merkt, ist sie sofort aus dem Topf herauszunehmen, und nach Entfernung der alten Erde und der schlechten Wurzeln in frische, nicht zu fette und mit etwas mehr Sand, als gewöhnlich, gemischte Erde umzusetzen und bis zu ihrer Erstarkung so zu behandeln, wie in §. 46 angegeben ist.

50. Das Bespritzen, worunter man ein Befeuchten der Pflanze, nicht des Bodens versteht, geschieht hauptsächlich, um in Gewächshäusern, Mistbeetkästen und Zimmern den Regen und Thau zu ersetzen und Luftfeuchtigkeit zu schaffen, im Freien bei trocknem Wetter aus gleicher Ursache. Dann bespritzt man auch die Pflanzen, um sie zu reinigen. Bei im Freien und in Kästen stehenden Rosen läßt sich das Spritzen am leichtesten mit der Brause der Gießkanne bewerkstelligen; im Gewächshause mit einer Pflanzenspritze. In Zimmern bespritzt man mit einer naßgemachten Bürste, indem man schnell mit der Hand darüber streift; oder man nimmt Wasser in den Mund, wodurch es auch sogleich erwärmt wird und sprudelt es möglichst staubregenartig über die Pflanzen. Eine der vorzüglichsten Zimmerspritzen ist der sogenannte Rafraïcheur, welcher häufig von Aerzten und Nichtärzten, besonders von Damen benutzt wird, um sich in Gestalt des feinsten, dichtesten Staubregens mit wohlriechenden oder Nerven stärkenden

Gewässern zu benetzen. In neuerer Zeit ist dieser Refraïcheur (Drosophor), dadurch bedeutend verbessert worden, daß man das Hineinblasen, um die nöthige Luftströmung hervorzubringen, nicht mehr mit seiner eigenen Lunge zu besorgen braucht, sondern diese durch eine Windkugel von Gummi, welche man blos mit der Hand kräftig zusammen zu drücken braucht, ersetzt. Der Refraïcheur *) bietet besonders für die Zimmergärtnerei außerordentliche Vortheile, nicht nur dadurch, daß bei dessen Gebrauch das Zimmer selbst nicht mit durchnäßt wird, wie dies beim Gebrauch einer Spritze, Brause oder Bürste kaum zu umgehen ist, sondern es läßt sich auch mit ihm jeder beliebige Grad von Feuchtigkeit erzielen. Aber es kann auch keine bessere Vorrichtung geben, feindliche Insekten zu vertilgen, wenn man statt Wasser ein Absud von Tabak, Insektenpulver, Schwefelblüthe oder Kampher nimmt. Keiner der versteckteſten Winkel, zu welchem weder der Strahl der Spritze noch der Brause dringt, und in welchem gerade die meisten Brutnester sitzen, bleibt hier unverschont und in kürzester Zeit ist an der ganzen Pflanze kein Thierchen mehr zu finden, das nicht vollständig befeuchtet worden wäre.

Das Spritzen darf nicht geschehen, während die Sonne auf die Pflanzen scheint, sondern im Winter stets des Morgens, bevor die zu erwartende Sonne darauf wirkt, und im Sommer des Abends. Spritzt man des Reinigens wegen, so müssen die Pflanzen umgelegt werden, damit die Erde nicht davon naß wird.

*) Ich nehme an, daß dieses Instrument hinlänglich bekannt ist und weiter keiner nähern Beschreibung bedarf, da es wohl jetzt in den meisten Städten in Magazinen zu haben ist.

Zweites Kapitel.

Ueber das Schneiden der Topfrosen.

51. Beim Schneiden der Topfrosen ließe sich im Allgemeinen dasselbe wiederholen, was schon über den Schnitt der im freien Lande stehenden gesagt wurde. Es ist auch hier durchaus nöthig, den Charakter der Pflanzen kennen zu lernen und sich zu vergegenwärtigen, welcher Zweck und welche Form durch den Schnitt erreicht werden soll. Es lassen sich hier ebenfalls folgende Regeln feststellen: 1) Wenig oder gar nicht werden beschnitten die sämmtlichen Noisetten und Schling- oder Kletterrosen; diese Rosen werden nur nach ihrer Blüthezeit ein wenig zurückgeschnitten und dabei zugleich diejenigen Zweige entfernt, welche theils dünn und unfähig zur Entwicklung vollkommener Blumen sind, theils aber auch eine unpassende Stellung einnehmen und den andern kräftigen Zweigen gleichsam im Wege stehen; endlich sind die sogenannten frechen Triebe gänzlich zu entfernen. Besser ist es allerdings, gar keine unnützen Triebe zur Entwicklung kommen zu lassen, sondern sie schon als Augen zu entfernen (s. §. 16). 2) Auf 4 bis 5 Augen werden die sämmtlichen starktreibenden Sorten geschnitten, so z. B. die Centifolien, Remontanten, Perpetuellen, mehrere Bourbon- und Theerosen, mit Ausnahme der sehr starktreibenden, welche weniger tief zurückgeschnitten werden dürfen. 3) Den Schnitt auf 2 bis 3 und höchstens 4 Augen verlangen alle weniger starktreibenden Bengal-, Bourbon- und Theerosen, sowie auch die schwachtreibenden aus den andern Gruppen, damit dadurch ein stärkerer Trieb geweckt werde. Was die Erzielung einer gewissen schönen Form anbelangt, bestehe sie in Kugel-, Pyramiden-, Fächer- oder Spiralform (letztere besonders bei Schlingrosen anwendbar), so läßt sich diese nicht auf einmal durch den Frühjahrsschnitt erreichen, sondern es wird hier das nämliche Verfahren, wie bei dem Spalierobst, angewendet, welches theils auf dem zeitgemäßen Ausbrechen der gegen die bestimmte Form strebenden Triebe, theils auf einem fleißigen Anbinden aller seitwärs, also gegen die vorgesetzte Norm, wachsenden Zweige an Stäbchen beruht.

52. Die Zeit des Schneidens der Rosen in den Töpfen richtet sich nach deren Bestimmung. Für diejenigen Rosen, welche nicht angetrieben werden, und daher dem naturgemäßen Gange ihres Wachsthums überlassen bleiben, eignet sich der Monat März oder auch schon Februar am besten

zu dieser Operation. Die Noisetten und Schlingrosen machen eine Ausnahme (s. vorigen §.). Außerdem ist es nöthig, die abgeblühten Zweige auf einige Augen zurückzuschneiden; hauptsächlich verlangen dies zur sofortigen Entwickelung und Kräftigung der darauf folgenden Blüthe alle mehrmals blühenden Rosen, also die sämmtlichen Perpetuellen, Remontirenden, Thee-, Bourbon-, Bengal- und Noisetterosen. Bei dieser Verrichtung muß ebenfalls auf die gewählte Form der Krone Rücksicht genommen werden, damit nicht durch eine Vernachlässigung derselben das Ebenmaß der Krone beeinträchtigt wird.

53. Für die wurzelächten Rosen von kräftigerem Wuchse ist wohl die pyramidale Form die passendste, welche man dadurch erreicht, daß man einen mittleren Haupttrieb heranzieht, um welchen die aus demselben entstehenden Zweige gleichmäßig vertheilt werden, und je weiter nach unten, desto mehr an Länge zunehmen. Um jeden Zweig in die gewünschte Richtung zu bringen, ist es nöthig, sogleich nach dem Beschneiden die unteren langgelassenen Triebe auf geeignete Weise an einem um den Topfrand gebundenen Draht zu befestigen, was auch bezweckt, daß alle ihnen gelassenen Augen von der Basis bis zur Spitze austreiben. Um die höher stehenden in die gewünschte Richtung bringen zu können, bindet man sie an dünne, grün angestrichene Stäbe, welche der Farbe der Blätter so ähnlich als möglich sein müssen, eher dunkler als heller; sonst werden sie hervorleuchten und der Schönheit der Pflanze Abbruch thun. Auch die neugebildeten Triebe müssen, wenn sie gegen den entworfenen Plan wachsen, wiederum angeheftet werden. Daß das Vertheilen der Stäbchen mit Umsicht und Geschmack geschehen muß, versteht sich von selbst, ebenso, daß kein Trieb den andern benachtheiligen und die Zweige nicht zu dicht stehen dürfen, wenn eine üppige Belaubung und vollkommene Blumen erzielt werden sollen. Das Knospenausbrechen ist hier besonders zu empfehlen, denn es trägt viel dazu bei, um gut gebildete Pflanzen zu erhalten.

Rosen von niedrigem, schwachem Wuchse werden besser zu kugelförmigen Büschen gezogen, wobei man besonders darauf zu sehen hat, daß die Abrundung recht gefällig ist; sehr oft hat man dabei auch durch Stäbchen nachzuhelfen. Veredelte Rosen, wenn sie hochstämmig sind, zieht man ebenfalls am zweckmäßigsten zu kugelförmigen Kronen; sind sie aber ganz niedrig veredelt, so giebt man ihnen, je nachdem sie stark oder schwachwüchsig sind, wie den wurzelächten, die Pyramiden- oder auch Kugelgestalt.

Man kann die Pflanzen auch so ziehen, daß sie nur die Vorderseite dem Auge darbieten, indem die stärksten Triebe an die Hinterseite gebracht

werden, die andern aber allmählich in der Höhe abnehmen, sowie sie die Vorderseite erreichen, so daß sie gleichsam eine halbirte Pyramide darstellen. Diese Methode ist besonders da mit Vortheil angebracht, wo der Aufstellungsort nicht gestattet, die Pflanzen von allen Seiten in Augenschein nehmen zu können.

Unter den Noisetterosen giebt es einige, welche in Töpfen auch als Schlingrosen gezogen werden können, indem man Draht oder Holzgestelle, oder dieselben vertretende Stäbe von Cylinder- oder irgend einer andern Form, was jedoch immer dem Geschmack des Züchters überlassen bleiben muß, damit überzieht, wobei jedoch auch Rücksicht auf den verschiedenen Grad des Wachsthums jeder einzelnen Sorte zu nehmen ist. Hierher gehören unter andern Jeanne Desprez, Lamarque, Solfatare. Auf jeden Fall sollte ein solches Gestell nicht die Höhe von 1 Meter übersteigen. Zunächst ist auf die Erzeugung einiger recht kräftiger Triebe, welche die nöthigen Zweige für den zu bekleidenden Gegenstand liefern, hinzuarbeiten. Im Allgemeinen gelten dieselben Regeln, wie sie in §. 19 über die Kletterrosen angegeben sind; wie bei diesen, hat man auch hier so zu ziehen und zu schneiden, daß die Pflanze von unten nach oben gut und regelmäßig belaubt und dicht mit Blumen bedeckt sei. Um dies zu erzielen, dünne man die Pflanzen nicht zu sehr aus, sondern entferne blos die schwächlichen, nicht gehörig reif gewordenen Triebe. Die vom Messer verschont gebliebenen aber stutze man blos bis auf diejenigen Augen ein, welche kräftig ausgebildet sind und vollkommene Blumen zu liefern versprechen. Durch niedriges Veredeln dieser Topfschlingrosen auf die gewöhnliche Centifolie gelangt man früher zu ausgebildeten Exemplaren. Auf 60 — 90 Centimeter hohe Stämmchen veredelt, liefern diese Rosen auch niedliche Trauerrosen, wozu sich ganz besonders die Banksrosen (R. Banksiae) und andere zarte schlingende Sorten eignen.

Drittes Kapitel.

Das Verpflanzen, Versetzen oder Umtopfen.

54. Obgleich sich eine bestimmte Zeit für das Verpflanzen aller Topfrosen nicht festsetzen läßt, so ist doch im Allgemeinen diejenige als die geeignetste anzunehmen, in welcher sie sich in dem Stadium der Ruhe befinden,

welche ihnen als eine Erholung nach der Anstrengung ihrer Kräfte vor und während der Blüthezeit dient, also der Monat August, was hauptsächlich für die harten und starkwurzelnden Rosensorten gilt, die man jährlich nur einmal umpflanzt, wobei man ihnen Töpfe von ungleich größerem Durchmesser geben kann, als man es bei den zarteren und langsamer wachsenden thun darf. Für die Rosen, welche den Winter vorher zum Treiben benutzt worden sind, tritt natürlich eine frühere Ruheperiode ein, wonach sich dann auch das Verpflanzen richtet (s. im 4. Abschnitt). Bei jungen Pflanzen, welche als bewurzelte Stecklinge im Spätsommer oder Herbst in kleine Töpfchen gepflanzt worden sind, macht es sich meistens nöthig, sie schon zeitig im Frühjahr in ihnen angemessene größere Töpfe zu verpflanzen und im Juli oder August ein abermaliges Verpflanzen vorzunehmen. Pflanzen, welche im Herbst oder Frühjahr aus dem freien Lande in Töpfe gepflanzt worden sind, beanspruchen oft auch, nachdem ihr erster Flor vorüber ist, wieder umgepflanzt zu werden.

Als Grundsatz für das Verpflanzen läßt sich feststellen, es nicht eher vorzunehmen, als bis eine starkverwurzelte Rose eine Erneuerung frischer Erde zu ihrer Kräftigung nöthig hat. Das kann nur dann mit dem günstigsten Erfolge geschehen, wenn der Zeitpunkt gewählt wird, wo ein nothwendiges Beschneiden des starkverwurzelten Ballens ohne Nachtheil für die jungen, noch nicht ganz verholzten Triebe vorgenommen werden kann. Irgend welche auf Erde und Wurzeln nachtheilig gewirkt habende Einflüsse machen allerdings eine sofortige Erneuerung der Erde zu jeder andern Jahreszeit nöthig.

Eine Verpflanzung der Topfrosen in größere Gefäße vorzunehmen, wenn ihre Wurzeln noch freien Spielraum und hinreichende Nahrungsstoffe besitzen, wie man es oft bei krautartigen Pflanzen zu thun pflegt, bringt nicht die günstige Wirkung auf ein freudiges, kräftig fortschreitendes Wachsthum hervor, wie es bei diesen der Fall ist. Bei starktreibenden Rosensorten (z. B. den meisten Noisetten und vorzüglich bei der R. Banksiae), ist es sogar erwiesen, daß sie nur in starkverwurzeltem Zustande sich erst willig zeigen, einen reichen Flor zu entwickeln. Doch darf dieses Resultat den Rosenzüchter nicht zu dem irrigen Verfahren verleiten lassen, mit dem Versetzen der Rosen so lange zu warten, bis ihre Nahrungsbedürftigkeit an der spärlichen Entwicklung neuer Triebe sich verräth. Also beide Extreme sind zu vermeiden, und die Topfrosen weder zu früh noch zu spät zu verpflanzen; im ersteren Falle würde die unzeitige Zuführung frischer Erde eine Ueberfüllung der Säfte herbeiführen, woraus leicht Siechthum entstehen kann; im

letzteren würden die Rosen aus Mangel an Nahrung kaum im Stande sein, vollkommene Blätter und Blüthen zu entwickeln. Starktreibende wurzelächte Rosen, wie es besonders den Schlingrosen (Noisette-, Banks- und den vielblumigen Rosen u. a.) eigenthümlich ist, können, ohne daß das Wachsthum beeinträchtigt wird, mehrere Jahre unverpflanzt bleiben, nur versäume man nicht, vor der Entwickelung ihrer Blätter und Blüthen einige Male mit einem Düngerguſſe zu gießen. Die andern Rosenarten aber, welche willig blühen, müssen alljährlich verpflanzt werden, und zwar schon aus dem Grunde, weil sie, stark zurückgeschnitten, mehr Nahrung zur Entwicklung kräftiger Triebe bedürfen, welche gerade die meisten und schönsten Blumen hervorbringen.

Um eine zweite schöne Flor herbeizuführen, welche der ersten, gewöhnlich von Anfangs Mai bis Ende Juni dauernden, nicht nachsteht, schlägt man folgendes Verfahren ein:

Sobald die erste Blüthe zu Ende gegangen, sucht man der Pflanze für 14 Tage bis 3 Wochen eine Ruhezeit zu verschaffen, welche man dadurch erzielt, daß man das Gießen einstellt und die Töpfe nach der der Wetterseite entgegengesetzten Richtung umlegt, damit sie nicht durch etwa eintretende Regen durchnäßt werden können. Nachdem so das Holz der Rosen die nöthige Härte erhalten, werden die Töpfe wieder aufgerichtet und die Pflanzen dem gewöhnlichen Schnitt unterworfen. Hierauf topft man sie vorsichtig um, nimmt von dem Wurzelballen die äußere Schicht Erde weg, ersetzt sie durch frische, wie es in §. 42 angegeben ist, begießt die Pflanze wieder reichlich und wiederholt das Gießen so oft, als es nöthig ist.

Dieses Verfahren läßt sich selbstverständlich blos mit remontirenden Rosen vornehmen.

Nach dem Umpflanzen werden die Rosen so aufgestellt, daß sie gegen den direkten Einfluß der Sonnenstrahlen und heftigen Winde geschützt sind.

Der zweite Flor beginnt dann im Juli oder August. Dabei hat man keineswegs zu fürchten, daß die Rosen durch dieses Verfahren erschöpft werden.

55. Beim Verpflanzen der Rosen in größere Töpfe wird auf folgende Weise verfahren: Während man den Topf mit der rechten Hand faßt, breitet man zu gleicher Zeit die linke über die Oberfläche der Erde in der Weise aus, daß die Pflanze zwischen dem Mittel und Goldfinger zu stehen kommt, kehrt sie sogleich um und stößt sanft mit dem Rande auf den Verpflanztisch oder auf einen andern hölzernen Gegenstand, oder man klopft etwas mit der rechten, flachen Hand von unten gegen den Topfrand und

hebt den Topf ab. Während man mit der linken Hand den Wurzelballen fest hält, lockert man mit dem sogenannten Verpflanzholz, welches die Gestalt eines zugespitzten, 1 Centim. starken und 20—25 Centim. langen Pflanzenstabes haben muß, und dessen oberer Theil spatenartig breit ausläuft, mit dem zugespitzten Ende den Wurzelballen, von oben nach unten behutsam fahrend, in der Weise auf, daß nicht nur der Wurzelfilz, welcher das Abzugsmaterial nebst der das Abzugsloch bedeckenden Scherbe umschlungen hält, entfernt wird, sondern auch die übrigen Wurzeln von ihren Verschlingungen so gelöst werden, daß die Wurzelenden frei werden; zugleich wird die obere Fläche des Wurzelballens sorgfältig aufgelockert, wodurch derselbe, nachdem die bloßgelegten Wurzeln fast bis an den Ballen mit einem scharfen Messer weggeschnitten worden sind, eine beinahe kugelige Gestalt bekommt. Hierauf nimmt man einen von allem Schmutz — wenn nöthig durch Abwaschen — in und auswendig gründlich gereinigten Topf, in welchem der Wurzelballen der Rose 2 Centim. weit Raum um sich hat, legt auf das Abzugsloch eine Scherbe, und hierauf 2 Centim. hoch kleingeklopfte Scherben, Ziegelstücke, Holzkohlen oder trocknes reines Moos (letzteres muß aber etwas fest zusammengedrückt werden), breitet darüber von der oben bezeichneten Erde so hoch auf, daß wenn die Rose darauf zu stehen kommt, die Oberfläche des Wurzelballens noch 1 bis 2 Centim. Raum zu Bedeckung mit Erde behält, füllt mit der rechten Hand, während die linke die Rose genau in der Mitte des Topfes hält, den Zwischenraum mit Erde aus, stößt einige Mal den Topf auf dem Tisch sanft auf, kann auch zur Nachhülfe, damit keine leeren Stellen bleiben, mit dem spatenartigen Theile des Versetzholzes die Erde mäßig hinunterdrücken, füllt dann den Topf beinahe ganz mit Erde und drückt die Oberfläche mäßig fest an, so daß noch ein Rand zu hinlänglicher Aufnahme des Wassers beim Begießen bleibt. — Kommen Pflanzen vor, welche noch nicht so stark verwurzelt sind, daß sie ein Verpflanzen nöthig haben und deren Erde überhaupt noch gut ist, so topfe man sie, ohne den Wurzelballen weiter zu verletzen, wieder ein, entferne dann blos die obere schlechtere Erde vom Ballen und ersetze sie durch frische.

56. Nachdem nun alle verpflanzt sind, bringe man sie in einen kalten Kasten möglichst nahe unter Glas, worauf sie dann vermittelst einer Brause stark angegossen werden. Der Boden des Kastens muß einige Centimeter hoch mit Sand oder Kohlenstaub belegt sein. In Ermangelung eines Kastens muß man seine Zuflucht zu einer der oben bezeichneten anderen Räumlichkeiten nehmen. In der ersten Zeit bis zu ihrer Anwurzelung, was man an der Entwickelung neuer Triebe bemerken kann, werden sie vor dem Son-

nenschein, anfangs durch dichte, später durch leichte Beschattung geschützt und die Fenster geschlossen gehalten, dabei müssen die Rosen aber täglich, ausgenommen bei trüber, regnerischer Witterung, mit überschlagenem Wasser überspritzt werden. So wie sie sich vollständig erholt haben und nach und nach an die freie Luft und das Sonnenlicht wieder gewöhnt sind, werden sie bis zum Bezug des Winterquartieres wieder an ihren Sommeraufenthalt gebracht.

Hat man für seine frisch verpflanzten Topfrosen keine passende Räumlichkeit, wo man ihnen die für ihre Erholung nöthigen Erfordernisse bieten kann, so muß man sich helfen, so gut als es nur irgend geht, indem man wenigstens dafür sorgt, daß sie bis zu ihrer völligen Erstarkung gegen die austrocknende Luft und Sonne hinlänglich geschützt und täglich mehrmals überspritzt werden, damit sie stets in einer möglichst feuchten Luft stehen.

Viertes Kapitel.

Ueberwinterungslokale.

57. Obgleich die Topfrosen während des Winters sich in einem gewissen Ruhestande befinden, um für ihre künftige Vegetationszeit wieder hinreichende Kräfte zu sammeln, so verlangen sie doch während derselben einen hellen, so viel als möglich dem Glase nahe gelegenen Standort, wo sie Sonne und bei milder Witterung auch frische Luft genießen können. Von einem zweckmäßig gelegenen und beschaffenen Ueberwinterungslokal hängt ein kräftiges Gedeihen der Rosen ab. Sie verlangen schon deshalb während des Winters Luft und Licht, weil die Luft nicht nur ihre noch schlafenden Augen kräftigt, sondern auch eine vorzeitige Entwickelung derselben zurückhält; das Licht schützt die Rose gegen Bleichsucht, welche leicht aus Mangel an Licht entsteht. Können mit dem Licht auch noch Sonnenstrahlen eindringen, so wird jene vegetative Wärme erzeugt, welche nicht nur für die Rosen, sondern für alle Pflanzen so wohlthuend ist, und die keine künstlich erzeugte bewirken kann. Daher eignet sich für die Topfrosen ein jeder Raum als Winterlokal, wo sie genug Luft, Licht und womöglich auch Sonne genießen können. Doch muß ein solcher so beschaffen sein, daß weder Kälte noch

Feuchtigkeit eindringen können; erstere würde besonders die zarteren Rosensorten zerstören und außerdem durch das Gefrieren der Wurzelballen nicht nur die Töpfe zersprengen, sondern auch den Wurzeln der härteren Arten schaden. Die Feuchtigkeit, zumal im Winter bei niedriger Temperatur, erzeugt Wurzelfäulniß und auch Moder, wodurch selbst die härteren Rosen verdorben werden können.

Jedes zur Ueberwinterung der Topfrosen bestimmte Lokal, sei es ein Gewächshaus, Mistbeetkasten, frostfreies Zimmer oder Blumenfenster, sollte womöglich nach Süden, Südost, oder Südwest gelegen sein. Ist man genöthigt, in Ermangelung solcher Räumlichkeiten sich nach Morgen und Abend gerichteter zu bedienen, so muß ihnen doch wenigstens ein freier Zutritt frischer Luft und ein reichlicher Genuß des Lichtes gestattet sein.

58. Ist man im Besitz eines gewöhnlichen Orangeriehauses (Gewächshaus mit senkrecht stehenden Fenstern), oder eines Gartensalons, welcher zu nur frostfreier Ueberwinterung von Pflanzen eingerichtet ist, so stellt man die Rosen auf Stellagen nahe den Fenstern oder auf die angebrachten Fensterbretter; hier erhalten sie nicht nur hinreichend Licht und Sonne, sondern auch viel frische Luft bei der oft nöthigen Lüftung für die Orangerie. In andern Gewächshäusern, welche zur Ueberwinterung der sogenannten Kalthauspflanzen bestimmt sind, müssen die Rosen ebenfalls immer einen Standort nahe den Fenstern einnehmen.

59. Als Glashaus, welches nur zur Topfrosenkultur dienen soll, eignet sich das sogenannte Satteldach, auch Doppelpage genannt, deren Vorderseite nach Süden und die Hinterseite nach Norden gerichtet ist. Die Nordseite braucht aber nur zur Hälfte mit Glas gedeckt zu sein und kann von den Schlingrosen eingenommen werden. Auf der Südseite wird eine von Brettern, noch besser, um die steten Reparaturen zu vermeiden, von glatten Dachziegeln, Schiefer- oder Eisenplatten, welche auf eisernen Trägern ruhen, verfertigte Tafel errichtet, welche 5 bis 7 Centim. hoch mit Kohlenstaub oder kleinen Kohlenstückchen belegt wird, worauf die Rosen in der Weise zu stehen kommen, daß sie sich weder einander zu sehr berühren, noch eine schiefe Stellung erhalten (was beim Begießen eine einseitige Befeuchtung der Wurzelballen zur Folge hat); endlich ist besonders darauf zu sehen, daß die kleinsten Rosen nach vorn und die größten nach hinten gestellt werden, damit die größern den kleinern den Genuß des Lichtes nicht entziehen. Die Nordseite der Doppelpage wird am zweckmäßigsten mit rankenden Rosen, aus den Gruppen der Thee-, Noisette, der vielblumigen (multiflora), und der Banksrose bekleidet, welche in ein mit der Rosenerde angefülltes Beet

gepflanzt werden. Die Fenster müssen so eingerichtet sein, daß sie bequem gelüftet, und wenn es nöthig ist, abgehoben werden können. Auch ist es zweckmäßig, in jedem Fenster eine Scheibe zum Aufschieben einzurichten, um den Luftzutritt nach Belieben gestatten zu können. In der Giebelmauer ist ebenfalls ein zu öffnendes Fenster anzubringen, sowie in den Grundmauern Luftklappen, damit, wenn bei Regenwetter die obern Fenster nicht geöffnet werden können, durch diese Luftzutritt bewirkt werden kann. Anfangs Sommer, sobald keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind, entfernt man die Fenster ganz, und legt sie dann nur auf, wenn während der Blüthezeit Regenwetter eintreten sollte. Da die Topfrosen während des Winters nur eben frostfrei zu halten sind, so ist nur im dringenden Falle eine einfach konstruirte Kanalheizung nöthig, deren Ofen aus Chamottesteinen (sogen. Wolf), und gut gebrannten Thonröhren besteht, welche an der Vorderseite hinlaufen. Um statt des Holzes auch mit Kohlen heizen zu können, ist es nöthig, die Heizung mit einem Roste zu versehen und für guten Zug zu sorgen, sowie auch den Kanal, statt von Thonröhren, lieber von glatten Ziegeln (sogen. Ochsenzungen) herrichten zu lassen. Uebrigens wird das Haus bei kalter Witterung mit Strohdecken und Läden gedeckt.

60. Ferner können die Rosen in einem frostfreien Kasten, bestehe derselbe in einem gemauerten Mistbeet- oder sonstigen Pflanzenkasten, überwintert werden. Die Seitenwände eines solchen Kastens werden von außen mit einem 63 Centim. breiten Umschlag von Laub, Moos, Nadelstreu oder von dem in den Mistbeeten verwendet gewesenen, schon mehr oder weniger verrotteten Mist umgeben. Diesen Umschlag muß man aber ganz mit Brettern bedecken, damit er nicht von Regen und Schnee durchnäßt und das etwa angewandte Laub oder Moos nicht vom Winde fortgeführt werden kann. Zum Schutz gegen Kälte, Schnee und kalten Regen bedeckt man den Kasten, außer mit Fenstern, noch mit dicken Strohdecken und Läden oder Brettern.

61. Die Ueberwinterung der Topfrosen in einem frostfreien Zimmer ist wohl im Ganzen mit weniger Umständen verknüpft, als wie in Gewächshäusern und Mistbeetkästen; aber dennoch bleibt ein solches Winterlokal, wegen der Beschränktheit des Lichtes, nur ein Nothbehelf. Hat man aber weiter keinen anderen Aufbewahrungsort, so bringe man in einem solchen frostfreien Zimmer die Tafel oder den Tisch, worauf die Rosen gestellt werden sollen, wenigstens ganz nahe den Fenstern. Stellt man Rosen zwischen die Doppelfenster, so muß jeder ein Untersetznapf gegeben werden, damit beim Gießen das aus dem Abzugsloche des Topfes fließende Wasser nicht Veranlassung zum Verfaulen der Fensterbalken giebt. An der inneren Seite

der zwischen den Fenstern befindlichen Wand bringt man ein Thermometer an, um sehen zu können, ob ein Heizen nöthig ist.

62. Kann man seinen Topfrosen zum Ueberwintern blos einen Platz im Keller anweisen, so ist es unerläßlich, daß derselbe möglichst hell ist und bei gelinder Witterung ordentlich gelüftet werden kann; im entgegengesetzten Falle treiben die Rosen zu zeitig aus und gehen leicht an der Bleichsucht zu Grunde. Für die Ueberwinterung von harten Landrosen, die man in Töpfen ziehen will, ist ein solcher Keller einem Glashaus noch vorzuziehen, da sie in jenem nicht so früh austreiben.

Fünftes Kapitel.

Noch einige speciellere Bemerkungen über die Kultur der Topfrosen.

63. Wie schon in §. 48 bemerkt wurde, trägt zu einem freudigen Gedeihen der Topfrosen hauptsächlich ein sorgfältiges Begießen mit Berücksichtigung der Jahreszeit, der Temperatur und des Wachsthums der Pflanzen bei. Man hat sie daher während des Winters erst dann zu gießen, wenn die völlige Trockenheit der Erde wahrzunehmen ist, doch darf dieselbe auch nicht so stark austrocknen, daß sie fast unfähig wird, das Wasser anzunehmen. Ist das Gießen nöthig, so geschehe es Vormittags oder spätestens Mittags und zwar mit überschlägenem Wasser, indem die Wurzeln dies rascher aufsaugen und es ihnen auch keine Erkältung verursacht, wie es bei späterem Gießen und noch dazu mit kaltem Wasser der Fall ist. Das Bespritzen unterlasse man während ihre Ruhezeit ganz; muß es bei den im Zimmer stehenden Rosen geschehen, um den Staub abzuspülen, so lege man die Töpfe um, damit dabei die Erde nicht mit durchnäßt wird.

Licht gestattet man ihnen so oft, als es die Witterung gestattet, durch das Abdecken der Strohdecken und Läden. In Kästen, oder in Gewächshäusern stehende Rosen müssen es zuweilen bei Schneewetter und bei starker Kälte ohne Sonnenschein entbehren, was ihnen, wenn sie nur trocken stehen, auch weiter keinen Nachtheil bringt. Kommt die Sonne hervor, so entferne man die Bedeckung so lange, als die Sonne auf die Fenster wirkt und dieselben nicht gefrieren, wobei auch, wenn die Temperatur unter den Fenstern

über 6 Grad steigt, in der Mittagszeit ein wenig gelüftet werden kann, damit die Triebe durch zu hohe Temperatur nicht vorzeitig hervorgelockt werden. Bei einer Temperatur von 2 Grad Wärme im Freien kann ebenfalls schon gelüftet und von in Kästen stehenden Rosen können bei trockner Witterung die Fenster ganz abgenommen werden.

64. Nachdem die Rosen beschnitten worden sind, hält man sie noch einige Tage trocken und kühl, dann aber giebt man ihnen einen der schon erwähnten Düngergüsse, was man vor der Entwickelung der Knospen noch einmal wiederholen kann. Je mehr die neuen Triebe sich entwickeln, desto mehr verlangen die Rosen auch begossen zu werden. Niemals dürfen sie während ihres üppigen Wachsthums zu trocken, noch viel weniger welk werden, und beim Begießen muß ihnen so viel Wasser gegeben werden, daß der ganze Wurzelballen hinreichend befeuchtet wird. Diejenigen Pflanzen aber, bei denen die Erde noch feucht ist, übergeht man beim Gießen. Auch das Bespritzen ist an warmen, sonnigen Tagen nicht zu versäumen. Beides aber, das Gießen und das Bespritzen darf nicht geschehen, so lange die Rosen von der Sonne beschienen werden, indem sie bei Nichtbefolgung dieser Vorsicht leicht von Blattläusen und anderm Ungeziefer befallen werden. Bei ihrem fortschreitenden Wachsthume dürfen die Rosen auch keinen Mangel an frischer Luft leiden, weil diese ebenfalls zu ihrer vollständigen Gesunderhaltung beiträgt und sie auch gegen viele ihrer Feinde schützt. Besonders sollte man ihnen auch bei warmer Witterung die für eine gesunde und kräftige Entwickelung der Blätter und Blüthen so günstig einwirkende Nachtluft nicht entziehen.

65. Während der Blüthezeit, welche, wenn man die Rosen sich naturgemäß entwickeln läßt, anfangs Mai beginnt und je nach den verschiedenen Arten bis zum August, ja bei den remontirenden bis zum Spätherbste fortdauert (s. §. 54), müssen sie in den heißesten Stunden des Tages beschattet werden. Stehen sie auf Fensterbrettern, so läßt sich dies am leichtesten durch darüber angebrachte Marquisen bewerkstelligen. Stehen sie auf einer Stellage im Freien oder auf einem Beete, so lassen sich verschiedene Vorkehrungen zum Schattengeben treffen, z. B. dünnes Gazetuch, zum Auseinander- und Zusammenrollen eingerichtet, hölzerne Schattenhorden, Decken von Schilfrohr u. dergl. m. Gegen Regen und stürmisches Wetter müssen ihre Blüthen durch leichte Läden, Wachsleinwand, Segeltuch, oder wenn die Einrichtung danach ist, noch besser durch übergelegte Fenster geschützt werden. Unter dem gegen nachtheilige Witterungseinflüsse wohlthuenden Schutze eines luftigen Glashauses befinden sich daher die blühenden Rosen am wohlsten

und entwickeln ihre Blumen so vollkommen, wie es bei den im freien Lande stehenden kaum erzielt werden kann. Ein solches läßt sich leicht durch eine andere einfache Vorkehrung ersetzen, indem man auf beiden Seiten eines Beetes oder einer Stellage in 1,30 bis 1,50 Meter Entfernung Pfähle einschlägt, darauf Latten nagelt und auf diese Fenster legt, welche etwas gegen den Sturm zu sichern sind. Die hinteren Pfähle müssen etwas höher sein als die vorderen, damit die Fenster die nöthige Neigung — auf 1,30 Meter Breite ungefähr 31 Centim. — bekommen.

66. Nach beendigtem Flore ist die geeignetste Zeit zum Verpflanzen und man thut wohl, sie durch etwas sparsameres Gießen erst dazu vorzubereiten. Auch nach dem Verpflanzen halte man die Erde, bis die Rosen erst wieder frische Wurzeln treiben, weniger feucht, indem durch übermäßige Feuchtigkeit die beschnittenen Wurzeln leicht anfangen können zu faulen.

67. Zu einem gesunden Zustande der Rosen trägt ferner auch die Reinlichkeit sehr viel bei. So oft Unkraut und gelbe Blätter sich zeigen, sind diese zu entfernen, womit sogleich auch ein zeitweises flaches Auflockern der oberen Erde, ohne daß die Wurzeln dabei verletzt werden dürfen, verbunden werden kann. Das Reinigen von Staub ist hauptsächlich, so oft als es nöthig ist, vorzunehmen, weil durch diesen nicht nur Verstopfungen der feinen Spaltöffnungen — der Athmungsorgane der Pflanzen — herbeigeführt werden, sondern auch das Gedeihen des Ungeziefers noch mehr befördert wird.

Dritter Abschnitt.

Vermehrung der Rosen.

Vorbemerkung.

Die Rose läßt sich nach fast allen bekannten Methoden vervielfältigen, und zwar ist die Vermehrung eine geschlechtliche oder eine ungeschlechtliche. Die erstere wird allein durch Fortpflanzung aus Samen bewirkt. Die hieraus gewonnenen Erzeugnisse der wirklichen Arten sind konstant, die der Abarten, Spielarten und Blendlinge sind veränderlich. — Die letztere läßt sich auf die verschiedenste Weise ausführen, entweder aus Ausläufern, Ablegern, Wurzelschnittlingen und Stecklingen, oder durch Verpflanzung eines Auges oder Zweiges auf einen verwandten Grundstamm, also durch Okuliren, Pfropfen und Kopuliren in den verschiedenartigsten Formen. Durch die erstern Vermehrungsmethoden erhält man wurzelächte, durch die letzteren veredelte Pflanzen.

Erstes Kapitel.

Geschlechtliche Fortpflanzung oder Vermehrung aus Samen.

68. Die Vermehrung aus Samen kann ein zweifaches Ziel verfolgen. Entweder will man durch Aussaat neue Spielarten von Gartenrosen erzielen,

oder man will gewisse Stammformen in größerem Maßstabe vervielfältigen, um sie als Unterlagen behufs einer Aufsetzung edler Rosen, oder zu irgend einem anderen Zwecke zu benutzen.

Die Anzucht edler Rosen aus Samen ist nicht allein für den Gärtner vom Fach, sondern auch für den Liebhaber eine höchst angenehme, und wenn man mit Nachdenken und Umsicht an das Werk geht, auch eine lohnende Beschäftigung. Keine zu den Blüthensträuchern zählende Pflanzengattung ist in demselben Grade der Variation unterworfen, wie die verschiedenen Formen der Gartenrosen, und man kann sicher darauf rechnen, unter Hunderten von Sämlingen kaum zwei zu finden, welche in allen ihren Merkmalen vollkommen übereinstimmen. Die meisten werden in ihren dekorativen Eigenschaften die Mutter nicht erreichen, andere jedoch werden ihr nahe kommen oder sie wohl gar übertreffen, und wenn man dergleichen Aussaaten in größerem Maßstabe vornimmt, so darf man immer auf einige annehmbare und von allen andern verschiedene Erzeugnisse rechnen, besonders in dem Falle, daß man die Pflanzen, von denen die Samen stammen, kreuzweise befruchtet hätte. Nur die Gartenrosen sind, selbst ohne vorausgegangene künstliche Befruchtung, zur Variation geneigt. Die eigentlichen Arten dagegen bleiben sich treu, seltene Ausnahmen abgerechnet. Die meisten unserer Gartenrosen sind Blendlinge (Bastarde, Hybriden), und die Charaktere der Gruppen nicht selten so sehr verwischt, daß die Urformen, denen sie ihr Dasein verdanken, schwer herauszufinden sind.

Beim Kreuzen oder Hybridisiren*) selbst verfährt man auf folgende Weise: Ist die Rose, welche befruchtet werden soll — die Mutterblüthe — durch starke Füllung von Natur aus aller ihrer Staubgefäße beraubt, so erwarte man den Moment des vollständigen Aufblühens, in dem die Narben der Griffel eine klebrige Flüssigkeit absondern. Dies ist der geeignetste Augenblick, mittelst eines feinen trocknen Tuschpinsels den Blüthenstaub — die Pollenkörner — auf die schleimige Oberfläche der Narbe zu übertragen. Nachdem Feuchtigkeit und Thau völlig vertrocknet sind, etwa zwischen 9 und 11 Uhr Vormittags, begiebt man sich zu derjenigen Rose, mit welcher man zu hybridisiren gedenkt — die also gleichsam die männliche Blüthe vorstellt, daher selbstredend nur eine einfach oder weniger gefüllt blühende sein

*) Rosenfreunde, welche durch ein milderes Klima begünstigt sind und sich mit der Hybridation der Rosen beschäftigen wollen, mache ich, im Fall sie weitere Belehrung darüber wünschen, auf das in Heften erschienene Werk: „Geschwind, die Hybridation und Sämlingszucht der Rosen ꝛc.“ aufmerksam.

kann, — faßt die reifen, bloßliegenden Pollenkörner dadurch auf die Spitze des Pinsels, daß man mehrere Male sanft über die geöffneten Staubbeutel hinwegstreicht und bringt ihn auf die klebrigen Narben der Mutterblüthe, indem man dieselben leicht mit dem Pinsel berührt oder betupft.

Gegen Mittag pflegt nicht selten bei einfachen oder weniger gefüllten, sonach mit Blüthenstaub reichlich versehenen Rosen, ein Theil desselben auf den Grund der Blumenkrone herabzufallen; solch abgefallener Pollen läßt sich dann um so leichter auffassen. Fast noch sicherer aber ist es, wenn man einen Staubfaden mit einer spitzen Pincette unterhalb des Staubbeutels faßt und auszieht, und den Staub behutsam auf der Narbe abstreift.

Enthält die zu befruchtende Mutterblume Staubfäden, so müssen diese, um eine Selbstbefruchtung unmöglich zu machen, bei Zeiten, noch vor dem völligen Erblühen, und zwar bis längstens 7 Uhr Morgens, wo die Staubbeutel noch nicht geplatzt sind, sondern ihren Pollen in den Beutelfächern noch eingeschlossen halten, vermittelst der Pincette herausgezogen und entfernt werden, wobei man die halbentfaltete Blüthe behutsam aus einander legt und zu der am Kelche befindlichen Scheibe gelangen kann, wo die Staubfäden eingefügt sind. Bei dem Herausziehen hat man die Vorsicht zu beobachten, daß man keinen Staubbeutel zerquetsche und den Pollen ausstreue, was nicht zu befürchten ist, wenn diese Operation des Morgens bei Zeiten vorgenommen wird, wo der Pollen noch nicht staubig zerfallen ist. Die Griffel und Narben dürfen ebenfalls nicht im Geringsten verletzt werden.

Will man die aus dem Grunde der Blume entfernten Staubgefäße zu weiteren Befruchtungen benutzen, so hebe man sie sorgfältig auf, lege sie auf eine Glasscheibe in eine kleine Schachtel oder dergl., da solche, der vollen Sonne ausgesetzt, nachreifen, ihre Pollenkörner 8 bis 14 Tage brauchbar bleiben, also zur Befruchtung eben so gut, wie die aus den Blüthen unmittelbar gesammelten verwendet werden können.

Sind sämmtliche Staubbeutel entfernt, so versichere man sich noch einmal, ob nirgends einer derselben zwischen den Blumenblättern noch verborgen, welcher oft zu großen Beirrungen Anlaß geben könnte, da nur sehr wenig des eignen Pollens hinreicht, die Befruchtung zu bewerkstelligen, um so mehr als jedes weibliche Blüthenorgan für den eignen Pollen stets empfänglicher ist. Hierauf bringe man die Blumenblätter möglichst wieder in ihre vorige Stellung und Lage zurück, und erwarte zum Auftragen des fremden Blüthenstaubes den Augenblick des völligen Aufblühens, und verfahre dann, wie oben angegeben worden ist.

Das sorgfältige Zusammenlegen der verschobenen und etwa zerknitterten Blumenblätter ist jedoch nicht durchaus nothwendig; ja man kann, ohne alle Gefahr des Mißlingens der Befruchtung, sogar alle Blumenblätter bis zur Basis abschneiden.

Zuweilen kommt es aber vor, daß die Pollenkörner mehrere Male von den Narben abgestoßen werden, oder auf ihnen lange liegen bleiben, ohne ernährt zu werden und fadenförmig sich zu verlängern. Dieses muß dem Mangel an Honigfeuchtigkeit zugeschrieben werden. Bemerkt man solches, so muß das Auftragen der Pollenkörner um die Mittagsstunde, auch wohl gegen Abend, ja sogar mehrere Tage hintereinander wiederholt werden, bis man den Zeitpunkt erhascht, wo die Narbe am reizbarsten, daher zur Aufnahme des Blüthenstaubes empfänglich ist.

Die Feuchtigkeit derselben ernährt nun die Körner, so daß sie an einer Stelle ihres Umfanges zu einer fadenförmigen Verlängerung, zum Pollenschlauch auswachsen, der durch das leitende Zellgewebe in die Fruchtknotenhöhle dringt und den Theil des Embryosackes berührt, wo die Keimkörnchen liegen. Bald nach geschehener Befruchtung füllt sich der Keimsack mit einem Zellgewebe, dem Sameneiweiß (Endosperm). In diesem bilden sich darauf Reservestoffe, als Stärkemehl, Klebermehl, Oel ꝛc.; welche den jungen Keim ernähren und von ihm bis zur Reife der Frucht entweder vollständig verzehrt werden, oder zum Theil erhalten bleiben und bei der Keimung der jungen Pflanzen zur Nahrung dienen.

Die befruchtete Blume muß dann gegen nachtheilige äußere Einwirkungen, z. B. Regen, der den auf die Narben gebrachten Blüthenstaub wieder abwischt, sowie gegen anderweitige Befruchtung, die leicht durch Wind und Insekten herbeigeführt werden kann, geschützt werden. Ebenso müssen auch diejenigen Blumen, welche an dieser Pflanze nicht befruchtet worden sind, entfernt werden, damit nicht eine nachtheilige Vermischung, oder beim Samenabnehmen Verwechselung entstehen kann.

69. Sind die befruchteten Blumen verblüht, so werden bald die Fruchtknoten anfangen zu schwellen, und wenn sie reifen, ist es nöthig, sie vor den Vögeln zu schützen, obwohl es im Ganzen wenig vorkommt, daß sie von denselben heimgesucht werden. Die Früchte lasse man so lange an der Pflanze, bis sie völlig reif sind und anfangen braun zu werden. Sobald sie gesammelt sind, bezeichne man sie genau mit dem Namen ihrer Abstammung, reinige sie von ihrer fleischigen Hülle, bringe jede Sorte für sich in einen kleinen Topf zwischen feuchten Sand oder Erde, verwahre sie gegen das Eindringen der Mäuse und vergrabe sie in den Erdboden, sofern man

die Aussaat nicht sogleich im Herbste nach der Samenreife bewerkstelligen kann, was eigentlich, sofern man die Kerne gegen Mäusefraß im Freien und sonstige nachtheilige Einflüsse schützen kann, das zweckmäßigere ist. Muß die Aussaat bis zum Frühjahre verbleiben, so darf der Samen auf keinen Fall trocken aufbewahrt werden, indem er in Folge dessen erst im darauf folgenden Frühjahr zu keimen pflegt und der größere Theil die Keimfähigkeit verliert.

Bei der Aussaat von edeln Rosen im Herbste ist es in unserm deutschen Klima vorzuziehen, die Samen anstatt ins freie Land, in kleine hölzerne Kästen oder Samenschalen zu säen, welche mit gesiebter Kompost- und Lauberde und Sand (3 Theile Kompost, 2 Theile Lauberde und $\frac{1}{6}$ Theil Sand, oder eine andere dieser entsprechende Erdmischung) gefüllt und der nöthigen Scherben-, Holzkohlen- oder Moosunterlage, damit ein Versauern der Erde nicht so leicht stattfinden kann, versehen sind. Bevor die Samen darauf kommen, wird die Erde glatt und mäßig fest angedrückt, und dann der Samen mit einer 1 Centim. dicken Erdschicht bedeckt, welche man ebenfalls glatt drückt. Diese Samenkästen oder Schalen bringt man für den Winter in einen gegen Eindringen des Frostes geschützten Mistbeetkasten, ein kaltes Gewächshaus oder einen andern frostfreien Raum nahe dem Glase. Sobald als die Erde anfängt zu trocknen, werden sie mit einer feinen Brause angefeuchtet, und so oft als es die Witterung erlaubt, gewährt man ihnen freien Luftzutritt.

70. Anfangs April werden die Samen anfangen zu keimen und dann erfordern sie besondere Aufmerksamkeit, um alle nachtheiligen Einflüsse fern zu halten; besonders darf die Erde nicht zu trocken werden. Um ein reiches Wurzelvermögen und üppiges Wachsthum zu erzielen, nimmt man die Sämlinge, nachdem sie das vierte Blatt gebildet haben, heraus, verkürzt ihre Wurzeln bis zur Hälfte und pflanzt sie in 14centimetrigem Abstand entweder ins freie Land auf dazu gut zubereitete, nicht der stärksten Sonne ausgesetzte Beete oder in größere Kästen, worauf sie gut angegossen werden. Pflanzt man sie ins Freie aus, so müssen sie vorher an die freie Luft vollständig gewöhnt sein, außerdem ist es auch nöthig, sie bei etwa noch eintretenden Frühjahrsfrösten durch Ueberspannen von Matten zu schützen. Gegen die Sonnenstrahlen und den austrocknenden Wind müssen sie ebenfalls durch Ueberdecken von Nadelreisig oder ein anderes Schutzmittel 2 bis 3 Wochen lang geschützt werden. Die in Kästen gepflanzten Sämlinge sind leicht auf andere Weise bis zu ihrer Kräftigung zu schützen. Diese Pflanzbeete hat man während des Sommers vom Unkraut rein zu halten, die Erde öfter aufzulockern und bei anhaltender Trockenheit gehörig zu gießen.

Kann Umstände halber die Aussaat erst im Frühjahre vorgenommen werden, so ist es gut, die Samenkästen oder Schalen sogleich möglichst warm zu placiren, oder den Samen in ein lauwarmes Mistbeet auszusäen. Im Uebrigen verfährt man auf dieselbe Weise, wie oben angegeben.

Bei Eintritt der rauhen Jahreszeit sorge man für einen guten Winterschutz (s. §. 30), welcher hauptsächlich die Nässe möglichst abhält. Sobald es die Witterung im Frühjahre erlaubt, nehme man die Pflanzen aus der Erde heraus, beschneide sowohl Wurzeln als Spitzen und verpflanze sie auf andere 47 Centim. tief gelockerte, mäßig gedüngte Beete 30 Centim. weit auseinander. Darauf werden sie angegossen, wenn starker Sonnenschein sein sollte, für einige Tage beschattet und bei noch eintretendem Froste durch Ueberlegen von Fichtenzweigen dagegen geschützt. Um dem öfteren Austrocknen des Erdbodens, sowie dem Festwerden desselben durch das Gießen vorzubeugen, überzieht man ihn mit einer dünnen Schicht kurzen Mistes.

In milderen Gegenden kann diese Arbeit eben so gut schon im Herbste vorgenommen werden, in rauheren ist dies jedoch nicht rathsam, man müßte denn wegen nicht zu Gebote stehenden Platzes die Pflanzen in Töpfe pflanzen wollen, wo ihnen dann dieselbe Kultur, welche die Topfrosen erfordern, zu Theil werden muß.

71. Sowie die Sämlinge anfangen zu blühen und sich irgend einer als etwas Besonderes zeigt, wird er an einen Stab gebunden, mit einer Nummer versehen und seine Eigenschaften mit der Nummer zu Papier gebracht. Sind die Augen reif, so okulire man sie auf einen oder einige Wildlinge, um sie zu prüfen, indem man durch das Okuliren auf eine geeignete kräftige Unterlage ein oder zwei Jahre früher ein richtiges Urtheil gewinnen kann, als es durch die bloße Erwartung von dem Sämling möglich ist. Da es viel Zeit und Unterlagen erfordern würde, alle Sämlinge zu okuliren, so können diejenigen Samenpflanzen, deren Werth zweifelhaft ist, noch ein oder zwei Jahre gepflegt werden, worauf ihr wirklicher Werth sich herausstellen wird.

Jetzt beweist sich die Bezeichnung der verschiedenen Rosensorten bei der Aussaat als besonders nützlich und interessant, weil dadurch nicht nur die Abstammung, sondern auch zugleich die Hybridation bezeichnet werden kann.

72. Den Samen von den dauerhaften und den sogenannten wilden Rosen, welche als Unterlagen zur Veredlung dienen, säet man ebenfalls sogleich nach dem Einsammeln und Reinigen auf ein tief umgegrabenes und

gut (jedoch nicht mit frischem Dünger) gedüngtes 1,25 Meter breites Gartenbeet in 5 Centim. tiefe Furchen von 16centimetriger Entfernung. Den in diesen Furchen gestreuten Samen trete man mit der äußersten Kante des Fußes fest an und bringe die abgeräumte Erde wieder darüber, worauf man das Beet mit dem Rechen ordnungsmäßig ebnet. Je mehr Feuchtigkeit der Winter zuführt, desto früher vermürbt die Samenschale und desto sicherer gehen die Samen auf. Ein Bedecken der Beete mit Laub, Mist u. dergl. ist daher verwerflich, indem hierin nur die Mäuse Schutz vor dem Winter finden und unter den Rosenkernen gründlich aufräumen.

Kann die Aussaat erst im Frühjahre geschehen, so wird im Herbste der Same in einem Gefäße in feuchten Sand eingeschichtet, an einem warmen Orte aufbewahrt und zeitig im Frühjahre ausgesäet.*) In beiden Fällen gehen die Samen ausgangs April auf, und man verfährt mit den jungen Pflanzen eben so, wie in §. 70 angegeben ist, wenigstens erzielt man durch dieses Verpflanzen („Pickiren") in noch krautartigem Zustande ein viel freudigeres Wachsthum, als wenn man die Sämlinge ein ganzes Jahr im Saatbeete stehen läßt. Es erfordert allerdings etwas mehr Vorsicht, und man hat beim Pflanzen besonders darauf zu sehen, daß die jungen Pflanzen nicht längere Zeit der Luft und Sonne ausgesetzt sind, sondern man muß sie gleich nach dem Ausheben in ein Gefäß mit Wasser legen und nur immer wenige in die Hand nehmen.

Will man diese Wildlinge blos zum niedrigen Veredeln benutzen, so sind sie hierzu bis zum August meistens so stark geworden, daß man ihnen am Wurzelhals ein Edelauge einsetzen kann; am besten aber eignen sie sich, für die etwaige Veredlung im Winter. Meistens läßt man sie jedoch bis zum nächsten Frühjahre im Saatbeete stehen, nimmt sie dann heraus, und schneidet die Wurzeln ungefähr $\frac{1}{3}$ ihrer Länge zurück. Die so zubereiteten Sämlinge werden in 4 Reihen, in der Reihe auf 31 Centim. Entfernung, auf 1,25 Meter breite Beete gepflanzt, welche vorher tief umgegraben und ordentlich gedüngt sein müssen. Diese Arbeit kann jedoch auch schon, und zwar mit noch fast besserem Erfolge, im Herbste vorgenom-

*) Hat der Same Umstände halber, z. B. wenn man denselben anderwärts beziehen muß, nur kurze Zeit trocken gelegen, so geht er das nächste Frühjahr nicht auf, sondern erst im darauf folgenden; um daher für ein ganzes Jahr das Land zu ersparen, so läßt man ihn bis zum nächsten Herbste eingeschichtet zwischen Erde oder Sand in einem Gefäße stehen, hält ihn mäßig feucht und nimmt dann erst die Aussaat vor.

men werden; es ist dann aber nöthig, die Beete 5 bis 6 Centim. mit kurzem Mist zu überziehen, damit die kleinen Pflänzchen nicht vom Froste gehoben werden. Anfangs August kann man nun mit dem Okuliren beginnen und zwar auf den Wurzelhals dicht unter der Zweigkrone. Zum Verbinden benutzt man einen guten Bast, um das bei anderem Verbandmaterial, als Wolle, Baumwolle ꝛc., nöthige Lösen zu ersparen. Auf diese Weise veredelte Rosen entwickeln ein außerordentlich üppiges Wachsthum und eignen sich besonders zum Ziehen schöner Pyramiden.

73. Die Anzucht hochstämmiger Rosen aus Samen erfordert einen Zeitraum von 3 bis 4 Jahren. Die einjährigen Sämlinge werden im Herbste ausgenommen und die Wurzeln, wie oben angegeben, gekürzt. Danach pflanzt man sie in guten, gedüngten, tiefgelockerten Boden, in 80 Centim. von einander entfernten Reihen, in Abständen von je 31 Centim. Im ersten Jahre läßt man die Rosen ungestört wachsen, und kann zwischen den Reihen auch noch Pflanzen und Früchte ziehen, welche sich nicht sehr ausbreiten und auch nicht zu stark zehren, so z. B. Buchsbaum-Erbsen, Buschbohnen oder Frühkartoffeln. Im folgenden zeitigen Frühjahre schneidet man den oberirdischen Pflanzentheil bis unter den Wurzelkopf zurück. Dieses tiefe Zurückschneiden bezweckt das Ausbrechen von Adventivknospen am Wurzelhalse, und diese sind fähig, einen kräftigen, aufrechten, sich selbsttragenden Stamm zu erzeugen. Bilden sich, wie gewöhnlich, mehrere Triebe, so unterdrückt man sie bis auf den stärksten. Ist im folgenden Jahre der Stamm gut verholzt, so ist er zur Veredlung geeignet. Von solchen auf diese Weise gezogenen Stämmen darf man einen reichen, schönen Flor und eine üppige Belaubung erwarten.*)

*) Um den vielen an mich ergehenden Anfragen wegen derartiger hochstämmiger Rosenwildlinge, oder auf solche Unterlagen veredelter Rosen zu begegnen, erlaube ich mir hier sogleich zu bemerken, daß ich mich ebensowenig wie andere Rosenzüchter mit der Anzucht hochstämmiger Rosen aus Samen befassen kann, weil sie zu viel Zeit und Land erfordert, mithin zu kostspielig ist. Dagegen machen meine, den Wäldern, Hecken und Rainen entnommenen Wildlinge in meinem für Rosenkultur sehr geeigneten, lehmigen, tiefgelockerten Boden Wurzeln, welche denen aus Samen gezogenen kaum nachstehen.

Zweites Kapitel.

Die Vermehrung durch Ausläufer.

74. Die meisten Rosenarten besitzen die Neigung, aus dem Wurzelstocke Triebe zu machen. Dieselben pflegen bald nach ihrem Aufwachsen Wurzeln zu erzeugen, und dann bezeichnen wir sie mit dem Namen Ausläufer. In reichlichem Maße treten sie bei den Pimpinell-, den Kapuziner-, französischen, Damascener-, weißen (R. alba), und Centifolienrosen auf. Will man sich dieser Verjüngungsgebilde zur Vermehrung bedienen, so löst man sie im Herbste oder Frühjahre unterhalb der mit Wurzeln besetzten Stelle vom Mutterstocke los, um sie als selbstständige Pflanzen zu behandeln. Will man von einer Rosenart möglichst viele Ausläufer ziehen, so darf man nur den Stamm während der Ruheperiode 30 Centim. über dem Boden abschneiden.

Drittes Kapitel.

Die Vermehrung durch Wurzelschnittlinge.

75. Sie gelingt am besten bei denjenigen Rosen, in welchen die Neigung, Ausläufer zu erzeugen, am entschiedensten ausgesprochen ist. Dennoch findet sie nur wenig Anwendung, weil man bei dieser Methode genöthigt ist, die Pflanze theilweise oder ganz zu opfern; sie ist somit nur dann vortheilhaft, wenn man bei einer etwa nöthig gewordenen Umpflanzung alter, kräftiger Exemplare die Wurzeln zu schneiden Veranlassung hat. Die beste Zeit für diese Vermehrung ist das Frühjahr. Man schneidet dann die Wurzeln in 6 bis 9 Centim. lange Stücken und legt sie in Kästen, Töpfe oder auch in Mistbeete, im Nothfall auch in das freie Land, in etwas schräger Richtung dergestalt ein, daß sie am obern Ende 1½ Centim. hoch mit Erde bedeckt sind. Die an diesen Wurzelstücken sich entwickelnden Augen treiben schon im ersten Sommer schöne kräftige Ruthen und können dann als selbst-

ständige Pflanzen behandelt werden. Für manche Rosen, z. B. Moosrosen, ist diese Vermehrungsweise sehr vortheilhaft.

Viertes Kapitel.

Vermehrung durch Ableger.

76. Durch Ableger vermehrt man diejenigen Rosen, die sehr hartholzig sind und deshalb aus Stecklingen nicht leicht wachsen. In dieser Absicht muß man die Mutterpflanzen niedrig und buschig zu erziehen sich bemühen. Diese Art der Vermehrung ist namentlich für die Moosrosen zu empfehlen, deren Varietäten der Mehrzahl nach sparsame Ausläufer machen.

Die beste Zeit, diese Art der Vermehrung vorzunehmen, ist die der Monate Juli und August, sobald der erste Trieb reif geworden ist. Diese Operation ist sehr einfach und geht bei einiger Uebung schnell von Statten. Zunächst wird der Boden um den Mutterstock etwas gelockert und mit guter, mit einigem Wassersand gemengter Komposterde gemischt. Zum Ablegen selbst wählt man junge und kräftige Triebe von 47 bis 63 Centim. Länge, und dreht denjenigen Theil, welcher in die Erde zu liegen kommen soll, dergestalt, daß die Rinde reißt und dadurch eine Verwundung herbeigeführt wird; oder man schneidet mit einem scharfen Messer unter einem Auge schräg nach oben, bis auf das Mark, und fährt mit dem Messer mindestens 2½ Centim. aufwärts, damit eine nach unten gewendete Zunge entsteht, wie man sie bei dem Senken der Nelken bildet. Nun legt man den vorsichtig abwärts gebogenen Zweig mit seiner Wundstelle 5 Centim. tief in die gelockerte Erde und befestigt ihn mit einem hölzernen Haken. Die Spitze des abgesenkten Zweiges aber bindet man an einem dabei gesteckten Stäbchen auf, damit er nicht vom Winde bewegt und die Wurzelbildung durch eine dadurch herbeigeführte Erschütterung unterbrochen werde. Zur Beförderung der Wurzelbildung trägt öfteres Begießen und Auflockern des durch Regengüsse und Gießen fest gewordenen Erdreichs wesentlich bei. Um dem öfteren Trocken- und Festwerden der Erde etwas vorzubeugen, ist es ganz zweckmäßig, eine dünne Schicht Moos oder kurzen Mist darüber zu bringen. Unter nicht allzu ungünstigen Verhältnissen werden sich bis zum Herbste die Ableger so weit bewurzelt haben, daß sie unterhalb dieser neugebildeten Organe abgeschnitten und als selbstständige Pflanzen behandelt werden können.

Für diese Art Vermehruug sind neben der Moosrose auch die Centifolie, die R. alba, die Damascener-, die gallische und die meisten rankenden Rosen in erster Linie, in zweiter die Remontantenrosen, sowie die Bourbon- und Noisettehybriden geeignet.

77. Zuweilen wünscht man aber auch eine Rosensorte, welche man blos als veredelten Hochstamm besitzt, durch Ableger zu vermehren, oder einen Hochstamm in eine wurzelächte Rose zu verwandeln; z. B. wenn sie als Hochstamm nicht gut gedeihen will, oder der Unterstamm schadhaft geworden ist und man doch gern die Sorte erhalten möchte. In dieser Absicht biegt man den Stamm zur Erde, befestigt ihn vermittelst ein Paar starker Haken oder über das Kreuz gesteckter kurzer Pfähle, damit er nicht vom Wind bewegt werden kann, und verfährt dann mit den Zweigen, welche man zu Ablegern benutzen will, in derselben Weise, wie im vorigen §. angegeben. Nicht selten kommt es vor — besonders in gelinden Wintern —, daß zeitig im Herbste mit Erde bedeckte Zweige hochstämmiger Rosen im Frühjahre Wurzeln getrieben haben.

78. Handelt es sich bei einer Rosensorte darum, womöglich aus jedem Auge eine selbstständige, wurzelächte Pflanze zu erziehen, und kann man die später beschriebene Vermehrung durch Augenstecklinge Umstände halber (z. B. weil die Sorte auf diese Weise nicht gut wachsen will, oder man überhaupt keine Vorrichtungen dazu hat) nicht anwenden, so setzt man von ihr vermittelst Okulation (s. §. 89) längs der ganzen Seite eines Wildlings, welche beim Niederbiegen desselben zur Erde nach oben gekehrt ist, in etwa 12 bis 15 Centim. Entfernung Augen ein. Sowie diese angewachsen sind, wird der Stamm, nachdem der Boden in derselben Weise vorbereitet, wie in §. 76 angegeben worden ist, ebenfalls 4 bis 5 Centim. tief in die gelockerte Erde gebracht und vermittelst Haken befestigt. Die aus den eingesetzten Augen hervorwachsenden Triebe bilden an ihrem Entstehungspunkte Wurzeln, sowie auch meistens der Wildstamm selbst. Ist diese Wurzelbildung hinlänglich erfolgt, was sich auch annehmen läßt, wenn die Triebe anfangen sich kräftig zu entwickeln, so wird der ganze Stamm im darauf folgenden Herbste oder Frühjahre behutsam aus der Erde ausgegraben; die nun wurzelächt gewordenen Okulanden schneidet man ab und behandelt sie als selbstständige Pflanzen. Die neben den edlen Trieben häufig entstehenden wilden sind, sowie sie sich zeigen, am Grunde zu entfernen und dürfen mit ersteren nicht verwechselt werden, wie dies Unkundigen leicht passiren kann.

Fünftes Kapitel.

Vermehrung durch Stecklinge.

79. Am leichtesten lassen sich die weichholzigeren Rosenarten aus Stecklingen vermehren. Je härter und hartholziger eine Art, desto schwieriger das Gelingen. Die geeignetste Zeit zur Anzucht aus Stecklingen sind die Monate Juni bis September, und hat man die Rosen angetrieben, die Monate Februar bis Mai. Die Stecklinge von getriebenen Rosen bewurzeln sich leichter, als jene; doch ist hierzu ein Vermehrungshaus oder ein warmer Mistbeetkasten erforderlich, während die Sommerstecklinge in einem abgetragenen Mistbeetkasten erzogen werden können. Die Stecklinge werden stets von jungem, noch nicht ganz reif gewordenen Holze genommen. Die weicheren Rosen, wie Thee-, Bengal- und Lawrencerosen, verholzen weder so schnell, noch so stark, wie die remontirenden Hybriden und die einmal blühenden oder Sommerrosen, und bieten somit den Vortheil, daß man von ihnen auch älteres Holz zu Stecklingen verwenden kann. Je härter aber die Sorten sind, desto krautartiger müssen die Stecklinge sein, wenn sie anschlagen sollen. Ja, man muß sogar oft die Pflanzen erst antreiben und die geilgewachsenen 6 bis 8 Centim. langen Triebe zu Stecklingen benutzen. Bei dem Schneiden des Stecklings sehe man darauf, daß er 2 bis 3 gute Augen habe, und führe den Schnitt mit einem feinen, scharfen Messer knapp unter dem Auge und von der ihm entgegengesetzten Seite schräg nach unten. Die Blätter schneidet man in der Regel bis auf die untersten zwei Fiederblättchen weg, damit der Verbrauch an Nahrungsstoff beschränkt wird. Der Steckling selbst wird nicht tiefer als 1 bis 2 Centim. eingesetzt. Jedoch kann man auch mit gutem Erfolge Stecklinge im Winter — von Oktober bis Februar — von reifem, im Herbste abgeschnittenem Holze machen.

80. Zur frühzeitigen Stecklingszucht, zu welcher man angetriebene Pflanzen benutzt, muß im Vermehrungshause ein Beet mit gut ausgewaschenem Quarzsande zubereitet werden, indem es sich hauptsächlich darum handelt, alle zur Fäulniß beitragenden Stoffe fern zu halten. Auch kann man die Stecklinge einzeln in kleine mit feingesiebter sandiger Haideerde gefüllte Töpfe von 4 bis 5 Centim. Durchmesser bringen. Letztere Methode hat den Vortheil, daß man die Stecklinge 2 bis 3 Monate in den Töpfchen ungestört fortwachsen lassen und dann, ohne den gebildeten Wurzelballen zu

verletzen, in größere Töpfe, oder, nach allmählicher Gewöhnung an freie Luft, gegen Mitte Mai sie auf den bestimmten Standort pflanzen kann. Für Sommerstecklinge ist eine gute alte, feingesiebte Haideerde, zur Hälfte mit reinem Quarzsande gemischt, vorzuziehen. Hat man gute Rasenerde zur Hand, so kann man etwas von dieser beimengen; man wird dann die Stecklinge um so kräftiger sich entwickeln sehen.

Die so bereitete Bodenmischung wird im Stecklingsbeete des Vermehrungshauses oder in einem Mistbeete 7 Centim. hoch aufgeschichtet und mäßig fest gedrückt. Viele ziehen flache Näpfe oder Holzkästen vor, weil sie sich transportiren lassen. Ein Hauptaugenmerk hat man auf einen guten Wasserabzug zu richten, welchen man durch Topfscherben, Kohlen oder Moos herstellt. Ist ein solcher schon für vollbewurzelte Topfgewächse nothwendig, wieviel mehr für Pflanzentheile, welche erst den zarten Kallus und aus diesem die feinen Wurzeln bilden sollen. Sind die Stecklinge mit 3 bis 5 Centimeter Abstande gesteckt, so gießt man sie mittelst einer feinen Brause an und hält die Fenster während der ersten acht Tage ganz geschlossen. Hat man sie in Näpfe, Töpfe oder Holzkästen gesteckt und kann diese nicht unter Fenster bringen, so bedeckt man die Stecklinge mit Glasglocken oder Glastafeln, unter welchen sie sich bei hinlänglicher Feuchtigkeit und Wärme ebenso rasch bewurzeln, auch im Zimmer und zwischen Doppelfenstern. Stecklinge von härteren Rosen bedürfen noch länger geschlossener Luft. Bei hellem Himmel und trockner Luft werden sie täglich ein bis mehrere Mal gespritzt und, wenn die Temperatur unter den Fenstern über 28° R. steigt, beschattet. Bei trüber, feuchter Witterung wird das Spritzen verderblich. Nach 8 bis 14 Tagen ist die Bewurzelung eingeleitet; an der in der Erde befindlichen Schnittfläche bildet sich eine knorpelige Schwiele, in der Gärtnersprache Kallus genannt, welche innerhalb der nächsten 14 Tage an Ausdehnung zunimmt. Die vorschreitende Kallusbildung erkennt man leicht an dem kräftigeren Ansehen des in den ersten Tagen schlaffen Stecklings und daran, daß die daran belassenen Blättchen gelb und abgestoßen werden. Man muß dieselben beseitigen, so oft man deren gewahr wird, damit sie nicht Schimmel und Moder erzeugen und den Stecklingen selbst nachtheilig werden. Den Beginn der eigentlichen Wurzelbildung erkennt man aber daran, daß die Augen schwellen und endlich austreiben. Es ist dann Zeit, sie gesondert in kleine 5 Centim.-Töpfe zu pflanzen, wozu man jedoch die Erde nur ein wenig schwerer und etwas weniger sandig, als wie sie im Stecklingsbeete zu Sommerstecklingen war, benutzt. Ist man nicht mit diesen Erdarten versehen, so kann man statt der Haideerde auch Holz-

erde und statt der Rasenerde Maulwurfserde verwenden. Haben die Stecklinge Kallus gebildet, so ist ihnen etwas frische Luft zuträglich, besonders die Nachtluft, denn am Tage wirkt sie oft austrocknend; hierbei müssen Urtheil und Erfahrung entscheiden, ob gelüftet werden kann oder nicht. Je weiter die Entwicklung des Wachsthums vorschreitet, desto häufiger und reichlicher muß Luft zugeführt werden. Weichere Rosensorten bewurzeln sich unter sonst günstigen Umständen schon binnen drei Wochen. Je härter aber die Rosen, desto längere Zeit brauchen sie, um durch eigenes Wurzelvermögen selbstständig zu werden. Auf dem Warmbeete geht im Frühjahre die Bewurzelung rascher von Statten, als im Sommer, dagegen sind die Sommerstecklinge kräftiger. Nachdem die bewurzelten Stecklinge in Töpfe verpflanzt worden sind, so werden sie wieder 6 bis 8 Tage in geschlossener Luft gehalten, bis sie die Störung ihres Wachsthums überwunden haben, und dann werden sie ganz allmählich an Luft und Sonne gewöhnt.

Kommt man erst im August oder noch später dazu, Stecklinge zu machen, so ist es zweckmäßiger, dieselben in Töpfe, Schalen oder Holzkästchen zu stecken, darin den Winter hindurch bis Februar an einem trockenen, frostfreien Orte zu belassen, dann erst die in der Regel sehr reich bewurzelten Stecklinge einzeln in kleine Töpfe zu verpflanzen und bis zum völligen Anwachsen auf ein womöglich etwas erwärmtes Beet unter Fenster zu bringen, indem die erst im Spätsommer einzeln verpflanzten Stecklinge den Winter hindurch viel leichter zu Grunde gehen, als wenn man sie unverpflanzt stehen läßt.

81. Kommt es darauf an, in kurzer Zeit zu kräftigen Pflanzen zu kommen, welche schon im darauf folgenden Winter zum Antreiben benutzt werden sollen, so schlägt man folgendes Verfahren ein:

Anfangs August steckt man die in der geeigneten Entwickelungsstufe sich befindenden Stecklinge in den freien Grund eines leeren Mistbeetkastens in die im vorigen §. angegebene Bodenmischung und läßt ihnen auch dieselbe Behandlung zu Theil werden. Sobald dieselben bewurzelt sind, pflanzt man sie sogleich behutsam wieder in den freien Grund leerer Mistbeetkästen, in 23 bis 31 Centim. Entfernung, bespritzt und beschattet sie und hält sie in der ersten Zeit durch Fenster in geschlossener Luft. Um diese bewurzelten Stecklinge noch schneller zu einer recht kräftigen Entwickelung zu bringen, kann man die Kästen vorher erst vermittelst Pferdedünger anwärmen und erhält auf diese Weise bis zum Herbste 60 bis 90 Centim. hohe Pflanzen.

Sind die jungen Pflanzen ordentlich in Trieb, so werden die Fenster allmählich entfernt und die Rosen im Herbste ohne alle weitere Pflege gelassen,

außer daß die Kästen von Unkraut rein gehalten, der Boden gelockert und bei trockener Witterung Abends gegossen wird. Im November werden die kräftigen Pflanzen auf 4 bis 6 Augen zurückgeschnitten und in möglichst kleine Töpfe gepflanzt. Im Januar kann man dann die meist schon frische Wurzeln treibenden Pflanzen anfangen zu treiben. (S. im vierten Abschnitt.) Hierzu benutzt man hauptsächlich rem. Général Jacqueminot, Empereur Napoléon, Empereur du Maroc, Ornament des jardins und vor allem Bourbon Louise Odier.

82. In der oben angegebenen Weise lassen sich auch die Wildlinge zu den Frühjahrsveredelungen heranziehen, indem man die noch krautartigen Stecklinge von Rosa canina steckt. Sobald im Herbste der Saft ruht und die ersten Fröste sich einstellen, werden sie ebenfalls in Töpfe gepflanzt. Nach dem Angießen schlägt man sie reihenweise in schräger Stellung so ein, daß der Stamm etwa 63 Centim. seiner Länge nach mit Erde bedeckt ist. Der noch herausschende Theil wird mit Laub oder Tannenreisig bedeckt, um das Austrocknen der Stämme durch die Luft zu verhüten.

Tritt stärkere Kälte ein, so bedeckt man sie noch stärker mit Laub, damit der Frost nicht durchdringen kann, um sie dann von Mitte December an, um welche Zeit sie schon anfangen neue Wurzeln zu treiben, zu jeder Zeit herausnehmen und zum Antreiben ins Warme setzen zu können. Hier kann man sie in 3 bis 4 Reihen übereinander stellen, etwa an die hintere Wand des Treibhauses und sucht sie durch Bedecken der Töpfe mit Moos und öfteres Spritzen gleichmäßig feucht zu halten. Vierzehn Tage nach dem Einbringen der Wildlinge fangen bei denselben gewöhnlich die Knospen an zu schwellen und nun kann sofort die Veredelung beginnen. (S. folgendes Kapitel.)

83. Rosenfreunden, welchen derartige Vorrichtungen, wie sie oben beschrieben, nicht zu Gebote stehen, ist zu empfehlen, mit den Stecklingen so zu verfahren, wie es bei den Oleandersteckligen gebräuchlich ist. Man fülle kleine Glasflaschen (Eau de Cologne- oder größere Medicingläser) mit Wasser und setze den Steckling so ein, daß zwei Augen unter Wasser stehen, die übrigen aber frei bleiben. An einem anfangs mehr schattigen, später sonnigen Standort hinterm Fenster bewurzeln sich derartige Stecklinge in kurzer Zeit.

84. Ein sehr zweckmäßiges Verfahren, welches ebenfalls keiner besonderen Vorrichtungen bedarf, ist auch folgendes:

Im Juni oder Juli schneidet man von vollständig ausgereiften Trieben die Spitzen mit 2—4 Augen ab und entfernt nur das dem untersten Auge entsprechende Blatt. Diese Stecklinge werden in eine flache Samenschüssel ohne Abzugsloch, zur Hälfte mit groben Torfbrocken oder einem andern

Abzugsmaterial, darüber mit Haide- oder Lauberde in der gewöhnlichen Weise angefüllt. Nachdem die Stecklinge ziemlich dicht gesteckt sind, wird die Schüssel bis zum Rande mit Wasser gefüllt und an der Südseite eines Gebäudes auf ebene Erde gestellt, so daß sie der vollen Sonne ausgesetzt ist. Je mehr das Wasser erwärmt wird, desto rascher treiben die Stecklinge Wurzeln. Selbstverständlich muß das verdunstete Wasser von Zeit zu Zeit ersetzt werden. Bemerkenswerth ist, daß die Bewurzelung hierbei nicht durch Kallusbildung an der Schnittfläche stattfindet, sondern die Wurzelspitzen durchbrechen seitwärts die Rinde, häufig ganz ohne Kallusbildung. Sobald die Stecklinge bewurzelt sind, müssen sie bald in Töpfe gepflanzt werden und können dann fast ganz ohne geschlossene Luft an einer gegen grelle Sonne geschützten Stelle aufgestellt werden.

85. Bei Anzucht der Stecklingspflanzen von reifem Holze während des Winters verfährt man auf folgende Weise:

Bei Gelegenheit des Beschneidens der Rosen im Herbste, vor Aufbringung des Winterschutzes, sammelt man das abgeschnittene Holz, bindet jede Sorte, mit Nummer oder Namen versehen, für sich allein zusammen und schlägt diese Bündel einstweilen in einem leeren Mistbeetkasten oder im Keller in Erde, Sand oder Kohlenasche ein, bis man dazu kommt, Stecklinge zu schneiden. Damit die Reiser, welche ohnedies zum größten Theile mit Blättern noch versehen sind, nicht mittlerweile welk werden, so ist es nöthig, sie öfter einmal zu überbrausen und in möglichst geschlossener Luft zu halten.

Diese Stecklinge kann man, wenn viel Vorrath an Holz vorhanden, um gleich möglichst starke Pflanzen zu bekommen, bis zu 18 Centim. Länge schneiden, und sie dann, je nachdem es die Anzahl der Stecklinge von einer Sorte erfordert, ziemlich dicht — 3 Centim. von einander — in kleinere oder größere, mit starker Abzugsunterlage versehene Töpfe stecken, die mit der in §. 80 bei den Sommerstecklingen angegebenen Erdmischung gefüllt sind. Nachdem man sie überbraust hat, bringt man sie unter die Fenster eines kalten, aber gegen Eindringen des Frostes zu schützenden Mistbeetkastens. Verbieten es nicht Frost und Schnee, so sind Bretter und Strohdecken von den Fenstern bei Tage abzunehmen; auch müssen die Stecklinge bei gelindem klaren Wetter einmal des Tages um die Mittagszeit fein überbraust werden, so daß die Erde sich möglichst gleichmäßig gelind feucht erhält.

In diesem kalten Kasten läßt man die Stecklinge so lange, bis sie Kallus gebildet haben, bringt sie dann — etwa anfangs März oder auch

später — nachdem die Töpfe von etwa gewachsenem Unkraute, abgestorbenen Stecklingen ꝛc. befreit worden sind, auf einen mit Pferdedünger oder mit einem anderen fermentirenden Material mäßig erwärmten Kasten, unter geschlossene Luft, versenkt die Töpfe bis zum obern Rande in die aufgebrachte Kohlenasche, Sägespäne oder Lohe, hält sie bei klarem Wetter durch täglich 2- bis 3maliges feines Ueberbrausen feucht und beschattet sie bei starkem Sonnenschein. Nach wenigen Wochen werden mit geringen Ausnahmen die Stecklinge Wurzeln gebildet haben. Hierauf kann man zur Einzelverpflanzung schreiten; es schadet aber auch nichts, wenn man bei Mangel an Zeit und Platz sie noch einige Zeit unverpflanzt, selbstverständlich luftig gehalten, und wenn die Witterung mild ist, ganz von den Fenstern befreit stehen läßt. Im Uebrigen verfährt man nach ihrer Verpflanzung, wie in §. 80 angegeben ist.

Sechstes Kapitel.

Vermehrung durch Augenstecklinge.

86. Eben so leicht, wie die Rebe, läßt sich die Rose aus Augenstecklingen vermehren. Man wählt einen kräftigen Trieb, am besten kurz vor der Zeit, wenn das Leben zu erwachen beginnt, und schneidet ihn mit einem scharfen Messer in so viele Stücke, als gut entwickelte Augen sich daran befinden, und sieht darauf, daß das Auge in der Mitte steht. Auf der dem Auge entgegengesetzten Seite schneidet man etwas weniger als die Hälfte des Holzes der Länge nach weg. Beim Einlegen dieser Stecklinge ist es nothwendig, auf die Herstellung des Wasserabzuges besondere Sorgfalt zu verwenden (s. §. 79). Auf diese Unterlage bringt man dann dieselbe Erdmischung, wie sie zu dem Gebrauche für die Sommerstecklinge angegeben ist, und drückt sie glatt und mäßig fest. Dann legt man die Augenstecklinge dergestalt mit der Schnittfläche auf, daß das untere Ende etwas tiefer zu stehen kommt, als das obere. Ueber die Augen bringt man 1 Centim. hoch recht reingewaschenen Flußsand, gießt die Oberfläche mit einer feinen Brause an, sorgt für eine Bodenwärme von 12 bis 14° R. und bedeckt die Erde dünn mit Moos, um sie gegen das Austrocknen zu sichern, damit das

Gießen nicht so oft wiederholt werden muß. Wenn die jungen Triebe den Sand durchbrechen, wird das Moos entfernt. Nach weiteren drei Wochen pflegen die jungen Pflanzen so weit zu sein, daß sie in Töpfe gepflanzt werden können. Um Uebrigen verfährt man dann, wie in §. 80 angegeben ist.

Siebentes Kapitel.

Vermehrung durch Veredlung.

87. Die Vermehrung der Rosen durch Veredlung ist in Hinsicht der Pflanzenform und Leistungsfähigkeit als die vorzüglichste anzusehen. Sind die Formen der Veredlung auch sehr verschiedener Art, so gleichen sie sich doch alle darin, daß ein Auge, oder ein mit mehreren Augen besetzter Zweig einer edlen Rose auf einen andern Stamm übergepflanzt wird. Beide Theile behalten ihre Eigenthümlichkeiten. Die Pflanze, auf welche das Edelauge — das Edelreis — übertragen wird, nennt man den Grundstamm, gemeiniglich aber die Unterlage oder den Wildling.

Wie schon erwähnt, ist die bei uns wildwachsende Hundsrose (R. canina) die beste aller Unterlagen und kann durch keine andere noch so warm empfohlene Art ersetzt werden. In England und Frankreich benutzt man hierzu sehr häufig die Manetti-Rose, welche aus Stecklingen erzogen wird. Diese ist aber für unser rauheres Klima weniger zu empfehlen, da sie etwas empfindlicher als die Hundsrose ist. Außerdem ist sie zum Austreiben von Ausläufern, welche besonders bei niedrigen Veredlungen vom Nichtkenner oftmals von der aufgesetzten Sorte kaum zu unterscheiden ist, noch mehr als jene geneigt. Den Vorzug hat sie, daß sie wegen ihrer sehr früh eintretenden Vegetation eine vortheilhafte Verwendung zulässig macht. Marktgärtner, welche sich mit Rosentreiberei und mit Verkauf blühender Rosen beschäftigen, haben in der Manetti eine sehr schätzbare Unterlage. Veredelt man sie im Winter in Töpfen unter Anwendung kräftiger, mit 3 bis 4 Augen ausgestatteter Edelreiser, so entwickeln sie sich bald ungemein kräftig, blühen bald und reichlich und lassen sich rasch in Geld umsetzen.

In Holland besonders wird häufig die Zimmetrose, auch Pfingstrose (R. cinnamomea) genannt, hochstämmig zu Unterlagen erzogen. Aber auch sie erweist sich bei uns als unbrauchbar, da die Sprödigkeit ihres Holzes das in unsern Wintern nothwendige Umbiegen des Stammes nicht gestattet, und sie überdies höhere Kältegrade nicht aushält. Ueberhaupt ist sie mit keiner langen Lebensdauer ausgestattet, da sich die Säfte im Wurzelsysteme zur Bildung neuer Triebe, welche den alten Stamm wieder ersetzen sollen, koncentriren. Es kann daher, auch selbst bei der besten Behandlung ein auf der Zimmetrose aufgesetztes Edelreis oder Auge kein langes Leben haben, sondern muß bald früher, bald später (in 2 bis 4 Jahren) an Mangel von Saftzufluß eingehen.

Dagegen ist die Centifolienrose (R. centifolia) als Unterlage in vielen Fällen nicht genug zu empfehlen und zur Topfkultur unübertrefflich. Sie ist frosthart, besitzt ein gutes Wurzelvermögen und nimmt alle Arten von Rosen gut an. Der Wuchs der Veredelung ist zwar meistens nicht so üppig, wie auf der Hundsrose, desto vollkommener sind aber die Blumen, besonders bei Thee- und Bengalrosen, so daß sie oft kaum wieder zu erkennen sind. Pompon- und Lawrencerosen, auf sie veredelt, sind von Blumen überdeckt. Stark wachsende Hybriden von Moosrosen blühen bald und reichlich, und Kletterrosen im Topfe schon im zweiten Jahre nach der Veredlung, während sie, auf Hundsrosen veredelt, oft erst nach 6, 8 Jahren, nachdem sie sich ausgetobt haben, zur Blüthe kommen. Desgleichen die Banksrose, welche sowohl wurzelächt, als auf die Hundsrose veredelt im Topfe entweder nie, oder selten zur Blüthe kommt. Die Centifolie mäßigt den unbändigen Wuchs der meisten Rosensorten, das Holz reift auf ihr besser aus und bildet baldigst Blüthenknospen. Zu schwachwüchsigen Sorten eignet sich die Centifolie ebenfalls besser als die Hundsrose, indem jene auf letztere veredelt durch den stärkeren Saftzufluß häufig im Safte ersticken.

Ferner läßt sich die Alpenrose (R. alpina) und die Weinrose (R. rubiginosa) als Unterlage verwenden; auf ersterer gedeihen z. B. Bengal- und Theerosen, auf letzterer die Moosrosen und die gelbe persische Rose (Persian yellow) sehr gut.

88. Die Hundsrose, welche häufig in Wäldern und Hecken von ganz Europa vorkommt, ist eine dauerhafte, schön wachsende, kräftig treibende und in fast allen Bodenarten gedeihende Unterlage, auf welcher alle edlen Rosensorten annehmen. Doch sind aus Samen erzogene Pflanzen (s. §. 72 und 73) Ausläufern vorzuziehen. Hat man die ersteren nicht und muß die letzteren benutzen, so hebt man diese im Herbste mit größter Schonung ihrer

Wurzeln aus der Erde und sucht sich die schönsten, gerade gewachsenen, womöglich zweijährigen Schossen, bei denen das Holz nicht mehr so markig ist, heraus. Vor dem Pflanzen auf ein dazu bereitetes Beet werden die starken Wurzeln verhältnißmäßig eingestutzt und der Stamm ebenfalls nach seiner Größe oder Stärke gekürzt. Die Reihen, auf welche man sie bei 31 Centim. Entfernung pflanzt, müssen 80 Centim. Abstand haben, damit man genug Raum zu den nöthigen Verrichtungen hat. Oder man pflanzt immer je zwei Reihen näher — 47 Centim. weit — an einander und läßt dann einen etwas breiteren — 90 Centim. — Zwischenraum. Herrscht beim Pflanzen trockne und noch warme Witterung, so gieße man sie an, im entgegengesetzten Falle unterlasse man es. Darauf legt man sie in der Richtung der Pflanzenreihen nieder, bindet sie mit Weidenruthen zusammen und bedeckt sie 8 bis 10 Centim. hoch mit Erde aus den Zwischenräumen der Reihen.

Noch einfacher ist es, die Rosen sogleich in etwas schräger Richtung zu pflanzen, indem sie sich dann leichter niederbiegen lassen. Hierauf hält sie ein Mann, eine nach der andern, langsam vorausschreitend, zu Boden, während ein anderer dieselben mit Erde bedeckt, was ein vorheriges Zusammenmenbinden mit Weidenruthen überflüssig macht.

Unterläßt man das Bedecken mit Erde, so geht in der Regel, theils durch starken Frost, aber noch bei weitem mehr durch die im Frühjahre vorherrschenden austrocknenden Ostwinde ein großer Theil zu Grunde. Mitte Mai oder noch später, je nachdem die Entwickelung vorgeschritten, oder es die Witterung erlaubt, entfernt man an einem trüben, regnerischen Tage mit möglichster Schonung der jetzt schon durch die Erde durchkommenden Triebe die Erddecke, wobei zugleich auch die Bodenfläche wieder geebnet wird. Besonders anzurathen ist vorstehendes Verfahren, wenn diese Rosen in ihrer Wildniß an geschützten Orten gestanden haben. Bei anhaltend trockner Witterung ist es nöthig, die Rosen öfters durchdringend zu gießen. Bis zur Zeit der Veredelung entfernt man sämmtliche aus dem Stamme sowie aus den Wurzeln hervorkommenden Triebe bis auf diejenigen, welche oben die Krone bilden, damit der Saft bis oben hin, wo die Edelaugen eingesetzt werden sollen, steigt. Unterläßt man hingegen das Entfernen der meist längs des ganzen Stammes hervorkommenden Triebe, so kommt es sehr häufig vor, daß sich dann die Rinde blos bis zu einer gewissen Höhe löst, dagegen oben, wo man die Augen gern einsetzen möchte, nicht. Dagegen nach der Veredlung läßt man alles, ausgenommen bis auf die zuweilen sehr stark hervortreibenden Wurzelausläufer, wachsen und entfernt erst bei eintretendem

Froste, bevor die Rosen zum Bedecken niedergelegt werden sollen, alles Ueberflüssige. Geschieht es früher, so gehen die Augen häufig durch zu starken Saftzufluß zu Grunde oder sie werden noch vor Winter zum Austreiben gereizt, was dann in der Regel seine nachtheiligen Folgen hat.

Reich bewurzelte Unterlagen, welche den aus Samen gezogenen an Kraft nicht viel nachstehen, kann man sich auch auf folgende Weise erziehen: Untaugliche, kraftlose Wildlinge legt man im Herbste horizontal in die Erde, quer auf ein gut zubereitetes Beet, ungefähr in einem Abstande von 14 Centim., überdeckt sie 5 Centim. hoch und bringt noch eine dünne Schicht verrotteten Mist oder Moos darüber, um die Erde möglichst gleichmäßig feucht zu erhalten. Im nächsten Frühjahre werden alle Augen austreiben und sich unter ihnen Wurzeln bilden. Im Herbste gräbt man mit sorgfältigster Schonung der längs dem ganzen Stamme sich gebildet habenden Wurzeln die Rosen wieder aus, theilt sie in so viele Stücke als Triebe entstanden sind, pflanzt sie dann wieder als selbstständige Pflanzen und behandelt sie im Uebrigen ganz wie die Sämlinge, wenn man sie zu Hochstämmen erziehen will (s. §. 73).

Auch kann man sich von der Hundsrose Unterlagen durch Sommerstecklinge erziehen, wie in §. 82 angegeben ist. Bis zur Erlangung von Hochstämmen sind allerdings auch 3 bis 4 Jahre erforderlich, und der einzige aber auch wesentliche Vortheil in beiden letztgenannten Erziehungsmethoden liegt blos darin, daß man reich bewurzelte und mithin dauerhaftere Unterlagen erhält, als es bei den oft schlecht bewurzelten, aus Wäldern und Hecken entnommenen und oft Tage lang mit entblößten Wurzeln von Händlern herumgetragenen Wildlingen der Fall ist.

89. Durch die Ueberpflanzung einer edeln Rose auf einen Grundstamm gewinnt man folgende Vortheile: 1) man kommt schneller als auf einem andern Wege in den Besitz einer vollkommen entwickelten Pflanze; 2) man macht durch die robustere Unterlage die zarteren Edelrosen geschickt, in allerlei Boden und Klima zu wachsen; 3) man hat es in der Gewalt, die verschiedenen Stammformen zu bestimmen; 4) man sorgt durch den kräftiger arbeitenden Unterstamm für eine kräftigere Entwickelung des zarteren Edelholzes und somit 5) der Blumen nach Größe, Füllung und Menge.

Alle diese Vortheile jedoch können nur dann erreicht werden, wenn die Unterlage gesund und reich an Wurzeln ist. Eine schwächliche und schlecht bewurzelte Unterlage wird auch das Edelholz in Mitleidenschaft ziehen.

90. Am häufigsten wird die Veredlung durch Okulation bewirkt. Die günstigste Zeit zur Ausführung dieser Operation ist der Mai und Juni

auf das treibende Auge und von Juli bis Mitte September auf das schlafende Auge. Letzteres ist vorzuziehen, denn sehr häufig kommt es vor, daß bei der Okulation auf das treibende Auge der junge Trieb in ungünstigen Sommern nicht hinlänglich ausreift und zu Grunde geht, im Falle man die Okulanden nicht aus dem Boden herausnimmt und an einem frostfreien Orte einschlägt. Außerdem fordert aber auch wenigstens bei vollsaftigen Sämlingen das Okuliren aufs treibende Auge manches Opfer an Unterlage und Edelholz. Um die eingesetzten Augen zum Austreiben zu bringen, ist man genöthigt, nach dem gelungenen Anwachsen derselben die wilden Triebe wegzuschneiden. Der Rosensämling ist aber in dieser Zeit ungemein vollsaftig und in so raschem Wachsthume begriffen, daß durch jene Operation ein plötzlicher Rückschlag und das Absterben vieler Pflanzen herbeigeführt wird. Sollte aber auch durch die Okulation auf das treibende Auge die Unterlage selbst keinen Schaden leiden, so wird doch durch die bedeutende Saftfülle des Sämlings das Edelauge öfters erstickt. Beim Okuliren auf das schlafende Auge ist der Erfolg ungleich mehr gesichert.

Zur Okulation wählt man hinlänglich gereifte und verholzte junge Zweige, an welchen die Augen kräftig entwickelt sind; doch dürfen sich dieselben noch nicht gestreckt haben. Die Augen des mittleren Theiles eines Zweiges erzeugen gesunde und kräftige Kronen von schöner Reichblüthigkeit; dagegen die unteren Augen eines Triebes schwächliche und weniger reichblühende Kronen. Die Augen in der Spitze geben Kronen von mäßiger Kraft, aber von sehr reichem Flor. Bevor man die Augen aus dem Okulirreis ausschneidet, werden die oben gelassenen Zweige des Wildlings etwas gestutzt und auf der oberen Seite der Zweige, welche die Augen aufnehmen sollen, ganz in der Nähe des Stammes mit dem Messer die Stacheln, soviel als zur Aufnahme des einzusetzenden Auges nöthig ist, entfernt. Oder man setzt auch die Augen in den Hauptstamm, sofern sich die Rinde gut löst, ein, was oft, besonders in Lagen, welche dem Winde sehr ausgesetzt sind, vorzuziehen ist, indem hier die hervorkommenden Edeltriebe sogleich an den über denselben noch befindlichen Stumpfen angebunden werden können. Darauf setzt man das Okulirmesser ½ bis 1 Centim. unter dem auszuschneidenden Edelauge an und schneidet dasselbe mit einem recht glatten und ebenen Schnitte aus, der bis auf dieselbe Entfernung über dem Auge geführt wird (Fig. 13 a). Dieser mit einer ganz dünnen Schicht Holz herausgeschnittene Rindentheil heißt das Schildchen (Fig. 13 b). (Bei Rosen ist es vorzuziehen, mit Holz zu veredeln.) Vom Blatte läßt man nur den 2 bis 3 Centim. langen Blattstiel stehen. An derjenigen Stelle des Wildlings, wo man das Schildchen

Fig. 14. Fig. 15.

Fig. 13a.

Fig. 13b.



einsetzen will, macht man in die Rinde einen bis auf den Splint reichenden Querschnitt und zieht von der Mitte desselben im rechten Winkel, der Länge des einzusetzenden Auges entsprechend, einen Längenschnitt nach unten, wodurch es die Gestalt eines T erhält (Fig. 14). Eben so gut kann man diesen Schnitt auch umgekehrt machen. Darauf hebt man beiderseits vermittelst des Rückens der Messerspitze*) oder des Falzbeinchens am Okulirmesser die Rinde vom Holze ab und schiebt mit der linken Hand das Schildchen so ein, daß sein unterer Rand an den unteren Rand der Rinde stößt und das Auge sich gerade in der Mitte des Längsschnittes befindet, worauf die Rindenflügel sanft angedrückt und mit gutem bandähnlichen Baste oder mit nicht zu fest gedrehten Wollenfäden überbunden werden und zwar so, daß das Auge frei bleibt (Fig. 15). Das Band legt man so, daß es zwei gleiche Theile bildet, die zuerst den Querschnitt decken und sich dann hinter denselben und dann eben so vorn unter dem Auge kreuzen, damit das Schild recht fest auf das Holz zu liegen komme, und endet den Verband durch Zusammenknüpfen beider Enden nach der Art einer Schleife auf der hintern Seite. Das Okuliren geht nur dann schnell und sicher von Statten, wenn die Unterlage vollsaftig ist. Löst sich die Rinde nicht glatt ab, so wähle man eine andere besser dazu geschickte Pflanze, oder verschiebe, wenn wegen kühler Witterung

*) Das von Kunde u. Sohn in Dresden konstruirte neue Okulirmesser mit Rindenlöser am Rücken der Klinge statt unten am Hefte, ist letzterem bei weitem vorzuziehen. Dasselbe ist zum Preise von 15 Sgr. auch bei mir zu haben.

oder längerer Trockenheit der Saftstrom nicht lebhaft genug sein sollte, die Arbeit auf eine spätere Zeit. Bei heißer Witterung sind die Morgen- und Abendstunden zu dieser Arbeit am besten geeignet und die Edelreiser müssen, um sie in ihrer ursprünglichen Frische zu erhalten, in einem Gefäße mit reinem Wasser gehalten werden.

Nach 2 bis 3 Wochen läßt sich schon erkennen, ob das Auge angewachsen ist, was man nicht nur an dem abgedorrten Blattstiele, sondern auch an dem gesunden Zustande des Auges und dessen Anschwellen wahrnehmen kann. Findet man das Auge völlig angewachsen, so wird der Verband zuerst etwas gelüftet, nach einigen Tagen aber ganz weggenommen. Sollte der Verband bei einem Auge, welches noch im Anwachsen begriffen ist, in die Rinde einzuschneiden drohen, so muß er ebenfalls entfernt, aber ein anderer wieder locker darum gelegt werden.

Die auf das schlafende Auge okulirten hochstämmigen Wildlinge werden beim Aufhören der Vegetation im Herbste bis auf 10 Centim. über dem eingesetzten Auge zurückgeschnitten und zum Schutze gegen Frost niedergebogen und mit Erde bedeckt. Die der Erde gleich veredelten werden ebenfalls zurückgeschnitten und 10 bis 15 Centim. hoch mit Erde angehäufelt. Will man die Okulanden nicht stehen lassen, so kann man sie, wenn man vor Mäusen sicher ist, eben so gut in einer Grube oder in einem tiefen Mistbeetkasten eingeschlagen überwintern und im Frühjahre an die Stelle pflanzen, auf der sie verbleiben sollen. Wo man die Stämme nicht zu decken braucht, ist es besser, auch das Zurückschneiden bis zum Frühjahre zu lassen, und dann geschieht es ein Auge über der Veredlung (s. Fig. 4 A, S. 23); der aus diesem Auge sich entwickelnde Trieb (Fig. 5 F) dient dann als Saftleiter.

Sobald die eingesetzten Augen 26 bis 31 Centim. lang ausgetrieben haben, wird der Wildling dicht über dem edlen Auge weggeschnitten (Figur 6 H); zugleich hat man auch, wenn auf zwei Seitenäste veredelt worden ist, den noch vorhandenen Zapfen B, Fig. 4, wegzuschneiden und die Schnittflächen mit Baumwachs zu verstreichen. Hierauf tritt das Verfahren ein, wie es in §. 21 angegeben ist.

Alle unterhalb der Veredlungsstelle am Wildlinge hervorkommenden Triebe müssen sofort entfernt (s. Fig. 4 C) und der Boden öfter gelockert und von Unkraut rein gehalten werden.

91. Anstatt eines bloßen Auges läßt sich in den T-Schnitt am Wildlinge ebenso gut ein Reis, welches ganz wie zum Pfropfen in die Rinde (jedoch ohne Sattelschnitt), zum Kopuliren oder Anschäften (s. §. 101, 102, 103) zugeschnitten ist, einschieben. Das Reis schneidet man auf 2, 3 oder

wenn sie sehr eng stehen, auch auf 4 Augen. Bei den unteren Augen läßt man ebenfalls nur den Blattstiel stehen, während man bei dem obersten auch die Blättchen daran läßt. Nachdem das Reis vorsichtig, ohne daß sich die Spitze, welche überhaupt nicht zu dünn geschnitten werden darf, umgebogen hat, eingeschoben worden ist, wird der Verband in derselben Weise, wie beim gewöhnlichen Okuliren darum gelegt.

Diese Veredlungsmethode hat den Namen „Einschieben", ist aber im Ganzen wenig gebräuchlich, und ihr Erfolg ist auch nur dann sicher, wenn der auf diese Weise hochstämmig veredelte Wildling zur Erde gebogen, mit einem Haken befestigt und die Veredlungsstelle 3 Centim. hoch mit Erde bedeckt wird, wobei jedoch der obere Theil des Reises unbedeckt bleiben muß. Die Erde feuchtet man an, deckt dann einen Stein darüber, damit sie sich möglichst gleichmäßig feucht erhält, und wenn die Witterung sehr trocken ist, wiederholt man auch das Anfeuchten nach einigen Tagen noch einmal. Nach 10 bis 14 Tagen wird das Reis angewachsen sein. Man bringt nun den Wildling wieder in seine senkrechte Stellung, wozu man am besten einen trüben, feuchten Tag wählt, indem das Reis durch den plötzlichen Uebergang aus der feuchten Erde in die trockne Luft leicht wieder zurückgehen kann. Tritt sogleich heiße trockne Witterung wieder ein, so muß man aus Vorsorge die Veredlungsstelle mit etwas feuchtem Moose umgeben. — Selbst bei dem gewöhnlichen Okuliren, wenn es in heiße trockne Witterung fällt, ist das Umgeben der Veredlungsstelle mit etwas feuchtem Moose zu empfehlen, dieses muß aber, sobald man das Auge angewachsen glaubt, bei trübem Wetter entfernt werden. — Das Edelreis schützt man durch sorgfältiges Anbinden gegen das Abbrechen und verfährt im Uebrigen, wie im vorhergehenden §. bereits angegeben wurde.

92. Die Okulation nach der sogenannten Forkert'schen Methode zeichnet sich dadurch aus, daß sie sich fast das ganze Jahr (im Winter natürlich nur, wenn man gut angewurzelte Wildlinge in Töpfen hat), vornehmen läßt. Bei im Freien stehenden Wildlingen ist es allerdings am zweckmäßigsten, es im März, April und Mai, damit der Trieb bis Winter vollständig ausreift, vorzunehmen, wobei man eben so weit kommt, als wenn man im vorhergehenden August oder September auf das schlafende Auge okulirt hat. Zu dieser Frühlingsveredlung müssen die Edelreiser im Herbste geschnitten und den Winter über im Keller oder in die Erde vergraben aufbewahrt werden. Es gehören hierzu ebenfalls gut ausgebildete, noch schlafende Augen. Beim Ausschneiden eines solchen Auges macht man erst 1½ Centim. unter dem Auge einen Querschnitt, setzt dann das

Fig. 16b. Fig. 17.



Fig. 16a.

Messer 1½ bis 2 Centim. über dem Auge an und schneidet das Schild mit etwas Holz heraus; am unteren Ende wird es etwas zugespitzt (Fig. 16a), so daß es, wie Fig. 16b zeigt, in einem entsprechenden Einschnitt am Wildlinge gut eingefügt werden kann; darauf lege man einen Verband von Wollfäden oder Bast darum. Wird diese Veredlungsmethode bei im Freien stehenden Wildlingen vorgenommen, so ist es nöthig, daß die Wundränder mit Baumwachs gut verstrichen werden, jedoch mit der Vorsicht, daß davon Nichts zwischen die beiden Stücke selbst eindringe, auch dürfen die Augen nicht damit bedeckt werden*).

Die zweckmäßigste Stelle, wo man das Auge einsetzen muß, ist immer da, wo ein wildes Auge sitzt oder die Rinde nur sonst glatt ist. Ueber dem eingesetzten edlen Auge läßt man noch 3 bis 4 wilde Auge stehen; die daraus entspringenden Triebe bricht man von Zeit zu Zeit ab, um dem edlen Auge allmählich den Saft zuzuführen. Dieser Zapfen über der Veredlung dient dazu, den Saft über dem Auge mehr rege zu erhalten und giebt auch dem jungen Triebe aus dem edlen

*) Man hat warmflüssiges und kaltflüssiges Baumwachs. Ersteres besteht aus Harz, Wachs und Terpentin, welche Stoffe zusammen geschmolzen werden; gewöhnlich nimmt man 2 Theile Wachs, 1 Theil Harz und 1 Theil Terpentin, doch oft auch der größern Wohlfeilheit wegen 2 Theile Harz, 1 Theil Wachs und 1 Theil Terpentin, wozu dann noch etwas (zu 1 Pfund 16 Grm.) Unschlitt und Schweinefett gefügt wird, damit das Baumwachs leichter schmelzbar wird. Dieses Baumwachs wird durch Erwärmung flüssig gemacht, wozu eine kleine transportable Lampe, über welcher eine kleine Blechpfanne befindlich, dient. Sehr wesentlich ist, daß dasselbe nicht heiß auf die Wunden aufgetragen werde, indem dadurch die Zellen vertrocknen und die Verheilung sehr erschwert wird.

Ein anderes weit wohlfeileres und sehr praktisches Baumwachs ist das kaltflüssige, nach der Lucas'schen Methode bereitete. Es besteht aus gewöhnlichem Fichten- oder Tannenharze und Weingeist. Man macht ½ Pfund Harz langsam über Kohlen flüssig und mischt dann 50 Grm. Weingeist dazu. Diese Mischung

Auge eine Stütze, an die er angebunden wird. Wenn dieser 26 bis 31 Centimeter lang ist und anfängt zu verholzen, so wird dieser Zapfen ebenfalls dicht über dem Edelauge weggeschnitten und die Schnittfläche mit Baumwachs verstrichen, wie bereits in §. 90 angegeben wurde.

Um des Erfolges ganz sicher zu sein, setze man über die Veredlung einen Glascylinder (Fig. 17), wozu ein sogenanntes Probirglas, wie es in jeder Glaswaarenhandlung zu haben ist, dient, welcher unten mit Baumwolle oder etwas Moos verstopft wird, um die Veredlung von der äußeren Luft abzuschließen. Wenn das Auge angewachsen ist und zu treiben anfängt, so wird es nach und nach ans Freie gewöhnt und endlich bei trübem Wetter das Glas ganz entfernt, sowie auch der Verband gelöst.

93. Veredelt man in Töpfe gepflanzte Wildlinge auf diese Weise, so ist der Erfolg am sichersten, wenn man sie, ohne daß die Wundränder mit Baumwachs verstrichen zu werden brauchen, 2 bis 3 Wochen in geschlossene Luft bringt, d. h. in ein der Luft und Sonne abgeschlossenes, feucht-warmes, niedriges Gewächshaus oder einen Mistbeetkasten. Der Rosenfreund, welchem derartige Vorrichtungen nicht zu Gebote stehen, kann sich sehr leicht dadurch helfen, daß er seine Veredlungen zwischen Doppelfenster bringt, durch vorgeschobene Papierbogen, Fenstervorsetzer und Marquisen gegen die Sonne schützt, für feuchte Luft und bei Winterszeit durch irgend eine Vorrichtung für hinlängliche Wärme (12 bis 14° R.) sorgt; z. B. vermittelst mit heißem Wasser gefüllter steinerner Flaschen oder Blechröhren, mit welchen letztern sich bei Anwendung einer Spirituslampe gleichsam eine Wasserheizung im Kleinen herstellen läßt. Auch kann man unter dem Boden, auf welchem die Töpfe stehen, so viel hohlen Raum lassen, daß sich ein mit heißem Sande gefüllter flacher Blechkasten unterschieben läßt, welcher die Wärme ebenfalls längere Zeit hält. Die besten Doppelfenster sind die in starken Mauern, einige Fuß tief, oder diejenigen, welche nach innen wie ein Glasschrank, oder nach außen wie ein Glashaus etwas vorspringen. Diese Fenster werden bei Kälte von außen durch Strohdecken oder doppelte Verglasung geschützt

---

wird in geschlossenen Büchsen aufbewahrt und läßt sich bei jeder Witterung anwenden; sie haftet gut, auch am feuchten Holze, und es zeigt sich, daß die Verheilung sehr regelmäßig vor sich geht. Dieses Harz wird nur ganz dünn auf die Wundplatte und den Verband aufgestrichen, wozu ein schmales, spatelförmig zugespitztes Hölzchen, oder ein kleiner Haarpinsel dient.

und müssen nach unten einen starken doppelten Boden haben, damit es von unten nicht hineinfriert. Der sogenannte Wart'sche Kasten (ein mit Glas bedeckter Blumentisch) eignet sich ebenfalls dazu.

Geschieht diese Veredlung im Spätsommer oder Herbste, so läßt man die Augen nicht mehr austreiben, da sie doch nur einen schwächlichen Trieb hervorbringen würden, sondern stellt die Okulanden, so wie sie eben verwachsen und allmählich ans Freie gewöhnt worden sind, ins Freie und bei eintretender Kälte in einen gegen Kälte verwahrten Kasten, ein frostfreies Zimmer, einen Keller oder eine Erdgrube, pflanzt sie, im Falle man nicht beabsichtigt, sie in Töpfen fortzukultiviren, bei eintretender warmer Witterung und wenn keine starken Nachtfröste mehr zu erwarten sind, auf den für sie bestimmten Platz ins Freie und verfährt mit ihnen, wie in §. 90 und 92 schon angegeben.

94. Die verschiedenen Arten des Pfropfens, das Kopuliren und Anplatten, werden bei den Rosen mit gutem Erfolge im Winter und Anfang Frühjahr vorgenommen. Die dazu erforderlichen Edelreiser müssen, wie schon in §. 92 angedeutet, vor Winter geschnitten und im Keller, einem leeren Mistbeetkasten, oder in die Erde vergraben aufbewahrt werden. Die Veredlungsarbeit ist auf verschiedene Weise auszuführen. Hat man Sämlinge oder aus Stecklingen gezogene Wildlinge (s. §. 82), so werden diese im Herbste in Töpfe eingepflanzt, um später veredelt und im Gewächshause, Mistbeete oder an einem andern dem Rosenfreunde zu Gebote stehenden Platze (s. §. 93) aufgestellt zu werden; oder man veredelt die Sämlinge auf der Hand (s. §. 96) und pflanzt sie Ende April, wenn keine zu rauhe Witterung mehr zu erwarten ist, gleich ins Freie. Bei Ausläufern läßt sich letzteres nicht thun, indem diese nicht die kräftige Beschaffenheit und das reiche Wurzelvermögen wie die mehrmals verpflanzten Sämlinge besitzen; letztere werden auch nur ganz niedrig, entweder auf den Wurzelhals, oder einige Centim. darüber, mit Erfolg auf diese Weise veredelt.

Die geeignetste Zeit, diese Veredlung vorzunehmen, ist von Anfang März bis Anfang April. Zeitigere Veredlungen schlagen nicht immer gut an, es müßte denn sein, man hätte die Unterlagen schon ein Jahr lang in Töpfen kultivirt und besäße zum Antreiben passende Räumlichkeiten. In diesem Falle kann man schon im Januar zu veredeln anfangen.

Ehe man jedoch mit der Arbeit beginnen kann, müssen die Wildlinge etwas angetrieben worden sein; denn nur dann geht die Verwachsung rasch und sicher von Statten, wenn die Unterlagen in lebhafter Vegetation sind.

Je nach der Beschaffenheit der Reiser und Unterlagen wendet man verschiedene Veredlungsmethoden an. Man pfropft entweder in den halben Spalt, in die Rinde, oder wendet das Kerbpfropfen (Trianguliren) an, mit abgeworfenem Wildholze, oder man läßt den Wildling ungekürzt und setzt das schräg durchschnittene Edelreis in den seitlichen Einschnitt. Unter Kopuliren ist die eigentliche Kopulation und das Anschäften oder Anplatten zusammenzufassen, da ein wesentlicher Unterschied in diesen Formen nicht besteht. Alle Methoden sind gleich gut, und wenn sie sorgfältig ausgeführt werden, so sind die Resultate dieselben, so daß man auch später nichts bemerkt, was zu Gunsten der einen oder der andern spräche. Alle Wundränder und offenen Schnittflächen verstreiche man mit kalt- oder warmflüssigem Baumwachse (s. §. 92 Anmerkung). Zum Verbinden benutze man ein gutes, festes Bast oder Wollengarn. Sobald die Edelreiser angewachsen sind, muß der Verband gelöst werden. Bei Sämlingen geht die Verwachsung sehr rasch von Statten, und wenn man nicht recht aufmerksam auf die Fortschritte der Vernarbung ist, so ist das Edelreis verunstaltet, ehe man es sich versieht. Zu einer vollständigen Vernarbung pflegt ein Zeitraum von 3 bis 4 Wochen erforderlich zu sein. Gleich nach der Veredlung werden die in Töpfen befindlichen Rosen in etwas erhöhte Temperatur (12 bis 14° R.) gebracht. Doch hüte man sich vor zu hohen Wärmegraden und einer dadurch herbeigeführten Ueberreizung, da in Folge derselben das Edelholz nicht selten zurückgeht. Eine weitere Bedingung ist ein gleichmäßiger Feuchtigkeitsgrad, welchen man durch öfteres Spritzen herzustellen sucht. Das Beschatten bei starker Sonne darf ebenfalls nicht versäumt werden.

95. Bei der Veredlung hochstämmiger Rosen im Winter empfiehlt sich außerdem das nachstehende bei weitem billigere und auch sonst zweckmäßige Verfahren:

Nachdem man im Monat Oktober die Wildlinge gesammelt, die besten derselben ausgesucht und die beschädigten Wurzeln beschnitten, bindet man sie zu 25 bis 30 Stück zusammen, schlägt sie in die Erde ein und bedeckt sie ziemlich stark mit Laub, so daß der Frost nicht durchdringen kann. Vom December an nimmt man nach und nach, etwa in Zwischenräumen von 8 Tagen, eine Partie heraus, umgiebt die Wurzeln mit möglichst langem Waldmoos, welches man mit ein oder zwei dünnen Weiden oder auch mit Bast oder Bindfaden befestigt, taucht hierauf diesen entstandenen Ballen in einen zurecht gemachten Lehm- oder Erdbrei, umgiebt den mit Lehm getränkten Ballen nochmals mit Moos und befestigt dies ebenfalls mit Wei-

den. Bast oder Bindfaden ist bei diesem äußern Verbande nicht anzurathen, weil sie sehr rasch verfaulen und der Ballen dann auseinander fällt. Selbstverständlich muß das Moos und die Erde an einem frostfreien Orte vorräthig gehalten werden, um es zu jeder Zeit zu diesem Zwecke verwenden zu können.

Die so hergerichteten Wildlinge werden nun ins Warmhaus gebracht, und ziemlich nahe dem Heizkanale in 2 bis 3 Reihen dicht auf einander gesetzt und öfters mit lauem Wasser überspritzt, so daß sie sich in einem gleichbleibenden milden Feuchtigkeitsgrade befinden. Nach einigen Wochen fangen unter dieser Behandlung die Wildlinge an zu treiben und nun kann mit dem Veredeln begonnen werden. Nach dem Veredeln hält man sie gleichmäßig feucht wie vorher und verfährt im Uebrigen, wie im vorhergehenden §. angegeben ist.

Die Vortheile dieser Methode sind einestheils sehr wesentlich, indem man 1) keine Töpfe braucht; 2) eine viel größere Anzahl von Rosenstämmen in einem beschränkten Raume unterbringen kann, als dies bei Töpfen der Fall ist; 3) es mit dem Ausbrechen oder Ausschneiden der Wurzelausläufer leichter geht; 4) bilden sich in dieser Moosumhüllung leichter und mehr Faserwurzeln und 5) ist für den Handelsgärtner besonders noch von Wichtigkeit, daß die Verpackung bei Versendungen eine viel leichtere ist, als bei den in Töpfen gehaltenen Exemplaren.

Anderntheils ist diese Methode doch auch mit mancherlei Umständlichkeiten verknüpft. Fängt man z. B. schon zeitig — im Januar oder Februar — an zu veredeln, so ist man genöthigt diejenigen Rosen, deren aufgesetzte Augen oder Reiser entsprechend getrieben und durch deren Moosballen die jungen Wurzeln oftmals schon fingerlang durchgetrieben haben, behufs einer Uebersiedelung nach einer kühleren Abtheilung, in Töpfe zu pflanzen. Wird dieses unterlassen, so erleidet man bedeutende Verluste. Außerdem tragen diese Moosumhüllungen sehr stark zur Vermehrung der sogenannten Kellerasseln bei.

Veredelt man dagegen erst Anfang April, so kann man nach 4 Wochen bei geeigneter Witterung die eben angewachsenen Augen, bevor sie ausgetrieben, ohne Nachtheil sogleich ins Freie an den für sie bestimmten Ort pflanzen, wo sie dann bald anfangen werden kräftig auszutreiben. Bei derartiger Veredlung habe ich auch die sogenannte Forkert'sche Methode für die geeignetste befunden.

96. Die auf der Hand*) veredelten Rosen werden nach beendigter Arbeit, womöglich bei trübem, mildem Wetter, in das freie Land gepflanzt, wobei man die Stöcke nicht tiefer setzt, als sie vorher gestanden haben, indem es zu ihrem besseren Gedeihen nicht nöthig ist, daß die Veredlungsstelle mit in die Erde kommt, damit das Edelreis selbst Wurzeln schlägt und die Rose dadurch zu einer wurzelächten gemacht wird (s. §. 9). Denn bei den Sämlingen ist die Verwachsung der edlen Rose mit der Unterlage eine so innige, daß nach einjährigem Wachsthume die Veredlungsstelle kaum noch zu entdecken ist. Ein Absterben der edlen Theile, wie dies oft bei Benutzung schlecht bewurzelter Ausläufer der Fall ist, kommt hier nur ausnahmsweise vor. Feuchte warme Luft ist die Hauptbedingung des Anwachsens. Bei starkem Sonnenscheine gebe man den Topf- wie den Handveredlungen Schatten. Ist die Witterung im Frühjahre warm und feucht, so darf man auf das Gelingen derselben rechnen; ist es aber rauh, kalt und windig, so sind Verluste nicht zu vermeiden. Für einen solchen Fall ist es gut, die Veredlungen auf irgend eine Art zu schützen. Sind sie auf ein Beet zusammen gepflanzt, so läßt sich dies leicht durch einen darüber gestellten mit Fenstern bedeckten Mistbeetkasten oder eine ähnliche Vorrichtung bewerkstelligen, bei einzeln gepflanzten durch darüber gestellte Glasglocken oder Blumentöpfe, sollten sie bei letzteren auch das Licht für kurze Zeit entbehren müssen. Hat man mit der Auspflanzung noch gar nicht begonnen, so schlage man sie lieber bis zum Eintritt günstigerer Witterung im Keller in feuchtes Moos ein. Der Abstand, in dem die veredelten Rosen gepflanzt werden müssen, betrage mindestens 31 Centim., da sie bald sehr kräftig vegetiren; sollen sie hingegen an der Auspflanzstelle stehen bleiben, so müssen sie mindestens 1 Meter Abstand erhalten. Je nach der Starkwüchsigkeit der Sorten sind jährige Triebe von 0,63 bis 1,80 Centim. gewöhnlich. Bei einigen Sorten werden sie noch höher, zumal dann, wenn der Boden gut zubereitet und im Sommer fleißig bewässert wurde.

Diese Handveredlung auf Sämlinge der R. canina läßt sich übrigens den ganzen Winter hindurch — vom November ab — am besten vermittelst Pfropfens in die Seite — in der Gärtnersprache auch „Einspitzen" genannt — vornehmen. Man schneidet hierzu das Edelreis blos von ein, höchstens 2 Augen, verbindet mit einem Baſtfädchen, ohne dann noch mit

*) Darunter versteht man das Veredeln der Wildlinge, ohne dieselben vorher in Erde gepflanzt oder in Moos eingewickelt zu haben.

Baumwachs zu verstreichen und schlägt sie sortenweis zusammen gebunden in einem frostfreien Raume ein, bis man sie entweder in Töpfe oder ins Freie pflanzen kann. In der Regel ist während dieser Zeit das eingesetzte Reis angewachsen. Will man sie schon zur Verwendung im Frühjahre haben, so bringe man die in Töpfe eingepflanzten Veredelungen zeitig auf ein warmes Beet, wo sie bald einen kräftigen Trieb entwickeln.

97. Bei weicheren Rosen, als Bourbon-, Noisette-, Thee- und Bengal-Rosen, ist es besonders zu empfehlen, sie auf in Töpfe gepflanzte oder in Moos eingewickelte Wildlinge zu veredeln. Auch diese pflanze man, wenn sie nicht als Topfrosen kultivirt werden sollen, nachdem die nun schon entstandenen jungen Triebe ganz allmählich ans Freie gewöhnt worden sind, ins Freie, jedoch nicht früher, als bis man vor Frösten sicher ist.

Die in Töpfen gehaltenen Rosen bieten aber noch den Vortheil, daß man sie auch zu andern Zeiten, ohne daß man die Wurzeln verletzen muß, aus dem Topfe herausnehmen kann, um seine Rosenpflanzungen zu rekrutiren, oder neue anzulegen, z. B. wenn man sich mit den dazu nöthigen Vorarbeiten verspätet hat.

98. Bevor die verschiedenen Pfropf- und Kopulirmethoden näher erklärt werden, sei noch bemerkt, daß das Edelreis, mit Ausnahme beim Seitenpfropfen (Einspitzen), mindestens 2 Augen besitzen muß. Es sollte, wenn es nicht die Noth erfordert, nie aus der Spitze eines Triebes geschnitten sein, sondern man benutze dazu lieber, wie schon bein Okuliren bemerkt wurde, blos die mittleren Augen. Bei allen Reiserveredlungen suche man ein Auge mit in den Verband hinein zu bringen, indem dies immer noch zum Austreiben befähigt zu sein pflegt, im Fall den oberen Augen ein Unfall widerfährt. Das nächstfolgende Auge von unten komme womöglich unmittelbar über die Wundplatte des Wildlings zu stehen, damit dasselbe, wenn es austreibt, was meistens der Fall ist, Säfte herbeizieht, welche die schnelle Ueberheilung der Veredlungsstelle vermitteln. Die Unterlage schneidet man auch dicht über einem gesunden Auge weg; dasselbe treibt aus, zieht Säfte herbei und trägt wesentlich zur Erhaltung des Edelreises bei. Diesen wilden Trieb entfernt man erst, wenn das Edelreis 15 bis 20 Centim. getrieben hat, muß aber, wenn er zu sehr überhand nimmt, früher schon eingestutzt werden. Alle unterhalb der veredelten Stelle erscheinenden Triebe müssen auch hier stets entfernt werden.

99. Die gewöhnlichste Art zu pfropfen ist bei den Rosen das Pfropfen in den halben Spalt (Fig. 18.) Die Unterlage wird glatt abgeplattet und in der Mitte von einer Seite, allein nicht länger, als nöthig ist, ge-

spalten. Ein zweiseitig schräg zugespitztes Edelreis, auf beiden Seiten mit einem Sattel versehen (Fig. 19) wird in den mittelst des Messers offen gehaltenen Spalt so eingefügt, daß die Rinde desselben genau an die Unterlage zu liegen kommt und der Sattel auf der Platte fest aufsitzt. Die Wunde wird fest verbunden und diese, wie auch die bloßliegende Platte mit Baumwachs überzogen. Dieser Sattelschnitt des Reises wird auch oft weggelassen und deshalb blos an beiden Seiten schräg zugespitzt geschnitten. (Fig. 20.)

Fig. 18. Fig. 19. 20. Fig. 21. Fig. 22.



100. Weit vorzüglicher und minder gewaltsam ist das Kerbpfropfen, Trianguliren, oder Pfropfen mit dem Geißfuß (Fig. 21). Der Wildling wird ebenfalls abgeplattet und nach Verhältniß der Stärke des einzusetzenden Edelreises ein etwa 2 Centim. langes Dreieck (richtiger Dreikant oder Prisma) herausgenommen, dessen Tiefe nicht ganz bis auf das Mark geht. Das Pfropfreis (Fig. 22) muß ganz genau dieselbe dreieckige Form erhalten, so daß Rinde auf Rinde paßt und der Raum des herausgenommenen Triangels vollkommen ausgefüllt ist. Das Verbinden ist gleich dem beim Pfropfen in den halben Spalt.

101. Das Pfropfen in die Rinde kann nur angewendet werden, wenn die Rinde sich gut lösen läßt. Es verdient ebenfalls vor dem Spaltpfropfen den Vorzug und die Verwachsung geht schnell und leicht vor sich. Man schneidet das Reis bis auf die Hälfte quer ein und von da aus schräg in eine Spitze zulaufend; die Schnittfläche sei 2 bis 2½ Centim. lang; an der vordern Seite desselben wird ferner zu beiden Seiten etwas von der äuße-

Fig. 23 a u. b. Fig. 24.



ren Rinde hinweggenommen (Fig. 23a die nach außen und b die nach innen gekehrte Seite des Edelreises). Die Unterlage wird abgeplattet und an der glatteſten Stelle ungefähr $2\frac{1}{2}$ Centim. lang ein ſenkrechter Schnitt durch die Rinde bis auf das Holz geführt (Fig. 24). Unter die ſich bildenden zwei Rindenflügel wird das Reis eingefügt und zwar ſo, daß der Sattel deſſelben dicht auf der Platte des Wildlings aufſitzt. Der Verband wird ganz wie beim gewöhnlichen Pfropfen angebracht.

102. Beim Pfropfen in die Seite macht man in die Unterlage einen ſchrägen Einſchnitt ſeitlich durch die Rinde und etwas ins Holz gehend; darauf nimmt man etwas Rinde oberhalb noch weg, ſo daß ſich eine etwa 2 Centim. lange Wundfläche bildet. Das Edelreis wird ſeitwärts eines Auges ſchräg durchſchnitten und in der dem Schnitt entgegengeſetzten Seite an der Spitze etwas Rinde weggenommen (Fig. 25). Das in den Ausſchnitt am Stamme genau paſſende Reis (Fig. 26) wird feſtgebunden und die Veredlungsſtelle, ſofern dieſe Art Veredlung im Freien angewendet wird, mit Baumwachs verſtrichen.

Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27.



103. Kopuliren nennt man die Vereinigung zweier in allen Theilen gleichen Flächen des Wildlings und des Edelreises (Fig. 27). Es ist eine der vorzüglichsten Veredelungsarten, hat jedoch wegen der Nothwendigkeit der größten Genauigkeit und Gleichmäßigkeit manche Schwierigkeiten; auch entsteht hieraus manche Beschränkung in der Anwendung. Man schneidet am Wildlinge von unten nach oben (Fig. 28) und am Reis von oben nach unten (Fig. 29) eine ebene schräge Fläche; beide Flächen müssen so genau sein, daß die des Reises genau die Fläche des Wildlings deckt. Es werden alsdann beide mittelst sogenannter Kopulirbänder (mit Baumwachs bestrichener ½ Centim. breiter Papierstreifen, oder noch besser, leinener Bänder) fest und dicht verbunden.

Fig. 28. 29. 30. Fig. 31.



104. Ist der Wildling stärker als das Edelreis, so wird nur an der einen Seite desselben ein schräger Schnitt (Kopulirschnitt) gemacht und das Reis an die Seite so angesetzt, daß wenigstens auf einer Seite genau Rinde auf Rinde paßt (Fig. 30). Die sehr einfache Methode nennt man Anschäften, Anplatten, Schäften. Der Verband geschieht auf die gewöhnliche Weise.

105. Zum Veredeln auf der Hand verdient das Sattelschäften Fig. 31) besonderer Empfehlung. Auf diese Art lassen sich die schwächsten

Reiser mit weit stärkeren Unterlagen in der naturgemäßesten Weise verbinden. Es sind so viele Berührungsstellen da, die Verwachsung erfolgt so schnell und vollkommen, daß schon deshalb diese Methode großen Vorzug verdient, wenn auch nicht die schon angedeutete allgemeine Anwendbarkeit bei allen Wildlingen für dieselbe spräche. Der Wildling wird, wie Fig. 32 zeigt, an der einen Seite seitlich eingeschnitten und von da aus ein schmaler Streifen Rinde und Holz weggenommen, während oberhalb der Stamm schräg abgeplattet wird. Das Reis wird ½ Centim. unter einem Auge schräg eingekerbt und etwas Holz ausgeschnitten, dann die Schnittfläche nach unten hin geradlinig verlängert und zuletzt das Reis auf der entgegengesetzten Seite etwas zugespitzt (Fig. 33).

Fig. 32. Fig. 33.

Vierter Abschnitt.

Das Treiben der Rosen.

Unter allen holzartigen Pflanzen, welche sich zum Treiben eignen, um während der kälteren Jahreszeit ihre Blüthen zu entfalten, nehmen die Rosen den ersten Rang ein. Blühende Rosen im Winter zu haben, ist, wenn auch nicht der größte, doch der schönste Triumph der Kunst und gewährt nicht nur dem Blumenfreunde einen hohen Genuß, sondern auch dem Handelsgärtner, namentlich in großen Städten, eine reichliche Einnahme. Die Kunst des Treibens besteht also darin, die Vegetationsperioden auf andere Jahreszeiten, als die natürlichen, zu verlegen, aber in möglichst naturgemäßer Aufeinanderfolge.

Erstes Kapitel.

Das Treiben in Töpfe gepflanzter Rosen.

106. Diejenigen Rosen, welche man behufs des Treibens in Töpfe pflanzt, müssen in kräftigen, jungen ein- bis zweijährigen Pflanzen bestehen, mögen es veredelte (diese verdienen den Vorzug) oder aus Stecklingen und Ablegern gezogene sein. Das Einpflanzen geschieht im Herbste, oder, wenn es Umstände nöthig machen, zeitig im Frühjahre, in ihren Wurzeln ange-

messene Töpfe, worin sie jedoch reichlich Platz haben müssen, indem die zu treibenden Rosen mehr Nahrung bedürfen, als die nach dem gewöhnlichen Naturgange in Töpfen zu kultivirenden Rosen. Die dazu erforderliche Erde muß kräftig und locker sein; man kann daher dieselben Mischungen benutzen, welche für die Kultur der Rosen in Töpfen (2. Abschnitt, 1. Kapitel) angegeben worden sind.

Pflanzt man sie im Herbste ein, so entfernt man blos alle zu dicht stehenden, dünnen, kraftlosen Zweige glatt an ihrer Basis. In milderen Gegenden, wo der Winter nicht zu streng wird, und besonders bei Benutzung blos frostharter Sorten, können die Töpfe im Freien verbleiben, indem man sie auf einem Beete einläßt und darüber 15 Centim. hoch Laub, Nadelstreu oder ein anderes Deckmaterial bringt. Am besten eignet sich hierzu auch ein Kohlenbeet, indem darin die Töpfe weniger dem Mürbewerden, auch nicht dem Eindringen der Würmer ausgesetzt sind. In kälteren Gegenden, und auch überhaupt, ist es rathsamer, die Rosen in einem Kasten, worin sie bei eintretendem Frostwetter geschützt werden können, oder in einem andern luftigen, frostfreien Raume zu überwintern.

Im Frühjahre schneidet man die stehen gelassenen Triebe auf 2 bis 3 Augen zurück, senkt dann die Töpfe im Freien auf einem recht warmen und ziemlich sonnig gelegenen Sand- oder Kohlenbeete ein, hält sie stets gleichmäßig feucht und giebt ihnen alle 8 bis 14 Tage einen schwachen Düngerguß, damit die Triebe sich frühzeitig und recht kräftig ausbilden. Für diejenigen Rosen, welche schon von Mitte September ab angetrieben werden sollen, ist es besser, sie schon im März in einem mäßig warmen Raume (am besten in einem lauwarmen Mistbeetkasten) aufzustellen, damit sich die Triebe früher ausbilden.

Auf diese Weise behandelte Rosen haben die natürliche Neigung, auch früher wieder in Vegetation zu treten. Alle an den jungen Trieben erscheinenden Blüthenknospen werden sogleich ausgebrochen, damit jenen die zu ihrer vollkommenen Ausbildung nöthigen Kräfte nicht entzogen werden. Nachdem die Triebe vollständig ausgewachsen sind, was gewöhnlich bis Anfang August der Fall zu sein pflegt, hebt man die Töpfe, welche frühzeitig angetrieben werden sollen, aus dem Beete heraus, stellt sie oben auf, begießt sie mäßiger und schützt sie auch gegen anhaltenden Regen oder legt die Töpfe an einer Stelle, wo sie nicht der vollen Sonne ausgesetzt sind, um, damit sie nicht begossen und beregnet werden können. In ihr vorheriges Winterquartier bringt man sie nicht eher, als bis sie einer Kälte von 3 bis 6 Grad ausgesetzt waren, wonach merkwürdiger Weise das Treiben aller

Laub abwerfenden Gehölze schneller und mit besserem Erfolge vor sich geht. Mit denjenigen Rosen, die man schon früher, z. B. im September, antreiben will, kann man allerdings nicht auf Frost warten, weshalb diese auch längere Zeit bis zum Blühen brauchen, als diejenigen, mit denen das Treiben erst später begonnen wird.

Bevor die Rosen zum Treiben warm gestellt werden, schneide man die etwa durch das Abzugsloch gegangenen Wurzeln glatt weg, entferne die obere schlechte Erde, jedoch ohne die Wurzeln zu verletzen, und ersetze sie durch andere nahrhafte. Die Zweige, von denen man blos die 4 bis 8 kräftigsten konservirt, die dann möglichst gleichmäßig vertheilt, kreisförmig stehen müssen, schneidet man auf mehr oder weniger Augen zurück, je nachdem es die Sorte und die Zeit, wann sie angetrieben werden sollen, verlangt. Da die Augen um so früher zur Entwickelung gelangen und um so früher blühen, je höher sie am Zweige stehen, so wendet man einen längeren Schnitt an, als gewöhnlich, und um einen so längeren, je früher man im Winter treiben will. Wird die Pflanze gar nicht geschnitten, so tritt eine frühere Vegetation ein und demgemäß auch ein zeitiger und reicher Flor. Deshalb unterlassen auch manche Treibgärtner den Schnitt vor dem Treiben ganz und beschränken sich blos auf das Niederbiegen der Zweige. Es handelt sich aber beim Treiben auch um Erzeugung vollkommen entwickelter Blumen, sowie bei der Topftreiberei auch um schön geformte Pflanzen; beides erzielt man erst durch Anwendung eines zweckmäßig ausgeführten Schnittes. Denjenigen Rosen, welche man von Mitte September bis zum December treiben will, nimmt man daher blos die äußersten schwachen Zweigspitzen, weil beim Frühtreiben die obersten 2 oder 3 Augen die frühesten und dabei vollkommensten Blumen erzeugen. Beim späteren Treiben schneidet man auf 6 bis 8 Augen. Jeder von diesen Zweigen wird 2 bis 3 Blüthenzweige entwickeln. Alle überflüssigen und unzweckmäßig gestellten Triebe entfernt man sogleich bei ihrem Entstehen.

Die zum Treiben bestimmten Töpfe können bis zur Zeit, wo das Treiben beginnt, im Freien stehen bleiben und durch eine Bedeckung mit Laub gegen große Kälte geschützt werden. Gerathener aber ist es, wenn man es haben kann, sie unter Dach zu bringen, weil die Töpfe oft bei hohem Schnee ausgesucht werden müssen, ebenso auch schon aus den vorhin erwähnten Gründen. Sowie sie ins Treiblokal kommen, können sie einen kräftigen Düngerguß erhalten, welcher bei der Knospenbildung wiederholt wird.

107. Da die verschiedenen Varietäten der Rose auch sehr verschieden, die eine früher, die andere später, zum Austreiben geneigt sind, so hängt der

Erfolg der Treibkultur auch von der Wahl der Sorte und des Zeitpunktes ab, wo das Treiben beginnen soll.

Am frühesten lassen sich treiben: Unter den Remontanten: La reine, Géant des batailles, Louise Peyronny, Souvenir de la reine d'Angleterre, William Jesse, Du roi. Etwas später (im Januar) können getrieben werden: Baronne, Prévost, Triomphe de l'exposition, sowie Centifolien und Moosrosen, und noch später Jules Margottin, Général Jacqueminot, sowie die in §. 81 angegebenen Sorten. Unter den Theerosen: Gloire de Dijon, Madame Falcot und Safrano. Von Bengal-Rosen: Cramoisi supérieur. Von Noisetten: Aimée Vibert und Lamarque. Von Bourbon-Rosen: Souvenir de Malmaison und Mistress Bosanquet (Pauline Bonaparte.) Außerdem die schöne weiße Damascenerrose: Madame Hardy, und die gelbe persische Rose (Persian yellow). Diese sind die gebräuchlichsten zur Treibkultur; außerdem giebt es noch eine ziemliche Anzahl anderer Sorten, welche sich mit gleichem Erfolge früher oder später antreiben lassen, wie im sechsten Abschnitte zu ersehen ist.

108. Zum Antreiben in Töpfe gepflanzter Rosen eignen sich verschiedene Behälter. Am seltensten wird ein Rosenfreund im Besitze eines nur zur Rosentreiberei eingerichteten Treibhauses sein, das im nächsten Kapitel beschrieben werden soll, sondern er wird in den meisten Fällen sich genöthigt sehen, die anzutreibenden Rosen in einem Vermehrungshause, in einem Warmhause, in einem Treibhause, wo Früchte und andere Sachen angetrieben werden, in einem dazu angelegten warmen Kasten, an der wärmsten und dem Glase zunächst gelegenen Stelle eines Kalthauses, oder gar nur hinter dem Fenster der Wohnstube oder zwischen den Doppelfenstern aufzustellen; alle diese Räumlichkeiten eignen sich dazu, wenn man es sonst nicht an der erforderlichen Pflege fehlen läßt. Muß man die Rosen in einem Raume mit andern Pflanzen zusammen aufstellen, so bringe man sie wenigstens der besseren Uebersicht und auch der von den andern Pflanzen abweichenden Pflege halber auf einen Platz allein und zwar so nahe als möglich unter die Fenster. Im Warm-, Vermehrungs- oder Treibhause bringe man sie von Anfang auf die wärmste Stelle, etwa über die Heizung, wo jedoch immer für hinlängliche Feuchtigkeit der Erde und feuchte Luft gesorgt werden muß, was am besten dadurch erzielt wird, daß nicht blos auf die Heizung (den sogenannten Wolf) ein Gefäß mit Wasser zum Verdunsten gestellt wird, sondern daß man auch die Rosentöpfe selbst in mit Wasser gefüllte Untersatzschalen oder niedrige Blechkästen stellt, jedoch auf untergelegte drei egale Ziegelsteinchen, oder auf kleine Blumentöpfe, damit der Boden des Topfes

vom Wasser nicht berührt wird. Das Bespritzen mit überschlagenem Wasser darf ebenfalls nicht versäumt werden, muß aber früh Morgens zeitig, bevor die Sonne darauf scheint, und gegen Abend, nachdem die Sonne weg ist, geschehen. Wenn die Knospen erscheinen, bringt man sie dann auf eine kühlere Stelle des Hauses und wenn sie anfangen sich zu entfalten, kann man die blühenden Pflanzen zur Ausschmückung des Grünhauses oder eines mäßig erwärmten Zimmers (jedoch auch nahe am Fenster) verwenden. Zur späten Treiberei eignen sich auch recht gut die oberen Stellagenbretter eines Kalthauses, wo die Triebe eigentlich weniger durch Heizwärme, als vielmehr durch die Sonne herbeigelockt werden; es dauert hier allerdings einige Wochen länger, ehe man die Rosen zur Blüthe bekommt.

109. Zum frühzeitigen Antreiben läßt sich ferner ein durch Pferdemist und Laub erwärmter hoher gemauerter oder auch nur aus starken Brettern bestehender Mistbeetkasten benutzen. Nachdem die hineingebrachte 47 bis 63 Centim. hohe Mistlage abgedampft hat, was gewöhnlich nach 6 bis 8 Tagen geschehen zu sein pflegt, wird sie egal niedergetreten; dann bringt man 25 Centim. hoch Sägespäne oder Lohe darauf, in welche man die Töpfe bis an den Rand einläßt. Ist die Mistlage aber noch zu heiß, daß die Wurzeln Schaden leiden können, so stellt man die Töpfe von Anfang blos oben auf, oder legt, wenn es nöthig ist, sogar noch Bretter unter, und besorgt das Einlassen erst später. Bevor die Rosen getrieben haben, lüftet man nur so viel, um den sich ansammelnden Dunst herauszulassen. So wie sich aber die Blätter entwickeln, muß bei günstiger Witterung reichlicher Luft gegeben werden. Bei klarem Wetter müssen die Pflanzen bis zum Aufbrechen der Knospen täglich ein- bis zweimal mit lauem Wasser gespritzt werden; bei trübem und rauhem Wetter unterbleibt es. Das Beschatten bei starkem Sonnenscheine ist ebenfalls nicht zu versäumen. Tritt kalte Witterung ein und ist der Kasten nicht mehr warm, so muß der 90 Centim. breite Mistumsatz um den Kasten wieder erneuert werden, indem man einen Theil des alten Mistes entfernt, den bleibenden mit frischem Miste untermischt und den Umschlag von Neuem aufsetzt.

Der Erfolg der Frühtreiberei in einem solchen Kasten ist jedoch von der Witterung sehr abhängig. Ist der Herbst sonnig, so kann man, wenn im September begonnen worden ist, schon Mitte November blühende Rosen haben; wenn er trübe und rauh ist, gelingt es dagegen bei der größten Sorgfalt kaum bis Anfang Januar.

110. Zweckmäßiger, als ein gewöhnlicher Mistbeetkasten, zumal in Gegenden, wo der Winter streng und von langer Dauer, ist ein sogenannter

Holländischer Treibkasten, dessen nach Süden abfallende Glasbedachung einen Winkel von 35 bis 40 Grad bildet, und dessen nach Norden liegende Rückseite entweder aus Backsteinen oder aus einer doppelten Bretterwand, dicht gefüttert mit trockenen Sägespänen, trocknem Moose oder Kohlenstaube, besteht. An der Westseite wird eine kleine Thür angebracht, die nur so hoch und breit ist, um den Eintritt eines Mannes zu gestatten. Rings um das 1,60 Meter breite Beet, welches mit Pferdemist und Laub erwärmt wird, worauf zum Einlassen der Töpfe 30 Centim. hoch Sägespäne oder Lohe zu liegen kommen, führe man einen 63 Centim. breiten Weg. Ein kleiner Heizkanal oder Ofen wird an der Rückseite angebracht, um bei anhaltender strenger Kälte, wenn es nöthig ist, heizen zu können. Zur Bedeckung des Kastens sind gute Strohdecken und Läden nöthig.

Will man erst im April und Mai blühende Rosen haben, so bedürfen die zu treibenden Rosen keiner Bodenwärme, sondern man stellt sie blos auf das einige Centimeter hoch mit Sand oder Kohlenstaub belegte Beet.

111. Was das Treiben der Rosen im Zimmer anbelangt, so verweise ich hier auf die im §. 90, bei Gelegenheit der Winterveredlung, angegebenen Vorrichtungen, welche sich eben so gut zum Antreiben der Rosen eignen, sowie auch auf den in §. 50 als Zimmerspritze so zweckmäßig geeigneten rafraîcheur (rafraîchisseur).

112. Wie schon oben bemerkt, hängt beim Treiben ein günstiger Erfolg zum Theil davon mit ab, daß man genau die Zeit kennt, wann eine Sorte geneigt ist, auszutreiben. Wird eine Sorte zu einer Zeit getrieben, in welcher sie noch nicht dazu geneigt ist, so bleibt die Treibwärme vorerst ohne allen Einfluß, denn die Rose gewöhnt sich an die künstlich erzeugte Temperatur und entwickelt sich erst später, unregelmäßig und unvollkommen. Wäre sie 2 bis 3 Wochen später eingesetzt worden, so würde sie vielleicht sogleich ausgetrieben haben. Findet bei in Töpfen stehenden Rosen ein solches Versehen statt, so kann man diejenigen, deren Augen sich nicht nach einigen Tagen regen, für 2 bis 3 Wochen wieder kühl stellen und erst dann in das Treiblokal zurückbringen. Dieser plötzliche Uebergang schadet nichts, und das Austreiben wird dann bald erfolgen.

113. Weniger Mühe als das Treiben der Land- und Gartenrosen erfordert das Treiben der Topfrosen mit immergrünen Blättern, nämlich verschiedene Varietäten der Monats- oder Bengalrose, auch einige Noisetterosen (s. im sechsten Abschnitt). Besonders leicht und lohnend ist das Treiben der gewöhnlichen semperflorens pallida und der Monats-Centifolie (semperflorens centifolia), von denen letztere sich durch Größe und Schönheit der

Blumen besonders auszeichnet; es lassen sich aber auch noch andere schöne Varietäten dazu benutzen. Hat man hierzu geeignete kräftige Pflanzen in Töpfen, so verpflanzt man sie im August und schneidet sie stark zurück. Stehen sie im freien Lande, so pflanzt man sie um dieselbe Zeit bei gleichzeitigem starken Zurückschneiden aus dem Lande ein; noch besser ist es aber, dies schon im Frühjahre vorzunehmen, man hält sie aber dann nach der ersten Blüthe trocken, damit sie nicht wieder treiben. Im Herbste entfernt man blos die obere alte Erde und ersetzt sie durch nahrhafte frische. Bald nach dem Verpflanzen und Schneiden bringt man die Töpfe nahe unter Glas, in einen kalten Kasten, ein Kalthaus oder an einen andern geeigneten Platz, oder stellt sie später nach und nach, um den Flor auf den ganzen Winter zu vertheilen in einen der in §. 107 angegebenen, zum Antreiben geeigneten Behälter.

Thee-, Bourbon- und Noisetterosen behandelt man eben so; sie lassen sich aber vor Januar nicht gut antreiben. Auch benutzt man von diesen lieber veredelte Pflanzen, indem diese leichter und reicher zu blühen pflegen als wurzelächte.

Das Bespritzen ist bei Rosen mit immergrünen Blättern weniger nöthig, als bei andern Rosen, und darf bei trübem Wetter gar nicht geschehen; sie verlangen überhaupt eine nicht so feuchte Temperatur, da ihre Blätter dagegen empfindlich sind.

114. Ein Hauptaugenmerk muß man bei der Treiberei auch auf die den Rosen nachtheiligen Insekten haben, welche hier fast noch mehr auftreten, als bei den in natürlichem Zustande im Freien wachsenden. Am häufigsten treten bei den Treibrosen Blattläuse, Blattwickler und die sogenannte rothe Spinne auf, welche im fünften Abschnitte, nebst Angabe der Vertilgungsmittel, näher beschrieben sind.

Zuweilen kommt auch der Mehlthau vor, und dessen Auftreten ist oft von den traurigsten Folgen begleitet, kann aber durch einige Aufmerksamkeit fern gehalten werden. Man sehe zu diesem Ende darauf, daß die Atmosphäre hinsichtlich ihres Feuchtigkeitsgrades jederzeit eine der Vegetation zuträgliche sei, vermeide jeden plötzlichen und starken Temperaturwechsel, sorge für reichliches Licht und den zu ihrer Entwickelung hinlänglichen Raum. Sollten dennoch Pflanzen von der Krankheit befallen werden, so schaffe man sie, um die Ansteckung der andern zu vermeiden, ungesäumt fort. Gewöhnlich wendet man Schwefelblüthe an, womit man die Pflanzen bepudert, nachdem man sie vorher befeuchtet hat, damit sie besser darauf haften kann; aber selten erzielt man einen gründlichen Erfolg. (Mehr hierüber ebenfalls im fünften Abschnitte.)

115. Um dieſelben Roſen für den nächſten Winter wieder zum Antreiben benutzen zu können, pflanzt man ſie bald, nachdem ſie abgeblüht haben um, wobei man auf dieſelbe Weiſe verfährt, wie es im zweiten Abſchnitte, §. 55, beſchrieben iſt, und läßt ihnen auch nach dem Umpflanzen die in §. 56 angegebene Pflege zu Theil werden. Das Beſchneiden beſchränkt ſich nur auf das Entfernen der abgeblühten Blumen bis auf das nächſte kräftige Auge und etwa vorhandener überflüſſiger Triebe. Nachdem ſie wieder neue Wurzeln gemacht und allmählich ans Freie gewöhnt worden ſind, bringt man ſie auf ein ſonniges Beet und unterwirft ſie derſelben Behandlung, wie in §. 104 angegeben iſt. Diejenigen Roſen, welche frühzeitig angetrieben worden waren, ſind geneigt, auch im folgenden Jahre zeitig wieder zu treiben, und ſind auch zum weiteren Antreiben fähig, wenn die Pflanzen nicht geſchwächt worden ſind. Entkräftete Pflanzen muß man ein Jahr ruhen laſſen und ſtark zurückſchneiden, damit ſie wieder kräftige Triebe bilden, bevor man ſie zum abermaligen Antreiben benutzt. Ueberhaupt iſt es nöthig, alljährlich für etwas Nachwuchs zu ſorgen, um die zum Treiben untauglich gewordenen Pflanzen zu erſetzen.

Zweites Kapitel.

Das Treiben der im freien Lande ſtehenden Roſen.

116. Um möglichſt einen Uebergang von der Zeit, wo der Herbſtflor zu Ende geht, bis zu der Zeit, wo erſt die eigentliche Wintertreiberei Blumen liefert, zu bilden, ſo ſoll erſt einiges über die Verlängerung des Herbſtflors bis in den Winter hinein geſagt werden, bevor ich zum eigentlichen Treiben übergehe.

Um den Roſenflor bis in den Winter hinein zu verlängern, ſchneidet man im Auguſt die Roſen eines mit kräftigen Pflanzen beſetzten Beetes nur ſehr mäßig zurück, biegt dafür lieber die hohen Zweige bis zum Niveau der niedrigeren herab, damit ſie alle gleichmäßig vom Lichte begünſtigt werden, während man alle überflüſſigen, ſchwächeren Zweige ganz entfernt. Das Beet wird flach gelockert, ſo daß die Wurzeln nicht beſchädigt werden, und

dabei frische, nahrhafte Erde oder etwas Guano untergebracht, oder man giebt in Ermangelung dieser trocknen Dünger einen Düngerguß. Im Oktober setzt man einen passenden Kasten mit Fenstern darüber, lüftet anfangs sehr viel und nimmt bei schönem Wetter die Fenster ganz ab. Bei eintretender Kälte umgiebt man den Kasten mit einem 63 Centim. breiten Umsatz von Laub oder Mist, die Fenster werden gut verschlossen und während der Nacht mit Strohdecken und Brettern oder Läden gedeckt. Bei Tage deckt man ab und lüftet auch die Fenster, so oft es die Witterung erlaubt. Bei dieser Behandlung, wozu sich hauptsächlich die gewöhnliche Monatsrose, aber auch mehrere Sorten Remontanten, Bourbon-, Noisette- und Theerosen eignen, hat man zuweilen im Freien Rosen bis zu Weihnachten und länger. Haben die gewöhnlichen Rosen noch Knospen, so lassen sie sich, ohne sie zu beschneiden, auf diese Weise zum Aufblühen bringen. Dies gilt hauptsächlich von der Bengalrose Cramoisi supérieur, der Bourbonrose Souvenir de Malmaison, Mistress Bosanquet, der Theerose Gloire de Dijon, Safrano etc.

In der angegebenen Weise läßt sich auch der Flor in Töpfe gepflanzter Rosen verlängern und man genießt dabei noch den Vortheil, sie im Zimmer, welches jedoch nur mäßig erwärmt sein darf, hinter dem Fenster, noch besser zwischen den Doppelfenstern oder in einem Grünhause aufstellen zu können, um sich ihrer Blüthen zu erfreuen.

117. Ebenso kann man von Ende Januar an ein dazu eingerichtetes Rosenbeet antreiben. Dann muß aber der Umsatz von Mist warm und mindestens 90 Centim. breit sein und 63 Centim. tief in die Erde gehen, damit auch der Boden erwärmt werde, denn das Treiben oberhalb kann nicht vor sich gehen, wenn nicht zugleich die Wurzeln gereizt werden.

118. Um blühende Rosengruppen im Freien schon einige Wochen vor dem eigentlichen Rosenflor, also bis Mitte Mai zu haben, verfährt man auf folgende Weise: Man wähle hierzu solche Sorten, die nicht zu hoch wachsen und einen kurzen Schnitt ertragen. Solche sind außer der Centifolienrose mit ihren Spielarten, (besonders Moosrosen), verschiedene Remontanten, als du roi, Général Jacqueminot, Triomphe de l'exposition, Jules Margottin, Baronne Prévost etc., sowie auch die weiße Damascenerrose Madame Hardy und verschiedene Arten von R. gallica. Die Anpflanzung muß so eingerichtet werden, daß sich ein bretterner Kasten mit Fenstern darüber setzen läßt. Man pflanzt die dazu bestimmten Rosenarten nach der Größe in ein längliches Viereck, so daß die Rosen inwendig ungefähr 16 Centim. vom Kasten entfernt bleiben. Je nachdem es Sorten sind, die sich mehr oder

weniger ausbreiten, werden ſie 47—90 Centim. weit im Verbande gepflanzt, ſo daß in einem Kaſten von 3 Meter Länge und 1,50 Meter Breite Raum für 15 bis 30 Pflanzen iſt. Den Kaſten breiter als 1,80 Meter zu machen, iſt nicht rathſam. Die Höhe beträgt auf der Rückſeite 1 bis 1,25 Meter, auf der Vorderſeite gegen 63 Centim. Eine größere Höhe iſt unbequem und auf der Vorderſeite ſchädlich. Das Beet muß 63 Centim. tief rigolt und nöthigenfalls mit guter Erde verbeſſert werden. Die Pflanzung geſchieht im Herbſte. Man wählt dazu junge, kräftige, wurzelächte oder niedrig veredelte Pflanzen, beſchneidet ſie und gießt ſie nach dem Pflanzen an. Im Winter wird das Beet zum Schutze der Wurzeln mit Laub überdeckt. Wenn die Roſen gute Wurzeln und Ballen hatten oder vielleicht in Töpfen ſtanden, ſo kann ſchon im nächſten Frühjahre mit dem Treiben begonnen werden. Iſt das nicht der Fall, ſo kann es erſt im zweiten Frühjahre nach der Pflanzung geſchehen. — Das Beſchneiden geſchieht, bevor man mit dem Treiben beginnt. Zuerſt muß man ſuchen, die Roſen in die paſſende Höhe und Form zu bringen. Die Spitzen der Pflanzen müſſen von den Fenſtern 30 Centim. weit entfernt ſein, und, übereinſtimmend mit der Neigung der Fenſter, nach vorn ſanft abfallen.

Damit die Pflanzen ſich immer wieder verjüngen und nicht ſo hoch werden, muß das alte nicht mehr kräftige Holz ausgeſchnitten werden. Die am älteren Holze befindlichen Seitenzweige werden auf 2 bis 3 Augen zurückgeſchnitten. Die kräftigen, markigen Schößlinge werden nicht eingeſchnitten, weil ſie in Zukunft die ſchönſten Blüthenzweige bilden. Wenn ſie zu lang werden, ſo biege man ſie um, damit die Form der Gruppe nicht geſtört werde. Dieſes Verfahren iſt auch ſpäter mit den zu hoch werdenden Zweigen vorzunehmen, denn wollte man ſie ſo ſtark zurückſchneiden, als der Höhe wegen nöthig iſt, ſo würden die ſtärkſten Blüthenaugen verloren gehen. Die niedergebogenen Zweige werden ſpäter, wenn die Blüthen ſchwächer werden, ausgeſchnitten und durch andere erſetzt. Dieſes Verfahren bezweckt, daß ſich auch am untern Holze immer neue Augen und Triebe bilden. Bei R. gallica und holosericea befinden ſich die Blüthenaugen an dem oberen Theile der vorjährigen Triebe, und man würde vergeblich auf Blüthen hoffen, wenn man ſie wie die Centifolien und Remontanten ſchneiden wollte. Man darf bei dieſen Sorten nichts oder nur die Spitzen abſchneiden. Nur zur Bildung von neuen Holztrieben müſſen einige Zweige tiefer geſchnitten werden. — Soll nun mit dem Treiben begonnen werden, ſo entfernt man die Laubdecke von dem Beete und reinigt das Holz von etwa daran ſitzenden Schildläuſen, oder wäſcht behutſam, ſo daß keine Knospen und Stacheln ab-

gestoßen werden, mit einer nassen Bürste sämmtliche Zweige mit lauwarmem Seifenwasser, um die Eier der Insekten zu vertilgen. Hierauf wird die Oberfläche des Beetes aufgelockert, und, wenn es nöthig ist, gedüngt, jedoch nur mit nahrhafter Erde, indem frischer Dünger leicht nachtheilige Wirkungen hervorbringen kann. Nun wird der Kasten aufgesetzt, doch so, daß er nicht den Boden berührt, sondern auf Backsteinen steht. Der Kasten wird mit einem Umsatz von Laub und Nadeln, der 63 Centim. dick sein muß, bis zur Höhe des Kastens umgeben. Bloßes Laub unterhält schon Wärme genug; doch kann man auch etwas Pferdemist darunter mischen. Die Fenster werden mit Strohdecken und Läden bedeckt. — Um bis Mitte Mai blühende Rosengruppen zu haben, beginnt man das Treiben Mitte März. Wenn die Witterung günstig ist, wird sich der Umsatz in 4 bis 6 Tagen erwärmen und seine Wärme dem Kasten mittheilen. Die Decken und Läden werden bei Tage, — wenn es kalt ist, erst, wenn die Sonne auf den Kasten scheint, — abgenommen, und wenn durch die Sonne zu große Hitze im Kasten entstehen sollte, so werden die Fenster ein wenig gelüftet. Bei hellem Wetter werden die Pflanzen täglich Nachmittags, nachdem die Sonne davon weg ist, mit lauem Wasser bespritzt. Nach 14 Tagen fangen die Rosen an zu treiben. Man vermehrt nun bei mildem Wetter das Lüften und beschattet bei hellem Sonnenscheine die Fenster. Kalte Luft darf nicht unmittelbar eindringen. So oft man die schädlichen Wickelraupen gewahrt, müssen die Fenster bei milder Witterung abgenommen und die Raupen abgelesen werden. Jemehr die Rosen treiben, desto mehr muß bei mildem Wetter Luft gegeben werden. Mit dem Spritzen fährt man fort, bis sich die Knospen zu entfalten anfangen. Wenn die Blattläuse überhand nehmen, muß der Kasten mit Tabak geräuchert werden (s. im 5. Abschnitt). Die Blumenknospen zeigen sich gewöhnlich nach der vierten Woche, vom Anfang des Treibens an gerechnet, und färben sich nach der sechsten. Je weiter sie vorrücken, desto mehr gewöhne man sie durch starkes Luftgeben an die äußere Temperatur. In den wärmsten Stunden des Tages kann man in der letzten Zeit die Fenster ganz abnehmen. Gegen Mitte Mai müssen die Rosen so weit abgehärtet sein, daß sie die freie Luft vollkommen ertragen können. Das gänzliche Freimachen der Rosen geschieht erst, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Man wählt wo möglich einen trüben Tag zu dieser Arbeit. Der Kasten wird entfernt, das Beet aufgelockert, und der Platz gereinigt. Man richtet und bindet, wo es nöthig ist, die Zweige, besonders an den Seiten. Die Stelle, wo der Umsatz lag, wird entweder umgegraben und mit niedrigen Topfgewächsen, schön blühenden, niedrigen Sommergewächsen,

oder niedrigen Stauden bepflanzt, oder mit feinem Sande beſtreut, oder auch mit Raſen belegt.

119. Man kann auch mit dem Treiben der Roſen in dieſer Weiſe früher beginnen, wenn man will, ſchon von Mitte September an, und damit bis zum Mai fortfahren. Beſonders wichtig iſt dies für den Handelsgärtner, zu einer Zeit Roſen zum Abſchneiden zu haben, wo, namentlich in großen Städten, Geld damit zu verdienen iſt, oder wo man zu gewiſſen, feſtlichen Gelegenheiten viel Blumen vom Gärtner verlangt. Dann müſſen aber ſtärkere Umſätze von Pferdemiſt, oder denſelben mit dem dritten Theile Laub untermiſcht, die 63 Centimeter tief in die Erde gehen, anſtatt der bloßen Laub- oder Nadelumſätze angewendet werden, damit der ganze Boden erwärmt und auch mehr Widerſtand gegen eintretende ſtarke Kälte geleiſtet wird. Der gemiſchte Umſatz iſt vorzuziehen, die Erhitzung wird nicht ſo ſtark, hält aber länger und gleichmäßiger als reiner Pferdemiſt an. Dieſe Umſätze müſſen, wenn es nöthig iſt, in der Weiſe erneuert werden, wie es in §. 108 ſchon angegeben iſt.

120. Bei weitem bequemer hat man es allerdings und iſt auch eines guten Erfolges ſicherer, wenn man ein eigens dazu eingerichtetes Treibhaus hat, in welches man die Roſen, die man nur zum Abſchneiden benutzen will, in ein mit nahrhafter Erde gefülltes Beet pflanzt. Um in einer beſtimmten Reihenfolge, welche ſich auf den ganzen Winter vertheilen muß, antreiben zu können, iſt es am zweckmäßigſten, dieſes Haus in drei Abtheilungen zu theilen. Beginnt man z. B. mit dem Treiben der erſten Abtheilung Mitte September, ſo liefert dieſe vom November bis Januar Blumen, die um 4 bis 6 Wochen ſpäter mit Antreiben begonnene zweite Abtheilung vom Januar bis zum März und die im Januar angetriebene dritte Abtheilung vom März bis Ausgang April. Ein ſolches Beet iſt mit ſtarken Brettern oder noch beſſer mit Backſteinen einzufaſſen, muß womöglich dieſelbe Neigung beſitzen, wie die Fenſter, und 1 Meter unter denſelben liegen. Auf der niedrigen Seite des Hauſes befinden ſich die zum Erwärmen deſſelben nöthigen Heizröhren. Waſſerheizung verdient in jeder Beziehung den Vorzug; kann man dieſe nicht haben, ſo muß es natürlich ein guter Ziegel- oder Thonröhrenkanal auch thun, auf welchem jedoch Becken angebracht werden müſſen, in welche Waſſer zum Verdunſten gegoſſen werden kann, indem bei ſtarkem Heizen ſonſt leicht eine zu trockene Wärme entſteht.

Der Erfolg dieſer Treiberei iſt ebenfalls durch eine umſichtige Vorbereitung der Roſen bedingt. Man wählt hierzu am liebſten einjährige, auf Sämlinge der Hundsroſe (R. canina) niedrig veredelte Pflanzen, indem

diese meistens einen kräftigeren Wuchs zu entwickeln und reichlicher zu blühen pflegen, als wurzelächte. Man pflanzt sie ebenfalls im Spätherbste im freien Grunde des Treibhauses, entfernt die Fenster, bringt eine Schicht Laub über die Erde und läßt sie in voller Freiheit vegetiren, selbst bei Frostwetter, vorausgesetzt, daß man blos frostharte Sorten verwendet hat. Ist dies nicht der Fall, so müssen sie den erforderlichen Schutz erhalten, bis zu dem Augenblicke, wo das Treiben seinen Anfang nehmen soll. Zu Ende des Winters schneidet man 2 bis 3 der besten Triebe auf 2 bis 3 Augen und nimmt die übrigen dicht am Stamme weg. Während des Sommers sorgt man für eine anhaltende mäßige Feuchtigkeit und unterdrückt alle Blüthenknospen zu Gunsten der Vegetation, hütet sich aber, von dem Zweige etwas mit wegzunehmen. Ist die Zeit, wo sie angetrieben werden sollen, herangekommen, so muß man sie wiederum schneiden und zwar in der Absicht, eine Anzahl gut entwickelter Blüthen zu erhalten. Man sucht daher vor allen Dingen eine Anzahl gleichmäßig vom Lichte begünstigter schöner Triebe zu erzeugen und hat in diesem Betracht nur dafür zu sorgen, daß alle ihre gleich lang geschnittenen Zweige in gleicher Höhe stehen. Dies wird dadurch erreicht, daß die höheren bis zum Niveau der niedrigeren herabgebogen werden. Im übrigen führt man den Schnitt in derselben Weise und mit denselben Rücksichten aus, wie es beim Treiben in Töpfe gepflanzter Rosen (§. 106) bereits angegeben worden ist. Auf die Form kommt es hier weniger an, wenn die Zweige nur kräftig und sonst günstig gestellt sind. Außer den 6 bis 8 schönsten Zweigen, von welchen jeder 2 bis 3 Blüthenzweige entwickeln wird, schneidet man alles übrige Holz weg, sowie auch die schwachen Seitenäste. Die gebräuchlichsten und erfahrungsmäßig besten Rosen zu dieser Art Treibkultur sind ebenfalls die in §. 105 bezeichneten.

121. Beginnt man nun, nachdem die Rosen beschnitten, das Beet gereinigt und aufgelockert, und mit etwas nahrhafter Erde untermischt worden ist, mit dem Treiben selbst, so schließe man alle Fenster auf das sorgfältigste, etwa vorhandene Fugen verstopfe man mit Werg oder Moos oder verstreiche sie mit Kuhdünger, welcher mit Kälberhaaren untermischt ist, damit so wenig als möglich Wärme entweichen kann und das Auflegen von Strohdecken und Läden nur bei sehr starker Kälte und zwar nur während der Nacht zu geschehen braucht; denn das volle Licht ist unerläßlich, um vollkommene Blumen zu erhalten.

Gleich von vorn herein giebt man eine Temperatur von 15 bis 16° R. Heizwärme (durch die Sonne bewirkte Wärme kann auch 2 bis 3 Grad mehr sein), um das rasche Austreiben zu befördern. Sobald aber die Knospen

erſcheinen, vermindert man die Wärme, um die Vegetation nicht zu übereizen und um das Spindeln der Blüthenzweige zu verhüten. Man hält dann auf eine Temperatur von 12° R. Heizwärme bei Tage und läßt ſie bei Nacht um 2 bis 3 Grad herunter gehen. Das Spritzen iſt hier ebenfalls bis zur Zeit, wo ſich die Knospen entfalten, nicht zu verſäumen; auch ſind die Wege, beſonders in der Nähe der Heizung, ſtets feucht zu halten, damit niemals eine zu trockene Luft entſteht, wodurch ſich ſehr bald die rothe Spinne einzufinden pflegt. Auch muß bei ſtarkem Sonnenſcheine, beſonders wenn vorher längere Zeit trübes Wetter geweſen, leicht beſchattet und, wenn es zu heiß wird, etwas gelüftet werden. Erſcheinen mehrere Knospen auf einer Achſe, ſo ſind diejenigen, welche am wenigſten vollkommen zu ſein ſcheinen, zu entfernen, damit ſich die andern um ſo beſſer entwickeln können. Von den ſchwachen nicht blühenden Seitenäſten entfernt man nur diejenigen, welche eine unpaſſende Stellung haben. Die Wurzelausläufer ſind zu beſeitigen, ſobald ſie ſich zeigen. Das Begießen muß in der Weiſe geſchehen, daß die Erde eine ſtete mäßige Feuchtigkeit enthält; denn durch ein Uebermaß von Feuchtigkeit erkältet ſich die Erde und ein Fehlſchlagen der Blumen bleibt nicht aus. Blattwickler und Blattläuſe pflegen auch hier nicht auszubleiben. Erſtere muß man durch fleißiges Ableſen vertilgen, letztere durch Räuchern mit Tabak (ſ. im 5. Abſchnitt „Feinde der Roſen").

122. Nach beendetem Flore, und nachdem die Roſen durch allmählich geſteigerten Luftzutritt wieder an das Freie gewöhnt worden ſind, nimmt man, wenn kein Froſt mehr zu befürchten iſt, die Fenſter bis zum Beginne der neuen Treibperiode ganz weg, damit die Pflanzen dem Genuſſe der freien Luft ganz ausgeſetzt ſind. Von Zeit zu Zeit giebt man ihnen einen durchdringenden Düngerguß, damit ſie wieder hinlänglich gekräftigt werden, und vor Beginn des neuen Antreibens entfernt man die obere Erde vom Beete, ſo tief als es ohne Beſchädigung der Wurzeln geſchehen kann, und erſetzt ſie durch nahrhafte friſche.

Fünfter Abschnitt.

Feinde der Rosen und Mittel zu deren Abwehr und Vertilgung.

123. Wie eine Menge von Pflanzen, wildwachsende wie kultivirte, vielfach von Krankheiten befallen werden, so wird auch die Rose von Feinden heimgesucht, die durch ihre Wirkungen einen zerstörenden Einfluß auf ihre Vegetation ausüben. Diese Feinde gehören entweder dem Pflanzen- oder dem Thierreiche an. Was die ersteren anbetrifft, so entstehen sie theils durch eine fehlerhafte Behandlung, theils durch ungünstige Boden- und klimatische Verhältnisse, zum großen Theile aber sind sie kryptogamische Schmarotzer, die wir trotz aller Sorgfalt von unseren Lieblingen nicht fernhalten können.

Bei Rosen, welche entweder in Folge eines ungeeigneten Bodens oder eines zu wenig der Luft ausgesetzten Standortes, eines fehlerhaften Schnittes oder auch zu alter, unkräftiger Unterlagen aufhören zu wachsen, entsteht gewöhnlich der Brand, oder, was dasselbe ist, die Verhärtung der Rinde. Die nicht mehr sich ausdehnende Rinde wird rissig und verhärtet, so daß der Saft nicht mehr cirkuliren kann. Wird nicht sogleich beim Entstehen desselben durch Verpflanzen in andere Erde oder auf einen günstigeren Standort und durch Ausschneiden der brandigen Stellen mit einem scharfen Messer und Verstreichen derselben mit Baumwachs oder einer Salbe

von mit Lehm gemiſchtem Kuhmiſt dazu gethan, ſo geht der Stamm bald zu Grunde.

Der Krebs entſteht ſehr häufig auf Wildlingen, welche bei der Verpflanzung gelitten haben, ſowie auch an wurzelächten Roſen. Das beſte Mittel iſt, zeitig im Frühjahre die verhärtete und krebſige Rinde wegzuſchneiden und auf die Wunde ein Pflaſter aus Baumwachs oder aus Kuhmiſt und Lehm zu legen. Hat man den Krebs ſchon zu ſehr ſich ausbreiten laſſen, ſo iſt die Roſe nicht mehr zu retten.

Der Wurzelſchimmel, Mucor stolonifer, fuſiger breitet ſich mit ſeinen ſehr feinen weißen Mycelienfäden und Knospenſporen auf kranken, von Fäulniß ergriffenen Wurzelhäuten aus. Dieſer Krankheit iſt vorzubeugen, wenn man ſtarke Verwundungen der Wurzel ausſchneidet, mit Baumwachs verklebt, und nie friſchen Dünger mit den Wurzeln in Berührung bringt, damit etwaige Sporen des Pilzes in den faulenden Stoffen auf dieſelben nicht übertragen werden können. Bemerkt man den Pilz rechtzeitig, ſo muß die Pflanze ausgehoben, die Wurzel von allen zerſtörten Hautſchichten gereinigt, in einen wollenen, mit flüſſigem Lehm und Schwefelpulver getränkten Lappen geſchlagen, und die Roſe an einen andern Ort oder in ganz friſche Erde geſetzt werden.

Ueber die durch Paraſiten hervorgebrachten Pflanzenkrankheiten, von denen einige als verheerende, die menſchliche Oekonomie ſehr ſchädigende Epidemien eine traurige Berühmtheit erlangt haben, — man denke an die durch den Schimmelpilz Peronospora infestans herbeigeführte Kartoffelkrankheit, an die durch Xenodochus ligniperda bewirkte Rothfäule des Kernholzes lebender Fichten und Eichen, an den durch Ustilago carbo erzeugten Flug- oder Rußbrand bei Hafer und Gerſte, an den Weizenroſt, Puccinia straminis, der in manchen Jahren die Weizenernte durch Verſchrumpfen der Körner ſehr beeinträchtigt hat, an den Brandpilz, Tilletia Caries, der den Schmierbrand beim Weizen bewirkt, an Erysiphe communis, den gefährlichen Schmarotzer, der insbeſondere Erbſen, Wicken, Linſen, Puffbohnen, Luzerne, Klee, Gurken, Kürbiſſe und Melonen, den Flachs und die Kardendiſtel heimſucht und den ſogenannten Mehlthau erzeugt, den Unkundige als aus der Luft herabgefallen meinen, an den dem Mehlthau verwandten berüchtigten Traubenpilz, Erysiphe Tuckeri (Oidium Tuckeri), an den Mutterkornpilz, Claviceps purpurea — über ſie iſt viel geſchrieben und probirt worden, die Urſachen zu ermitteln und Heilung oder Minderung des Schadens zu bringen.

Allein erst in neuester Zeit ist es den sorgfältigen mikroskopischen Untersuchungen und Beobachtungen eines Willkomm, die Wunder des Mikroskops, de Bary, Morphologie und Physiologie der Pilze, und Oersted, System der Pilze, aus dem Dänischen von Griesebach und Reinke, gelungen, einige Klarheit und Sicherheit über die interessante Entwickelung vieler Pflanzenparasiten und die durch sie hervorgebrachten Krankheiten zu erlangen und Heilungs- und Verhütungsmethoden vorzuschlagen.

Durch ihre Experimente ist nachgewiesen, daß

1) jede Art Schmarotzerpilze eine oder eine Anzahl ganz bestimmter, in gewissem Grade gesunder Nährpflanzen bewohnt, aus deren Stoffen sie leben. Stirbt der befallene Pflanzentheil ab, oder wird er zersetzt, so geht auch der Parasit zu Grunde.
2) Die Annahme ist also unrichtig, der Vegetation der Schmarotzerpilze geht eine Erkrankung und Zersetzung der Pflanzentheile voraus.
3) Gleich andern Organismen entstehen die Schmarotzerpilze nur aus ihren Keimen, die in die Nährpflanze eindringen, oder sich auf derselben befestigen und sich dann weiter entwickeln; mithin ist die Annahme zurückgewiesen, die parasitischen Pilze entstünden ohne eigene Keime aus den veränderten Säften und Organen des Wirthes.
4) Indem ein Schmarotzer die gesunden Pflanzenorgane befällt und von denselben lebt, ruft er eine krankhafte Veränderung hervor; er ist also Krankheitserreger, nächste Krankheitsursache.
5) Jeder Parasit erzeugt eine bestimmte specifische Krankheit, auf die aber äußere Einflüsse, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Bodenbeschaffenheit ꝛc. einen fördernden oder hemmenden Einfluß ausüben.
6) Da sich der Schmarotzer durch seine Keime fortpflanzt und auf gesunde Pflanzen übersiedelt, so sind die durch ihn bewirkten Krankheiten ansteckend. Die Ansteckung wird durch die Keime vollbracht, sobald die Bedingungen zur Entwickelung derselben gegeben sind. Sie ist in der Regel durch die große Fruchtbarkeit der Schmarotzerpilze in hohem Grade erleichtert.
7) Heilung und Verhütung der Pilzkrankheiten wird durch Zerstörung und Fernhaltung der Parasiten erreicht werden, was je nach dem einzelnen Falle auf verschiedene Weise angestrebt, aber meistens wegen der Kleinheit und großen Fruchtbarkeit der Schmarotzerpilze nur sehr schwer durchgeführt werden kann.

Die Pilze, von denen die Rosen parasitisch heimgesucht werden, sind theils Rost- (Uredineae), theils Mehlthaupilze (Erysiphei). Das Lager

(Thallus) beſteht bei dieſen Thallophyten aus einzelnen oder mehreren ſpinnewebartig verbundenen Zellenfäden oder auch feſteren, wurzelähnlichen Faſern (Hyphen), die vielfach nur an der Spitze wachſen und ſich verzweigen. Die Zellenfäden beſtehen entweder aus einer einzigen, langgeſtreckten Zelle, oder aus linienförmig verbundenen Zellen, die aus dem lebenden Organismus ihre Nahrung ziehen.

Das männliche Befruchtungsorgan iſt eine Zelle von verſchiedener Form (Antheridium), aus deren Plasma ein oder mehrere befruchtende ovale Zellen (Spermatozoïdia) hervorgehen, die in der Regel mit einer oder mehreren Wimpern verſehen ſind, durch deren Schwingungen ſie ſich bewegen. Das weibliche Befruchtungsorgan iſt ebenfalls eine Zelle von verſchiedener Form (Oogonium). Aus dem Plasma derſelben entſtehen eine oder mehrere Eizellen und aus dieſen nach der Befruchtung die Sporen (Oosporae). Dieſe werden entweder im Innern der Mutterzelle gebildet oder von ihr abgeſchnürt. Das Organ, welches die einzelligen Sporen einhüllt oder trägt, bildet mit dieſen zuſammen den Sporenbehälter (Sporocarpium). Bei den Uredineen bilden ſich zuerſt hohle, an der Spitze mit einer Oeffnung verſehene Körperchen (Spermogonien), die dem unbewaffneten Auge als kleine, röthliche Flecken auf der Blattoberfläche an den Stellen erſcheinen, wo ſpäter die Sporocarpien hervortreten. Bei gewiſſen Thallophyten wird die Befruchtung durch Kopulation, Zuſammenwachſen und Anaſtomoſe von zwei Zellen vermittelt. Die Fortpflanzungsſyſteme ſind entweder einfache Zellen (Gonidien, Conidien, ſchwärmende, d. h. bewimperte Knospenſporen), oder Zellengruppen (Macroconidien, Soredien). Der bei der Keimung der Sporen aus fadenförmigen Zellen oder Zellenreihen gebildete Keimfaden heißt Mycelium.

Das Mycelium der Roſtpilze (Uredineae) drängt ſich entweder durch die Spaltöffnungen, jene kleinen ovalen, an beiden Enden zugeſpitzten Oeffnungen in der Oberhaut der Blätter und Stengel, wodurch die Pflanzen ausdünſten und Luft einnehmen, und die dadurch entſtehen, daß je zwei kleinere halbmondförmige Zellen, die ſich beliebig zuſammenziehen und ausdehnen können, ihre concaven Ränder einander zukehren, oder es bohrt ſich durch die Oberhaut in das Gewebe der geſunden Mutterpflanze. Nun breitet es ſich in demſelben aus, bis zuletzt der entwickelte Pilz durch die Oberhaut hervorbricht, und der Wind die Sporen zum Verderben unſerer Kulturpflanzen hinwegführt.

Bei der Bildung der Sporen zeigen ſich in den fadenförmigen Zellen zuerſt Zellkerne, zwiſchen die ſpäter ſich Querwände ſchieben, wodurch die

Mutterzelle in mehrere kleine Zellen getheilt wird, die in Kugelgestalt sich abschnüren.

Bei der Bildung der Rostpilze wird die Oberhaut blasenförmig aufgetrieben und gesprengt, wodurch in der Regel meist gelbe oder braune, unregelmäßig zusammenfließende Flecken zum Vorscheine kommen.

Hierbei findet in der Regel ein Generationswechsel statt. Die erste Generation hat zwei Arten von vegetativen Vermehrungsorganen: Sommersporen, die einzellig, ei- oder kugelförmig sind, 3 — 6 Keimlöcher haben und kurze Zeit nach ihrer Bildung zur Keimung gelangen, und Wintersporen, in der Regel zwei- oder mehrzellig, die nur ein Keimloch besitzen und gewöhnlich erst im folgenden Frühlinge mit einem regelmäßig gebildeten Mycelium keimen, das Knospensporen bildet, die sich abschnüren und im Winde fortgetragen werden.

Die Sommersporen suchen bei der Keimung immer die Spaltöffnungen auf, während die keimenden Knospensporen dagegen die Oberhaut durchbohren. Die zweizelligen Wintersporen von Phragmidium rosae (Phr. mucronatum) zeigen sich als dunkelbraunes oder schwarzes Pulver oder als solche Flecken am Stengel oder an den Blättern. Sie bestehen aus 3 — 4 zu einer Kette verbundenen Zellen, deren jede 3 bis 4 Keimlöcher hat. Aus ihnen dringen die Keimfäden in das Gewebe der Rosenblätter. Die Rostpilze zerstören die einzelnen Pflanzen, die sie angreifen, nicht in dem gleichen Grade, wie die Brandpilze; aber sie sind dessenungeachtet in weit höherem Maße schädlich, weil sie, mit schnell gebildeten und alsbald keimenden Sommersporen ausgestattet, epidemisch auftreten.

Um ihrem verheerenden Einflusse entgegen zu wirken, empfiehlt es sich, die Pflanzen, resp. Pflanzentheile zu entfernen, wo der Rost zuerst sich zeigt, um die Ausbreitung desselben durch die Sommersporen zu verhindern.

Parasitische Rosenfeinde sind auch Podosphaera pannosa und Erysiphe leucoconium, zwei zu den Schlauchpilzen (Ascomycetes) gehörige Mehlthaupilze.

Das spinnwebartige Mycelium bildet einen weißlichen Ueberzug auf den Blättern und Stengeln der Mutterpflanze, ohne in deren Gewebe einzudringen.

Aus dem netzartigen Gewebe des Myceliums wachsen bald zahlreiche keulenförmige, mit einem krümlichen Schleime erfüllte Schläuche, die sich rasch in Reihen kugeliger Zellen verwandeln. Letztere, sogenannte Conidien, vermögen sofort zu keimen und neue Mycelien zu bilden, weshalb die Ver-

mehrung der Mehlthaupilze bei feuchtwarmer Witterung ins Unglaubliche geht. Gegen das Ende der Vegetationsperiode bilden sich auch Sporenkapseln (Perithecien). Diese sind das Produkt einer geschlechtlichen Zeugung.

An der Kreuzungsstelle zweier Mycelienfäden bilden sich Anschwellungen, jeder treibt eine kurze, aufrechte Ausackung. Die vom untern Faden entsprungene, sich oval gestaltende, wird zur Eizelle (Oogonium); die aus dem obern Faden hervorgewachsene, kleiner bleibende, mehr walzenförmige, legt sich an erstere an und befruchtet dieselbe hierdurch, weshalb sie als männliches Organ (Antheridie) betrachtet werden muß. Es wachsen nun unterhalb der befruchteten Eizelle aus deren Tragfäden 8 bis 9 stumpfe Schläuche hervor, welche, fest an einander geschmiegt, die Eizelle überwachsen, über deren Scheitel zusammenstoßen und sich durch Quertheilung in Reihen von Zellen verwandeln. Auf diese Weise entsteht die äußere zellige Wandung des Peritheciums. Die Eizelle wird mittlerweile größer, bildet im Centrum eine neue Zelle und in deren Umgebung eine Anzahl kleinerer, welche zur inneren Wandung der Sporenkapseln werden. Die centrale Zelle dehnt sich hierauf entweder unmittelbar zu einem einzigen Sporenschlauche aus, oder erzeugt durch Theilung mehrere Sporenschläuche, welche sich blasig gestalten und meist 8 längliche, einzellige, farblose, in zähen Schleim eingebettete Sporen enthalten. Die äußere Perithecienwand treibt gewöhnlich haarförmige Auswüchse und färbt sich braun; deshalb erscheinen die mehlartigen Ueberzüge auf der Oberfläche der befallenen Pflanzen nach der Ausbildung der Sporenfrüchte wie mit schwarzen Punkten oder Knötchen besäet.

Endlich platzt die Peritheciumwandung und die Sporenschläuche quellen aus dem Risse hervor, worauf sie die Sporen entlassen.

Letztere überwintern und erzeugen im nächsten Frühlinge auf saftigen Pflanzentheilen neue Mycelien.

Mittelst einzelner warzenartiger Auswüchse befestigen sich die gegliederten und verzweigten Mycelienfäden auf der Oberhaut, beeinträchtigen durch Verschließung der Spaltöffnungen die Ernährung der Mutterpflanze, zerstören die Gewebe und versetzen die Pflanze in einen kränkelnden Zustand, wobei ihnen wahrscheinlich jene Warzen gleichzeitig als Saugorgane dienen, durch welche die Säfte aus der Nährpflanze gesogen werden, so daß die Zweige sich krümmen, die Blätter sich kräuseln und verdicken und die Knospen verkümmern.

Als Mittel gegen diese Krankheit hat sich der Schwefel bewährt. Wenn es geregnet hat, oder nachdem die Pflanzen mit Wasser bespritzt worden sind, werden sie durch eine Art Blasebalg mit Schwefelmehl bestäubt. Die-

ses scheint den Mehlthaupilz zu zerstören oder wenigstens die Ausbreitung desselben zu hindern. Am besten thut man aber, die befallenen Theile abzuschneiden und zu verbrennen.

Zu den Rosenfeinden aus dem Thierreiche gehören nach „Taschenberg's Entomologie für Gärtner und Gartenfreunde" und „Leunis, Synopsis der Naturgeschichte des Thier- und Pflanzenreichs":

1) Der Maikäfer, Melolōntha vulgāris, der als Larve die Wurzeln benagt und als Käfer das Laub der Rosen befällt. Da er hinreichend bekannt ist, verzichten wir auf seine Beschreibung. Wer sich indessen über seine Lebensweise und die empfohlenen Mittel zu seiner Vertilgung genauer informiren möchte, der sei auf Taschenberg's vorzügliches Werk S. 28 bis 37 verwiesen.

2) Der Garten-Laubkäfer, kleine Rosenkäfer, Melolōntha (Phyllopērtha) horticŏla.

Dieser kleine, 9 — 10 Millim. lange, und 5,15 Millim. breite Käfer ist etwas flach, grau behaart, bläulich grün, auf den Flügeldecken röthlich braun und fein punktirt gestreift. An der äußeren Lade des Unterkiefers stehen 6 Zähne, oben 1, dann 2 und unten 3. Das getrennte Kopfschild ist von einer zarten, vorn geraden Randleiste umgeben. Das Halsschild paßt genau an die Wurzel der Flügeldecken und verengt sich nach vorn. An den schwarzen Vorderbeinen hat er am Außenrande zweizähnige Tarsen und Doppelspitzen an den größeren Klauen. Im Mai und Juni erscheint er in den Gärten und verursacht durch seine Gefräßigkeit nicht unerheblichen Schaden, indem er die zarten Blumenblätter und Staubgefäße wegfrißt und der Samenerzeugung nachtheilig wird. Er muß, wie die drei folgenden, abgesucht oder an trüben Tagen in einen untergehaltenen Schirm abgeschüttelt und vertilgt werden.

3) Der gemeine Rosenkäfer, Goldkäfer, Cetonĭa aurāta.

Dieser am Kopfschilde ausgerandete, goldgrüne, oft kupferroth glänzende, unten langhaarige, auf den Flügeldecken mit zwei erhabenen Linien und kreideweißen Härchen besetzte und durch einen gedrungenen, fast kugeligen Höcker an der Vorderseite des Brustbeins ausgezeichnete Laubkäfer besucht vom Juni bis September mitunter sehr zahlreich die Rosen und leckt nicht blos den Honig, sondern befrißt wie der vorige, auch Blumenblätter und Staubgefäße.

4) Als verdächtig erscheint der mausefarbige Springkäfer, Lacon (Eläter) murīnus, indem dessen drahtförmige, festbepanzerte, sechsbeinige Larve die Knospenstengel dicht unter der Blumenknospe abnagen soll.

Er iſt bräunlich-ſchwarz und mit weiß- und hellbräunlich-gewölkten Haaren bedeckt. Die Stirn iſt durch eine ſcharfe Kante begrenzt; nahe am Vorderrande der Augen ſind die elfgliedrigen Fühler eingelenkt. Das Halsſchild, mit einer Rinne zur Aufnahme der Fühler verſehen, iſt hinten in einen Dorn ausgezogen, der in eine Aushöhlung im Vorderrande der Mittelbruſt paßt, wodurch der Käfer mit knipſendem Geräuſche ſich in die Höhe ſchnellen kann.

5) Gleichfalls verdächtig iſt der Pflaumen-Rüſſelkäfer, Magdälis pruni, der die Haut der jungen Roſenblätter abnagen und als fußloſe Larve dicht unter der Rinde der Stämmchen geſchlängelte Gänge arbeiten ſoll.

Der Käfer iſt 3 bis 6,5 Millim. lang, ſchwarz, der Rüſſel kurz, gerade, von der Länge des Kopfes. Die elf- bis zwölfgliedrigen, keulenförmigen, am Grunde roſtrothen Fühler ſind nahe an der Rüſſelmitte eingefügt, das Halsſchild beiderſeits mit einem Höcker verſehen, gekörnelt, gegen das ovale Schildchen zu erweitert. Die Flügeldecken ſind länglich, an der Spitze abgerundet, gekerbt, geſtreift, die Zwiſchenräume fein gerunzelt und kaum merklich gekörnelt, die Hinterſchenkel ſtark verdickt.

6) Die Roſen-Bürſthornweſpe, Hylotöma rosae, *L.*

Sie hat eine Länge von 8 bis 10 Millim. und eine Flügelſpannung von 17 bis 20 Millim. An dem ſchwarzen Kopfe ſitzen die dreigliedrigen Fühler, deren letztes Glied ſehr lang, verdickt, und bei dem kleineren Männchen auf der Unterſeite bürſtenförmig mit dichten Borſtenhaaren beſetzt iſt. Rücken und Bruſt des Mittelleibes, die Wurzel der Beine, die Spitze der Schienen, die Ringe an den Fußgliedern, ſowie der Vorderrand der Flügel mit dem Male (stigma) ſind ſchwarz, während das Thier an den übrigen Theilen gelb iſt. Die gelben Vorderflügel haben eine Rand- und vier Unterrandzellen und eine in der Mitte zuſammengezogene lanzettförmige Zelle. An den Schienen der Hinterbeine kommt außer den Enddornen je noch einer an der Seite und höher oben vor. Ihre Larve, die in zwei Generationen jedes Jahr die Roſen heimſucht, iſt 19 Millim. lang, bläulich-grün und längs des Rückens mit gelben, zuweilen hell orangegelben Flecken geziert.

Ihr glänzend ſchwarzbrauner Kopf iſt kurz behaart, nach jeder der vier Häutungen aber braungelb und trägt auf der Stirn 2 durch einen nach oben gewölbten Halbkreis verbundene ſchwarze Flecken. Auf jedem Gliede, mit Ausnahme der beiden letzten, ſtehen in Längsreihen 6 Paar glänzendſchwarze, verſchieden große, aber je mit einem Borſtenhaare verſehene Warzen, die nach jeder Häutung als große braune Blaſen mit vielen ſchwarzen Pünktchen erſcheinen. Dieſe Reihen werden ſeitwärts noch durch eine ſchwarze

Linie und eine Punktreihe begrenzt, indem auf jedem Körperringe noch ein größerer, schwarzglänzender Fleck mit mehreren Borsten und ein kleinerer zu sehen ist.

Im Mai entschlüpft die Wespe dem in der Erde überwinterten doppelten Cocon, und das befruchtete Weibchen legt in den Morgen- und Abendstunden in die Oberhaut junger Rosentriebe oft 8 — 15 Eier neben einander und verstreicht die Wunde mittels des Legbohrers mit einem klebrigen Schleime. In Folge dieser Verwundung krümmen sich die zarten Zweige und werden schwarz. Nach 8 — 10 Tagen kriechen die achtzehnfüßigen Larven aus und benagen die Rosenblätter vom Rande aus bis auf die stärksten Rippen. Stört man sie in diesem Geschäfte, so umklammern sie mit den 6 Brustfüßen den Blattrand, heben den Hinterleib Sförmig in die Höhe und schlagen taktmäßig damit auf und nieder. Ende Juli verpuppen sie sich, und schon im August erscheinen die Wespen, deren Larven im September und Oktober die Rosenstöcke heimsuchen, und dann als Puppen in doppelhäutigem Cocon bis zum Mai des nächsten Jahres in der Erde ruhen.

Obgleich diese Larven sehr häufig von Schlupfwespen (Eulóphus hylotomārum Bouché, migrātor und incubātor) angestochen werden, so ist es doch nöthig, die Rosenstöcke öfter zu schütteln und die abgefallenen Afterraupen zu tödten.

7) Weniger schädlich, weil seltener, ist die Larve der halbschwarzen Bürstenhornwespe, Hylotŏma pagana *Panzer*, die der vorigen sehr ähnlich ist und höchstens im Spätsommer die Rosenblätter befällt.

8) Die gelbe Rosenblatt-Blattwespe, Tenthrēdo (Athalĭa) rosae, *L.*, und die Rüben-Blattwespe, Tenthrēdo (Athalĭa) spinārum, die einander sehr ähnlich sind, legen zuweilen ihre Eier auch an die Mittelrippe der Rosenblätter.

Erstere ist 6 Millim. lang, dottergelb, Gesicht lichter, Rückseite der keulenförmigen Fühler, Hinterkopf, Rücken des Mittelleibes, Spitzen der Schienen und Tarsenglieder aber glänzend schwarz. Der Vorderflügel hat 2 Rand- und 4 Unterrandzellen, die lanzettförmige Zelle eine schräge Querader und der Hinterflügel 2 Mittelzellen. Die 22füßige Larve hat einen rothen Kopf, ist auf dem Rücken dunkelgrün, an den Seiten und am Bauche heller und nagt die Blätter bis auf die Unterhaut ab, daß sie durchsichtig wie Gaze werden.

9) Ebenso selten lebt die Larve der verkannten Blattwespe, Tenthrēdo (Blennocampa) aethiops *Fabricius*, auf den Rosen.

Die cylindrische, bleichgrüne Raupe mit dunkler Rückenlinie und hellorangefarbigem Kopfe versehen, der jederseits zwei schwarze Fleckchen trägt, liegt gern neben der Mittelrippe des Blattes ausgestreckt und zerstört nach Art der vorigen Oberhaut und Fleisch der Blätter.

10) Die kleinste Rosen-Blattwespe, Tenthrēdo (Athalïa, Blennocampa) pusilla *Klug*.

Diese kleine, 3,5 Millim. lange und bei ausgespannten Flügeln 9 Millim. breite Blattwespe ist schwarz, glänzend, Mal, Geäder und Schüppchen der Flügel rothbraun, die Beine von den Knieen abwärts aber schmutzig weiß. Die neungliedrigen Fühler sind kurz, fadenförmig; das dritte Glied ist bedeutend länger als das vierte. Die Flügel haben 2 Rand-, 4 Unterrandzellen (Cubitalzellen), sowie eine gestielte, lanzettförmige Zelle am Innenrande.

Das Weibchen legt Ende Mai seine Eier an die Ränder der Rosenblätter, wodurch diese von beiden Seiten bis zur Mittelrippe nach unten sich umrollen. In dieser Höhlung lebt die walzige, runzelige, in der Jugend weißliche, später hellgrüne, mit borstigen Warzen besetzte, 7 Millim. lange Larve und verzehrt alles Blattfleisch. Im Juni geht sie zur Verpuppung in die Erde und verbleibt meistens daselbst bis zum nächsten Frühjahre. Nur wenige kriechen im Laufe des Sommers noch aus.

Gegen diese Larven läßt sich weiter nichts thun, als die befallenen Blätter mit den Raupen zu vernichten.

11) Der vorigen ähnlich (nur etwas größer, 6,5 Millim. lang, Flügelspannung 14 Millim.) ist die bohrende Rosen-Blattwespe, Tenthrēdo (Monophadnus) bipunctata *Klug*, von ihr aber zu unterscheiden durch eine Mittelzelle im Hinterflügel, tief eingestochene Punkte am hintern Augenrande, weißen Halskragenrand, weiße Fühlerschüppchen, bräunlich weiße Knie, Schienen und Vorderfüße und silbergrauen Rand der Bauchglieder.

Im Mai, oft schon im April schlüpft die Wespe aus, und die Weibchen legen ihre Eier einzeln in die Spitzen der jungen Triebe.

Die ausschlüpfende, wurmartige, fleischfarbene Raupe hat einen dunkleren Mund mit 2 schwarzen Augen-Pünktchen und 22 Füße und bohrt sich sofort, oft bis 4 Centim. tief, in das Mark, wodurch die jungen Triebe verwelken. Hat sie ihre vollkommene Größe erreicht, so bohrt sie sich nahe der Triebspitze durch ein rundes Seitenloch wieder heraus, um sich in der Erde einzuspinnen.

Bemerkt man diese Wespen, so muß man die Rosenstöcke am frühen Morgen oder an rauhen Tagen in einen untergehaltenen Schirm abklopfen, tödten, und alle welkenden jungen Triebe 5 Centim. lang abschneiden, und mit der darin sitzenden Larve zertreten oder verbrennen.

12) Die wickelnde Blattwespe, Tenthrēdo (Hoplocampa) brevis Klug, hat eine Länge von 5 Millim. und eine Flügelspannung von 11 Millim., kurze, fadenförmige, neungliedrige Fühler, in den Vorderflügeln ebenfalls 2 Rand-, 4 Unterrandzellen und 1 zusammengezogene lanzettförmige Zelle und 2 Mittelzellen im Hinterflügel. Die Körperfarbe ist bräunlich rostfarben, Rücken des Mittelleibes schwarz gefleckt, der des Hinterleibes vollständig schwarz, die Flügel wasserhell, Flügelschüppchen, Mal und Geäder bleich rostfarben.

Ihre braunköpfige, grüne, mit Gabeldornen auf großen und kleinen schwarzen Warzen besetzte Raupe lebt im Mai und Juni nach Art der Tenthrēdo pusilla auf Rosenblättern.

13) Die weißgegürtelte Rosen-Sägewespe, Emphytus cinctus *L.*

Ihre Körperlänge beträgt 9,5 Millim. und ihre Flügelspannung 16 Millim. Der Körper ist glänzend schwarz, die borstenförmigen Fühler sind neungliedrig, das dritte und vierte Glied von gleicher Länge. Die Beine von den Schienen an abwärts sind gelblich roth, die hintersten, zuweilen auch die mittleren an dem Verbindungsgliede zwischen Hüfte und Schenkel (an den Schenkelringen) weiß. Die Adern der Flügel sind braun, der Vorderrand der Vorderflügel röthlich, das Stigma an seiner Wurzel weiß. Unter ihm liegen 2 Rand- und 3 Unterrandzellen. In der lanzettförmigen Zelle ist eine schräge Querader vorhanden; Mittelzelle im Hinterflügel fehlt.

Die Larve derselben ist 14 Millim. lang, hat 22 Füße, ist vorn dicker als hinten, querrunzelig und durch Andeutungen weißer Dornwärzchen rauh. Der Kopf ist gelbbraun, hat grobe Punkt-Eindrücke, einen dunkelbraunen Scheitelfleck, dunkelbraune Kinnbacken und tiefschwarzbraune Augenflecken. Der Rücken ist dunkelgrün, an den Seiten und unten graugrün, begrenzt durch einen dunkeln Längswisch auf jedem Gliede.

Die Larven erscheinen vom Juni ab auf der Rückseite der Rosenblätter, fressen Löcher in dieselben oder verzehren sie auch von den Rändern her. Im September und Oktober verspinnen sie sich in einen eiförmigen Cocon aus weißer Seide entweder in dem Marke der abgestutzten Rosenzweige, oder in den Spitzen des alten Holzes, oder überwintern unter dem abge-

fallenen Laube. Im Frühjahre verpuppen sie sich und erscheinen einige Wochen darauf als Wespen.

Um die Larven zu vernichten, empfiehlt es sich, sie von den Stöcken abzuschütteln, das abgefallene Laub im Herbste einzusammeln und sammt dem von der Larve bewohnten trockenen Holze zu verbrennen.

14) Ein anderer Feind der Rosenblätter ist die Larve der schwarzen Rosen-Blattwespe, Cladius diformis Panzer.

Sie ist 11 Millim. lang, hat 20 Füße, einen bräunlichen, fast herzförmigen Kopf mit dunklem Scheitelflecke und glänzend schwarze Seitenflecken in der Augengegend. Die Grundfarbe des Körpers ist hellgrün, im Alter perlgrau, mit bräunlichen, später weißlichen Haaren auf erhabenen Punkten. Jederseits des röthlichen Rückengefäßes zieht sich eine dunkle Längslinie entlang; doch kommt diese Larve nicht so häufig vor.

15) Ebenso sporadisch erscheint die Larve der Rosen-Gespinnstwespe, Lyda inanita de Vill.

Sie ist gelbgrün, seitwärt roth liniirt, am ersten Gliede jederseits mit einem schwarzen Flecken versehen und lebt im Juni in einem röhrenförmigen, aus Rosenblattstückchen spiralförmig zusammengesetzten Sacke. Im Juli verläßt sie ihre zuweilen gegen 5 Centim. lange Wohnung und spinnt sich in der Erde ein, um Ende April als Wespe zu erscheinen.

16) Die Rosengallwespe, Rhodites rosae *L.*, fügt den veredelten Rosen wohl wenig Schaden zu, indem sie nur die Hundsrose ansticht und dadurch die bekannten Rosenkönige oder Bedeguare hervorruft.

17) Das Weibchen des Ringel-, Weißbuchen-, oder Zwetschenspinners, Bombyx (Gastropăcha) neustria, sucht im Juli bei seinem Brutgeschäft auch die Rosenstöcke auf, um seine Eier ringförmig um die Zweige zu kitten. Bei den ersten wärmenden Strahlen der Frühlingssonne schlüpfen die schwarzen, lang hellbraun behaarten Räupchen aus, um fortan Knospen und Blätter nicht zur Entwickelung kommen zu lassen. Nach der zweiten Häutung ist der Kopf graublau und mit 2 schwarzen Punkten versehen. Ueber den schlanken, blaugrauen, mit weichen Haaren zerstreut besetzten Leib läuft eine weißgraue Rückenlinie und jederseits derselben 3 rothgelbe, bunt eingefaßte und etwas geschlängelte Längslinien. Die Raupen bleiben bis kurz vor der Verpuppung im Juni familiär zusammen und ziehen gemeinschaftlich zum Fraße aus. Nach erfolgter Sättigung ziehen sie sich an eine Astgabel oder an das Ende des Stammes zurück und schnellen im Sonnenscheine behaglich mit dem Vorderkörper hin und her.

Feinde derselben sind außer den Finken und Sperlingen etliche Raubfliegen, Schlupfwespen und zwei Laubkäfer, deren Namen bei Taschenberg, Seite 217, zu lesen sind.

Da die Eier frostbeständig sind, so entferne man im Herbste beim Beschneiden entweder die steinharten Spiegel, oder im Frühjahre die Raupengesellschaften.

18) Der Schwammspinner, Dickkopf, Rosenspinner, Bombyx (Lipäris) dispar, legt im Juli und August seine 300 bis 500 kugelrunden, bräunlichen und glänzenden Eierchen auch an die Rosenstämmchen und bettet sie in größeren oder kleineren Häufchen in die braunen Haare seiner Hinterleibsspitze, so daß sie wie ein Stück Feuerschwamm aussehen. Im nächsten Frühlinge schlüpfen die Raupen aus, bleiben eine kurze Zeit noch auf dem Schwammlager, zerstreuen sich aber bald auf den Zweigen und nähren sich von Blättern und Knospen. Bei anhaltendem Regenwetter flüchten sie sich in die Astgabeln und auf die Unterseite der größeren Aeste.

Eine ausgewachsene Raupe ist 50 Millim. lang, hat 16 Füße, einen dicken, gelblich grauen, mit 2 braunen Flecken versehenen Kopf und einen schwarzgrauen, heller gesprenkelten Rücken, über welchen 3 gelbliche Längslinien ziehen.

Auf den ersten 5 Körperringen stehen jederseits 2 blaue, auf den 6 folgenden je 2 rothe, mit steifen und langen Haaren besetzte Warzen.

Wegen dieser Bedeckung sind diese Raupen vor den insektenfressenden Vögeln ziemlich sicher; desto mehr stellen ihnen viele von Taschenberg, Seite 221, genannte Fliegen und Schlupfwespen nach. Um die Pflanzen vor ihren Verwüstungen zu schützen, kratze man die Eierschwämme im Spätherbste von dem Stämmchen sorgsam ab und übergebe sie dem Feuer.

19) Der Goldafter, Weißdornspinner, Bombyx (Porthesia, Lipäris) chrysorrhoea, legt seine kleinen rostgelben, oft bis 275 Eier enthaltenden Schwämme in Gestalt einer länglich runden Wulst auch an die Rosen und zwar auf die Unterseite der Blätter. Die jungen Räupchen sind grünlich gelb, haben schwarzen Kopf und Nacken und längs des Rückens 4 Reihen schwärzlicher Punkte. Später ist die Grundfarbe grauschwarz, roth geadert und gelbbraun behaart. Diese Haare stehen in Büscheln auf Warzen, die vom fünften Körperringe an acht Querreihen bilden. Zwischen dem dritten und vierten Haarbüschel, von unten gezählt, findet sich auf jedem Gliede ein schneeweißer, haariger Längsflecken, die in ihrer Gesammtheit eine unterbrochene Linie darstellen. Die beiden mittelsten Warzen sind roth und bilden in ihrem Verlaufe zwei rothe Längslinien über den Rücken;

auf dem neunten und zehnten Gliede steht zwischen ihnen noch ein ziegelrother Fleischzapfen.

Sie überwintern in sogenannten großen Raupennestern, die sie aus mehreren, oberseits abgenagten, durch zahlreiche Fäden umwickelten, inwendig seidenartig ausgefütterten und an den Zweigen befestigten Blättern bilden. Anfangs April erwachen sie aus ihrer Erstarrung, fressen die Knospen aus und sammeln sich vorzugsweise an den der Sonne zugekehrten Zweigen.

Nach der dritten Häutung im Mai verlassen sie das Nest, zerstreuen sich und verlassen sogar den Baum ihrer Geburt. Ende Juni erfolgt die Verpuppung zwischen einem Knäuel von Blättern.

Das sicherste und einfachste Vertilgungsmittel besteht im Abschneiden und Verbrennen ihrer Nester von der zweiten Hälfte des November ab.

20) Der Schwan, Gartenbirnspinner, Moschusvogel, Bombyx (Porthesia, Lipäris) auriflua, der mit dem vorigen zum Verwechseln ähnlich ist, legt von Mitte Juni bis Juli seine goldgelben Schwämme ebenfalls gern an Rosenstöcke. Die Räupchen schlüpfen nach 15 bis 20 Tagen aus, häuten sich vor dem Winter zweimal, leben aber nicht gesellig, sondern überwintern einzeln in den Rissen der Oberhaut oder unter dem Moos an den Stämmen. Im April verlassen sie ihre Winterlager und fressen die aufbrechenden Knospen aus.

Durch nachstehende Merkmale unterscheiden sie sich von der vorigen. Die Haarbüschel der Warzen sind schwarz, der schneeweiße Seitenflecken fehlt auf dem ersten und letzten Gliede; zwischen den Füßen und Luftlöchern haben sie eine rothe, unterbrochene und über den Rücken eine breitere, durch schwarz getheilte, lebhaft zinnoberrothe Längslinie. Auf dem ersten Gliede ist letztere dreistreifig, auf dem vierten durch warzige Auftreibungen des Rückens nach beiden Seiten auseinander gebogen, auf dem fünften unterbrochen und nur am Hinterrande des Gliedes zu einer Querlinie entwickelt.

Als Gegenmittel empfiehlt sich das Aufsuchen und Vernichten der Eierschwämme im Juli und August.

21) Als Rosenfeind ist auch die schöne, 30 bis 52 Millimeter lange Bürstenraupe des Aprikosenspinners, auch Sonderling, Lastträger genannt, Oregyia antiqua, anzusehen, indem die Blätter von zwei Generationen im April und Mai, sowie Juli und August befallen werden. Anfangs sehen die Raupen schwarz aus, sind mit langen schwarzen Haaren besetzt und haben zwei gelbe Fleckchen auf dem Rücken. Später verdecken dichte gelbliche Haare auf quergereihten röthlichen Wärzchen die aschgraue,

von weißen und rothgelben Längslinien durchzogene Grundfarbe. Auf dem Rücken des vierten bis siebenten Ringes steht ein bürstenartiges Bündel gelber oder brauner Haare und beiderseits des Kopfes, des fünften und auf dem Rücken des vorletzten Gliedes ein Pinsel sehr langer schwarzer, geknopfter Haare. Wenn es nicht gelingt, die vom Weibchen auf ihr Puppengespinst und dessen nächste Umgebung gelegten sehr zahlreichen Eier aufzufinden und zu zerstören, so bleibt nichts anderes übrig, als die Raupen einzeln abzusuchen oder abzuklopfen.

22) Auch die Raupe des Mondvogels, Ochsen- oder Großkopfs, Phalĕra (Pygaera) bucephăla, ist vom Juli bis Oktober gesellig auf Rosen beobachtet worden. Die 16füßige, warzenlose Raupe ist schmutzig gelb, schwarzbraun gegittert und nur zerstreut behaart. Die in Familien lebenden Raupen lassen sich leicht abklopfen.

23) Als Rosenfeind ist auch die schwefelgelbe, zuweilen röthlich oder grünlich gefärbte, mit sammetschwarzen Einschnitten und vier bürstenartig abgestutzten Haarpinseln auf den mittleren und einem rosenrothen Pinsel auf dem letzten Körperringe versehene Raupe des Rothschwanzes, Buchen- oder Wallnußspinners, Dasychīra pudibūnda *L.* beobachtet worden.

24) Die Raupen der düster gefärbten Ampfer-Eule, Noctua (Acronȳcta) rumĭcis, erscheinen in zwei Generationen im Juni und September bis November vereinzelt auch auf Rosen. Der schwarze, oder schwarz und rothfleckige Körper, am vierten Gliede etwas buckelig, ist auf grauen Warzenreihen mit mäßig langen, dichten, graugelben Haaren bewachsen. Mitten über den Rücken läuft eine Reihe zinnoberrother Knöpfchen, neben denen jederseits auf dem dritten, fünften und elften Gliede eine Reihe schiefer, weißer Flecken und unter den weißen Luftlöchern des vierten bis elften Gliedes eine Reihe gelblich weißer und rother zusammenhängender Flecken steht. Die sehr gefräßigen Raupen sind von den Rosen abzulesen.

25) Ebenso ist zuweilen die 35 Millimet. lange schwarze, mit einem gelben, durch eine schwarze Linie getheilten Rückenstreifen, seitlich mit rothen, weißen und gelben Flecken und einem Zapfen auf dem vierten Körperringe versehene Raupe der kleinen Pfeil- oder Aprikoseneule, Noctua (Acronȳcta) tridens, zerstörend auf den Rosen beobachtet worden.

26) Der Blatträuber oder große Frostspanner, Geomĕtra Hibernĭa, Fidonĭa) defoliarĭa, legt, wie der folgende, vom Oktober an seine Eier (bis 400) einzeln oder in kleinen Partien auch an die Rosenaugen oder in deren nächste Nähe. Bei günstiger Witterung kriechen die Räup-

chen Mitte April aus, verbergen sich zwischen den aufbrechenden Knospen und zerfressen dieselben.

Jede Raupe ist schlank, zehnfüßig, in den Gelenken etwas eingeschnürt und von lichtgelber Farbe. Ueber Kopf und Rücken zieht ein mehr oder weniger rothbrauner breiter Streifen, der an den Rändern fein schwarz und etwas bogig eingefaßt ist. Unter diesem steht im gelben Grunde auf 9 Ringen jederseits ein rothbraunes Fleckchen mit dem weißen Luftloche. Während des Tages sitzen die Raupen frei und meist gern in schleifenförmiger Stellung, wobei sie den vordern Körpertheil frei halten und die Brustfüße ausbreiten. Schüttelt man den Baum, so lassen sie sich an einem Faden herab und können an demselben auch wieder in die Höhe klettern.

27) Der kleine Frostspanner, auch Spanne oder Reifmotte genannt, Geomëtra brumāta (Cheimatobĭa, Larentĭa, Acidalĭa) ist dem Namen nach wohl Jedermann hinlänglich bekannt, da seine Raupe der gefährlichste Feind unserer Obstbäume ist und sie oft kahl wie Besenreis frißt.

Vom ersten Frühlinge bis spätestens zu Anfang des Juni ist sie auch auf den Rosen anzutreffen, wo sie Blätter und Knospen umspinnt und verzehrt.

Die den sehr kleinen, rothgelben Eiern entschlüpften Raupen sehen grau, nach der ersten Häutung gelblich grün, Kopf und Nacken aber schwarz aus. Nach der zweiten Häutung verliert sich das Schwarz, die Grundfarbe wird reiner grün, die weißen Rückenlinien treten deutlich hervor. Nach der letzten Häutung haben sie die Länge von 26 Millimet. und einen hellbraun erglänzenden Kopf. Durch die gelblich grüne oder dunklere Grundfarbe zieht eine noch dunklere, beiderseits weißlich eingefaßte Rückenlinie; die Luftlöcher erscheinen als dunkele Pünktchen auf einer lichteren, zarteren Linie.

Natürliche Feinde der beiden Frostspannerraupen sind außer den insektenfressenden Vögeln, der Puppenräuber (Calosōma), die Ameisen, Baumwanzen und verschiedene Schlupfwespen.

Da die Puppen in einem losen Cocon flach unter der Erdoberfläche überwintern, so grabe man den Boden um die Rosenstöcke 30 Centimet. tief um, stampfe ihn fest, damit die Puppen tief versenkt und in ihrer Entwickelung gestört werden.

Um die flügellosen Weibchen beider Frostspanner, die zumeist erst mit Eintritt der Dunkelheit an den Stämmchen empor kriechen, beim Eierlegen zu fangen, umbinde man die Stämme mit breiten, festanliegenden Papier- oder Lederstreifen und bestreiche dieselben vom Ende Oktober an wiederho-

lentlich reichlich mit Vogelleim. Die gefangenen Schmetterlinge lese man ab und tödte sie.

28) Auf den verschiedensten Rosen findet man auch die Raupe des Gartenrosenwicklers, Tortrix (Teras, Argyrotōza) Forskaleāna *L.*

Sie hat wie die folgenden Arten 16 Füße; Kopf und Brustfüße sind schwarz, Nackenschild braunschwarz und durch eine helle Linie halbirt, der gelblich grüne Körper ist stellenweise mit behaarten, schwarzen Wärzchen besetzt.

Sie zieht die Blätter röhrenförmig zusammen, verpuppt sich darin und erscheint im Juni und Juli als Schmetterling, der von Taschenberg, Seite 287, genau beschrieben ist.

Wird diese, wie die übrigen Tortrix-Arten zur Gartenplage, so bleibt weiter nichts übrig, als die Raupen abzulesen oder in den zusammengezogenen Blättern mit den Fingern zu zerdrücken.

29) Sehr oft in Gesellschaft mit der vorigen, tritt die Raupe des goldgelben Rosenwicklers auf, Tortrix (Argyrotōza) Bergmanniāna *L.*, der Juni und Juli nach Sonnenuntergang oft in ungeheuern Massen die Rosenstöcke umschwärmt, auf- und niederfliegt und von Taschenberg a. g. O., Seite 292, beschrieben ist.

Die von dem Weibchen an den Grund der Zweige gelegten Eierchen schlüpfen sehr zeitig im Frühlinge aus, und die Larven erscheinen Ende April und Mai an den Zweigspitzen der verschiedensten Rosenarten, deren Blätter sie in der Richtung der Mittelrippe zusammenspinnen.

Kopf, Brustfüße und das getheilte Nackenschild dieses Räupchens sind glänzend schwarz, die Afterklappe ist braun, die übrigen Körpertheile grün, mehr oder weniger in Gelb, auf dem Rücken längs des durchscheinenden Gefäßes in Fleischroth übergehend und mit einzelnen hellen Härchen besetzt.

30) Der Heckenwickler, Tortrix rosana *L.* (laevigana *Tr.*), dessen Beschreibung bei Taschenberg, Seite 290, zu finden ist, legt seine Eier auch gern an Rosen.

Ende April schlüpfen die Eier aus, und die jungen Raupen leben anfangs gesellig in ausgebreiteteren Gespinsten. Später vereinzeln sie sich unter die Blätter, die sie wie die vorige röhrenförmig zusammenspinnen.

Die Raupe hat eine Länge von 19 Millimet., der Kopf ist glänzend braun, das hornige Nackenschild kastanienbraun, den schmutzig dunkelgrünen ins Bräunliche spielenden Körper entlang ziehen drei dunkelere Streifen.

31) Weit schädlicher ist der dreipunktige Rosenwickler, Tortrix

tripunctata Wien. Verz. (Grapholitha, Paedisca cynosbana *Tr.*, ocellana *H.*) und

32) der weißflügelige Roſenwickler, Tortrix roborana, Wien. Verz., indem deren Raupen nicht blos Blätter und Triebſpitzen umſpinnen und vertilgen, ſondern ſogar die Knospen ausfreſſen, ſo daß in manchen Jahren nur wenig Blüthen zur Ausbildung gelangen.

Die nach hinten etwas verſchmälerte Raupe des erſteren hat eine Länge von 9 Millimet., iſt ſchwarzgrün, am Bauche lichter, auf weißlichen Wärzchen gelb behaart. Kopf, Bruſtfüße und das breite Halsſchild ſind ſchwarz, letzteres vorn weiß gerandet und mit weißer Mittellinie verſehen, das Afterglied gelb. Der weißlichen Haarwärzchen ſtehen auf dem zweiten und dritten Gliede je 6 in einem Ringe und hinter demſelben jederſeits noch eine mit 2 Haaren beſetzte Warze. Auf den folgenden Gliedern ſtehen gleichfalls je 6 in einem Ringe, dahinter noch 2 nach vorn gerückt, aber nur je mit 1 Haar verſehen.

Die Raupe des letzteren iſt etwas größer, 17 Millimet. lang, ziemlich plump und dick, matt-ſchmutzig-braun und mit feinrauher Oberfläche. Der Kopf iſt auffallend gelbbraun, das getheilte Halsſchild und die Afterklappe ſind glänzend ſchwarz. Auf jedem Ringe ſtehen pechbraune, mit je einem weißlichen Borſtenhaare verſehene Warzen, davon 4 im Trapez auf dem Rücken.

Die Schmetterlinge beider ſind einander außerordentlich ähnlich und von Taſchenberg a. g. O. beſchrieben.

33) Die Roſenſchabe, geierfederfarbige Schabe, Tinëa (Coleophöra) gryphipennella *H.* (Ornix rhodophagella *Koll*), hat eine Körperlänge von 3,5 Millimet. und eine Flügelſpannung von 12 Millimet. Kopf und Mittelleib-Rücken ſind gelbbraun, die Fühler körperlang, dunkel geringelt, Taſter, Hinterleib und Beine gelbgrau. Die ſchmal-lanzettlichen Flügel liegen in der Ruhe mantelartig um den Leib. Die vorderen ſind lehmgelb mit metalliſchem Schimmer, die langen, federartigen Franzen daran ſind, wie die Hinterflügel, aſchgrau.

Ende Mai oder Anfang Juni legt das Weibchen ſeine Eier an die Augen der Roſenzweige. Die nach 4 Wochen ausſchlüpfenden Raupen haben 14 Füße und einen gelbbraunen, ſtellenweiſe behaarten Körper. Kopf, feingetheiltes Nackenſchild und Afterſegment ſind ſchwarz. Sie leben nur in graubraunen, lederartigen, von den Seiten zuſammengedrückten, geraden Säckchen, die ſie ſich aus den Ueberbleibſeln der abgenagten Blätter bilden, in denen ſie ſich mittelſt des dicht beborſteten Afterſegments bequem feſthalten. Im

Herbste spinnen sie sich am Fuße der Rosenstämme ein, überwintern daselbst und stellen sich im ersten Frühjahre auf den Blatt- und Blüthenknospen ein, die sie gänzlich zerstören. Es ist daher nöthig, die Rosenstöcke im Winter und Frühjahre nach solchen Säckchen abzusuchen.

34) Von Mitte Mai an findet man das ganze Jahr hindurch auf der Unterseite der Rosenblätter auch die Larve des Hollunder-Blasenfuß, Thrips sambūci.

Sie ist grünlich weiß, nach der dritten Häutung blaßgelb, der Kopf verkehrt kegelförmig und halb so breit wie der Brustkasten. Die zurückgebogenen Fühler sind fünfgliedrig und doppelt so lang als das vorn verschmälerte, seitig bauchige Halsschild. Mit der vierten (letzten) Häutung erscheinen die Flügelstumpfe, welche, schmalen Schläuchen vergleichbar, an den Körperseiten liegen und bis zum Hinterrande des fünften Hinterleibgliedes reichen. Statt der Krallen haben sie an den Füßen Haftscheiben, mit denen sie sich ansaugen können. Sie rauben den Blättern die zarte Oberhaut, so daß diese wie skalpirt erscheinen und ein Zustand hervorgebracht wird, den man mit dem Namen der Schwindsucht belegt hat.

Obgleich kleine Käferarten, Scymnus ater und Gyrophaena mauca von den Eiern, Larven und Puppen des Blasenfußes leben, auch Räucherungen mit Insektenpulver und Tabak als wirksam empfohlen werden, so scheint doch sorgfältiges Absuchen der Stöcke das beste Mittel zu sein.

35) Der Rosenschildträger, Coccus rosae Bouché (Aspidiōtus, Chermes), hat eine Körperlänge von 1 Millimet. und ist mit einem weißen, wachsartigen, runden, flachgewölbten Schilde bedeckt. Hebt man diesen mittelst einer Nadelspitze ab, so erkennt man den eiförmigen, gelben, gelbbraunen, siebengliederigen Hinterleib des Weibchens, der auf dem Rücken mit 3 Reihen eingestochener Punkte und am Rande mit einzelnen kurzen Borsten versehen ist, während das kleinere Männchen blaßroth von Farbe, ohne Gabelborsten am Hinterleibe und fein weiß bestäubt ist, 2 Flügel und je 1 borstenartigen Schwinger und 2 Krallen an jedem Fuße hat. Das Weibchen häutet sich mehrmals während des Sommers und verbirgt sich, ihre blaßbraunen Eier und die jungen Larven unter die weißen abgestreiften Bälge.

Um sie von den Stämmen und Zweigen der Rosen fern zu halten, beschneide man die Rosen, bevor die Knospen getrieben haben, und bürste die nicht durch den Schnitt entfernten weißen Schilder sammt den darunter sitzenden Eiern herunter.

36) Auf der Rückseite der Blätter aller Rosen, am liebsten an jungen Zweigen und Blumenstielen, findet sich in großen Kolonien die Rosen-

Blattlaus, Neffe, Aphis rosae, bekannt durch die sehr langen schwarzen Saftröhren und die schwarzen oder braunen Fühler auf einem Knopfe der rinnenförmig ausgehöhlten Stirn. Die Ungeflügelten sind 3 Millimet. lang, grün, auf dem Rücken glatt, das fädelförmige Schwänzchen gelb. Die Geflügelten sind etwas kleiner, grün oder bräunlich von Farbe, Brust, die drei Lappen des Mittelleibes, das Schildchen und die Flecken am Rande des Hinterleibes glänzend schwarz, das Schwänzchen gelbgrün. Mit ihrem am hintern Kopfende eingelenkten dreigliedrigen Schnabel bohren sie die jungen Stengel und Blätter an und saugen ihnen den Saft aus. Aus dem After und wahrscheinlich auch aus den nach oben gerichteten Saftröhren auf dem sechsten Gliede sondern die Blattläuse eine süßliche Flüssigkeit ab und werden dadurch „Milchkühe" für verschiedene Ameisen. Dieser Honigsaft, vielleicht noch vermehrt durch die Ausflüsse aus den von den Ameisen ihnen beigebrachten Stichwunden, überfirnißt zuweilen viele Blätter und Stengel, und dieser als Honigthau bekannte Saft (nicht zu verwechseln mit dem Honigthau an den Spelzen des Roggens und anderer Gräser, der dort eine Aussonderung der Mycelienfäden des Mutterkorns ist) verstopft deren Spaltöffnungen und beeinträchtigt dadurch die Lebensthätigkeit der Pflanze. Auch der sogenannte Mehlthau (nicht der zu den Schlauchpilzen, Ascomycetes, gehörige Mehlthau, Erysiphe) rührt von ihnen her, da die meisten Blattläuse aus ihrer Haut einen verschieden gefärbten Staub ausschwitzen, der sammt den in den Häutungen abgestoßenen Bälgen durch die vorhandene Klebrigkeit festgehalten wird.

Ein unfehlbares Mittel zur Vertilgung der Blattläuse ist noch nicht erfunden; denn das im Gewächshause wohl anzuwendende Räuchern mit schlechtem Tabak, das Besprengen mit Tabak- und Wermuthwasser, das Bestreuen mit Gyps, Kalkstaub und Tabakspulver, sind für das freie Land oft zu umständlich und doch nicht unfehlbar, indem die betäubten Thierchen nach einiger Zeit wieder aufleben.

Beim Räuchern in geschlossenen Räumen verfährt man in folgender Weise: Nachdem die Rosen vorher gespritzt sind, damit der warme Rauch keine zu trockene Luft verursacht, bringt man eine Partie des geringsten Tabaks, der Größe des Raumes angemessen, mit etwas feuchtem Moose untermischt, auf einen über glühende Holzkohlen gelegten engen Rost oder ein Drahtsieb; dieser verdampft nach und nach und füllt den Raum vollständig mit Rauch an. Bei größeren Räumen ist es zweckmäßig, an mehreren Stellen eine solche Räuchervorrichtung anzubringen. Man kann auch den Tabak auf einer mit Holzkohlen gefüllten eisernen Kohlenpfanne verbrennen lassen.

Eine weitere Vorrichtung zum Räuchern besteht in Folgendem: man lege einige Bogen dickes Fließpapier vom größten Format in eine Auflösung von Salpeter ein. Nach kurzer Zeit nehme man sie wieder heraus und lasse sie trocken werden; wenn dann das Papier leicht und ohne Flamme brennt, so ist es zum Gebrauch tauglich. Nun nehme man etwas feuchte, ganze, oder auch feingeschnittene Tabaksblätter, lege dieselben gleichmäßig auf einen Bogen dieses Fließpapieres und wickle ihn mit dem Tabak auf einen runden, nicht zu dicken Stab, so daß die Rolle so viel als möglich überall gleich dick wird. Hierauf binde man sie an 3 oder 4 Stellen mit Bindfaden leicht zusammen, ziehe den Stab heraus und hänge etliche Rollen in dem zu räuchernden Raume an verschiedenen Stellen mittelst Drahtes auf, so daß sie senkrecht herabhängen, und zünde sie alsdann an. Je nach der Größe des Raumes wird man mehr oder weniger solcher Rollen gebrauchen. Außerdem giebt es auch einen besonderen Räucherapparat aus Blech zum Räuchern mit Tabak und Insektenpulver. Eine Kapsel wird mit Tabak gefüllt, darauf legt man einige Kohlen oder brennenden Zunder, dreht an einer daran angebrachten Kurbel, worauf sich schnell starker Rauch entwickelt, welcher durch ein Rohr ausströmt. Um einen solchen Räucherapparat in Thätigkeit zu setzen, hat man ebenfalls nicht nöthig, in den zu räuchernden Raum zu treten, sondern man steckt nur von außen das Rohr durch eine Oeffnung, welche jedoch nicht größer sein darf, als nöthig ist. Ueberhaupt ist es nothwendig, den Raum fest, hermetisch zu verschließen, damit der Rauch nicht entweichen kann, indem sonst die Erstickung der Läuse nicht schnell und vollständig vor sich geht. — Diese Räucherung muß öfter wiederholt werden; denn sind nur wenige Blattläuse entkommen, so werden die Rosen bald wieder davon überhäuft sein. Wie man das Räuchern bei im Freien stehenden Rosen bewerkstelligt, ist in §. 26. bereits beschrieben worden.

Das sicherste Mittel bleibt vor der Hand Abkehren in ein untergehaltenes Gefäß mit Tabaks- oder Wermuthswasser oder sanftes Zerdrücken an den Pflanzentheilen und Abwischen der Leichname mit einem Tuche oder Pinsel, obgleich die rothköpfige Gallwespe, Xystus erythrocephălus und die Schlupfwespen, Aphidĭus varĭus und A. rosārum *L.* sehr häufig ihre Eier hineinlegen, und auch Meisen, Goldhähnchen, Zaunkönige, Coccinella, Coccidŭla, Hemerobĭus perla *L.*; H. chrysops *L.*; und etliche Syrphus, Leucopis und Allotria-Arten viel zur Vertilgung von Blattläusen beitragen.

37) Von Ende Mai an umschwärmt bei hellem Sonnenschein die Rosenstöcke die 4 Millimet. lange Rosencikade, Typhlocўba (Cicāda) ro-

sae *Fab.* An trüben Tagen ſitzt ſie ruhig, hüpft aber bei jeder Erſchütterung mittelſt ihrer langen, ſtacheligen und zum Springen befähigenden Hinterſchienen auf, fliegt einige Male im Kreiſe um den Strauch und ſetzt ſich dann nieder. Sie iſt durchaus weiß oder bleich citronengelb, an den Augen dunkler, die zarten milchweißen Flügel haben einen blauen Schiller. Mittelſt eines am vordern Kopftheile angehefteten Schnabels ſaugen ſie ſchon als flügelloſe Larven die Unterſeite der Blätter an, ſo daß dieſe grau marmorirt ausſehen. Die Weibchen legen durch ihre in der Leibesſpitze verborgene hornige Legeröhre ihre Eier einzeln unter die Rinde des jungen Holzes. Im nächſten Frühjahre ſchlüpfen ſie aus und die Larven erſcheinen auf den Roſenblättern.

Sind dieſe Feinde in großer Zahl vorhanden, ſo thut man wohl, die Roſen frühzeitig ſtark zurückzuſchneiden und die Abgänge zu verbrennen.

38) In Treibhäuſern findet ſich zuweilen die Larve der grünen Schmalwanze, Phytocŏris (Orthotylus, Lygus) nassātus *F.*, von Taſchenberg a. g. O., Seite 493 und 494, beſchrieben, welche die jungen Roſenzweige anſticht, ſo daß dieſe verkrüppeln.

39) Die Milbenſpinne, Pflanzenmilbe, rothe Milbe, Tetranўchus (Acărus, Gammasus) telarĭus (tiliārum, socius), lebt nicht blos auf Linden, Eichen, Bohnen, Ariſtolochien, Paſſifloren, Malvaceen, Georginen ꝛc., ſondern hinter einem wie Eis glitzernden Geſpinnſtüberzuge auch auf der Unterſeite der Roſenblätter, die in Folge des ausgeſaugten Saftes ein gelbes oder graues Ausſehen bekommen.

Während des Sommers kann man Hunderte dieſer Milben von allen Altersſtufen nebſt Eiern an einem einzigen Blatte bemerken. Auch beſpinnen ſie, in ſolchen Mengen vorhanden, ſogar die Zweige, was aber wegen des Laubes weniger in die Augen fällt.

Die punktartigen, nur unter einer Lupe deutlich zu erkennenden Thierchen ſind orangegelb, an den Seiten des eirunden Leibes mit je 1 roſtfarbenen Flecken geziert und fein behaart und auf der Schulter jederſeits mit 3 langen Borſten verſehen.

Vorn auf dem Bruſtſtücke bemerkt man 2 kleine Augen und 1 nach unten gerichteten Rüſſel. Die Taſter ſind deutlich gegliedert und beborſtet und haben an der Unterſeite des letzten Gliedes einen ſehr undeutlichen krallenförmigen Nagel. Die beiden vorderſten von den ſiebengliedrigen Beinpaaren, deren erſtes das längſte iſt, ſtehen von den beiden hinterſten weit ab.

Haben ſich die Milben auf Roſenſtöcken eingeniſtet, ſo ſind die befallenen Zweige entweder abzuſchneiden und zu vernichten, oder mit einem Abſud

von Quaſſiaholz fleißig zu begießen und mit Tabaksaſche oder Schwefelpulver zu beſtreuen.

Als verdächtig ſind an Hecken- und Gartenroſen noch bemerkt worden

a. An den Blättern:

1. Lytta vesiacatoria *F.*
2. Rhynchītes minūtus *Gyl.*
3. Peritĕlus grisĕus *Oliv.*
4. Saturnĭa carpīni *Hb.*
5. — spini *Hb.*
6. — antīqua *L.*
7. — selenitĭca *Esp.*
8. Dasychīra fascelīna *L.*
9. Oregўĭa goniostīgma *F.*
10. — pudibunda *Hb.*
11. Gastropăcha quercifolĭa *L.*
12. — populi *L.*
13. Acronўcta psi *L.*
14. — auricŏma *V. S.*
15. — cuspis *Hb.*
16. Cosmia trapezīna *L.*
17. Orthosĭa litura *L.*
18. Selenia lunaria *F.*
19. Crocāllis pennaria *L.*
20. Odontoptĕra bidentāta *L.*
21. Amphidăsys pilosarĭa *V. S.*
22. Boarmĭa rhomboïdarĭa *V. S.*
23. Larentĭa psittacāta *F.*
24. — derivata *V. S.*
25. — badiana *V. S.*
26. — fulvata *Tr.*
27. Geomĕtra aestivaria *Hb.*
28. Eugonia (Ennomos) alniaria *L.*
29. Hibernia aurantiaria *Hb.*
30. Zyrene rubiginaria *Tr.*
31. Loxotaenia ameriana *F.*
32. Loxotaenia levigana *V. S.*
33. Penthīna ochroleucana *Hb.*
34. — roborāna *V. S.*
35. — variegana *Hb.*
36. — cynosbāna *L.*
37. Grapholĭta Roseticolana *Zll.*
38. Scopula prunalis *V. S.*
39. Exapate salicella *Hb.*
40. Chimabacche fagella *V. S.*
41. Coleophora lusiniaepennella *Tr.*
42. Tischeria augusticolella *Hb.*
43. Anchinia scirrosella *H. Sch.*
44. Pterophorus rhododactylus *Tr.*
45. Nepticula centifoliella *Zll.*
46. — anomatella *Goetz.*
47. — angulifasciella *Tr.*
48. Megachile centuncularis *F.*
49. Hylotoma amethystina *Hrtg.*
50. — pagana *Klg.*
51. Emphytus ruficinctus *Klg.*
52. — melanarius *Hrtg.*
53. Lyda suffusa *Klg.*
54. — straminipes *Hrtg.*
55. Harpiphorus lepidus *Hrtg.*
56. Cecidomўĭa rosae *Bremi.*

b. Im Marke junger Triebe:

1. Larve von Clytus ariĕtis *L.*
2. — — Rhynchītes alliarĭae *Fr.*
3. — — Otiorhўnchus ligustici *F.*
4. — — Sapērda praeūsta *L.*
5. — — Tenthrēdo excavator *Mèrat.*

Sechster Abschnitt.

Beschreibung der schönsten neuen und alten Rosen, nebst Angaben über ihre Verwendung und sonstigen Eigenschaften der systematisch geordneten Gattungen *).

Bevor ich zur Beschreibung der schönsten neuen und alten Rosen übergehe, sei noch einiges über die Eigenschaften einer guten Rose gesagt.

Die Blume, sei sie von Kugel-, Schalen-, flacher oder irgend einer anderen Form, muß korrekte Umrisse haben und bis ins Centrum hinein hinlänglich gefüllt sein. Die Blumenblätter sollten von möglichst fester und substanzreicher Beschaffenheit sein, was besonders bei im freien Lande stehenden Rosen von Wichtigkeit ist, wo die Blüthen mit dünnen, zarten Blumenblättern durch Regen oder die Sonnenstrahlen sehr leicht verdorben werden. Ferner muß die Stellung der Blumenblätter recht regelmäßig sein, abgesehen von der allgemeinen Form der Blume; dabei müssen die Blumenblätter rund und glatt geschnitten und breit sein und dürfen nur einen kurzen

---

*) Um nicht etwa eine werthvolle Rose zu übergehen, werde ich auch die von Frankreich und Luxemburg für 1872 und 1873 angepriesenen und in den Handel gegebenen mit anführen. Allerdings kann ich blos die von den Züchtern gegebenen Beschreibungen beifügen, da ich die Rosen selbst noch nicht beobachtet habe, mithin für den Werth einer jeden Sorte nicht bürgen kann.

Zur Erleichterung des Aufsuchens dient das am Schlusse alphabetisch geordnete Register sämmtlicher beschriebener Rosen.

Nagel *) haben. Der Blumenstiel muß kräftig sein, damit er eine vollkommen gefüllte Blume aufrecht zu tragen vermag. Die Theerosen entbehren meistens dieser Eigenschaft, und ihre zum Theil herrlichen Blumen neigen sich abwärts. Aber eben so wesentlich sind die allgemeinen Eigenschaften einer Rose, als ein reicher und williger Flor, wobei es aber besonders auch auf ein gutes Aufblühen der Blumen ankommt; ferner eine kräftige, frische Belaubung; ein kräftiger, wenigstens nicht schwächlicher Wuchs, und wenn es sich um Rosen fürs freie Land handelt, ein hinreichender Grad von Härte.

A. Blätter nicht bleibend, abfallend.

I. Alle Nebenblätter an den Zweigen von gleicher Form und Größe, der Länge nach mit dem Blattstiele verwachsen, die oberen Zipfel frei.

1. Rosa pimpinellifolia, L. — R. spinosissima — Rosier à feuilles de pimprenelle.

Die Pimpinellrose; Schottische Rose.

Die Stacheln sind gerade, stielrund, dünn und von verschiedener Größe, meist sehr zahlreich; Blätter nicht bleibend; Blättchen klein, oval oder rundlich, meist nur 1½ Centim. lang, kahl, oberseits dunkel-, unterseits blaßblaugrün, einfach- und nicht drüsig gesägt; Kelchzipfel ungetheilt (ohne Anhängsel), über der Frucht zusammenneigend, Blumen klein, gefüllt, kugelförmig, weiß oder roth; Griffel frei, nicht mit einander verwachsen; Früchte schwarz.

Die pimpinell- oder bibernellblätterige Rose bildet einen 0,50 bis 1,80 Meter hohen Strauch, welcher hier und da in Deutschland auf sonnigen, steinigen Hügeln, sowie im Flachlande der Nordseeküste wild wächst. Sie hat besonders durch ihren frühzeitigen Flor Werth, indem sie allen übrigen Sommerrosen bisweilen um einen ganzen Monat voraus ist. Sie macht zahlreiche, sich weit unter der Erde hinziehende Ausläufer, die sich zur An-

---

*) Die unterste Spitze des Blumenblattes, womit dasselbe auf dem Blüthenboden angeheftet ist.

zucht junger Pflanzen verwenden laſſen. Die Varietäten dieſer Gruppe ſind ebenfalls ſämmtlich hart, bedürfen keiner beſonderen Pflege und nehmen mit jeglichem Boden fürlieb, wenn man ihnen nur einen recht freien und ſonnigen Standort geben kann. Das Beſchneiden muß ſich nur auf die abgeblühten Zweige beſchränken und unmittelbar nach dem Abblühen ſtattfinden. Einzeln ſtehend bilden ſie die reizendſten Zwergbüſche, wenn ſie mit ihren kleinen kugelförmigen, weißen, fleiſchfarbenen, roſigen, ponceaurothen oder karminrothen Blumen bedeckt ſind. Beſonders eignen ſie ſich zum Bepflanzen ſonniger Felſenpartien, ſowie ſonniger Hügel. Aber auch zu niedrigen Hecken ſind ſie zu verwenden, indem ſie ſich ſehr gut unter der Scheere halten laſſen; man wird ſie auch in dieſer Geſtalt im Mai mit Blüthen bedeckt ſehen, wenn das Schneiden nur nach beendeter Blüthezeit vorgenommen wird.

Aurora, Blumen mittelgroß, voll, ſchön roſa, aurorafarben ſchattirt.

Blanche double, Blumen weiß, klein gefüllt.

Blush, Blumen mittelgroß, voll, zartroſa.

Céntimane, Blumen mittelgroß, voll, fleiſchfarben.

Centifolia, Blumen groß, gefüllt, blaßroſa, weiß gerandet, von der Form einer Centifolie.

Gracieuse, Blumen mittelgroß, voll, fleiſchfarben; eine ſchöne Hybride.

Grandiflora, Blumen ſehr groß, oft 9 Centim. breit, gefüllt, roſa.

Jaune double des Anglais, [Double yellow *)], Blumen klein, gefüllt, hellgelb.

Perpetual, Blumen mittelgroß gefüllt, zartroſa; iſt wohl die werthvollſte in dieſer Gruppe.

Picturata, Blumen mittelgroß, voll, karminweiß bemalt und geſtreift; hat ſehr niedlich geformtes Laubwerk und iſt außerordentlich reichblühend.

Unique, Blumen gefüllt, ſchön geformt, weiß, die Knospen von Farbe und Form wie bei der weißen Centifolie (Unica).

---

*) Nicht zu verwechſeln mit der R. lutea double yellow.

2. Rosa pimpinellifolia bifera — Rosier à feuilles de pimprenelle remontante.

Die mehrmals blühende Pimpinellrose.

Es sind dieses Pimpinellrosen, die wahrscheinlich durch Kreuzung mit der mehrmals blühenden Damascenerrose entstanden und durch ihr mehrmaliges Blühen von Werth sind. Kultur und Verwendung ist ganz die der einmal blühenden.

Estelle, Blumen klein, gefüllt, rosa oder auch fleischfarbig weiß.

Purple Scotch, Blumen mittelgroß, voll, purpurroth.

Scotch perpetual, Blumen mittelgroß, stark gefüllt, hellfleischfarbig.

Souvenir de Henry Clay, Blumen mittelgroß, gefüllt, schön hellrosa, sehr feine Form; Blumenblätter dachziegelartig übereinander liegend.

Stanwell, Blumen mittelgroß, gefüllt, zartrosa, im Centrum oft dunkler, schalenförmig, sehr wohlriechend, fast wie eine Centifolie. Ist eine der werthvollsten dieser Gruppe, indem sie die erste ist, die ihre Blüthen entfaltet und ihren Flor bis zum Herbste fortsetzt.

3. Rosa damascena, L. — Rose de Damas.

Die Damascener-Rose.

Die Stacheln sind gekrümmt, seitlich zusammengedrückt; Blätter nicht bleibend; Nebenblätter wie die vorigen; Blättchen oval, kahl, oberseits glänzendgrün, einfach- und nicht drüsig gesägt; Kelchzipfel fiederspaltig, Blumen rosenroth bis weiß, mehr oder weniger gefüllt, wohlriechend, Frucht roth; Griffel frei und nicht mit einander verwachsen. Ein dichtwachsender Strauch bis zu 1,50 Meter Höhe, welcher während der Kreuzzüge um 1100 aus Syrien eingeführt wurde. Die Damascener Rosen zeichnen sich durch ihren robusten Wuchs und rauhe stachelige Triebe aus. Die wohlriechenden, gefüllten Blumen erscheinen einzeln oder zu mehreren beisammen an der Spitze der Triebe. Sie sind hart genug, um unsere Winter ohne Bedeckung auszuhalten, wachsen gleichgut veredelt in Stammform wie wurzelächt, und im Topfe gezogen kann man sie fast zu jeder Zeit blühend haben. Zu diesem Behufe wähle man vom Juni bis September Pflanzen mit den stärksten Zweigen und Augen aus, schneide die langen Triebe bis auf die nächsten starken Knospen zurück und setze sie in frische Erde. Wenn man dieses

Verfahren in gewiſſen Zwiſchenräumen und an anderen Exemplaren wiederholt, ſo kann man eine beſtändige Folge von blühenden Roſen haben.

Déesse de Flore, Blumen mittelgroß, voll, faſt weiß mit roſigem Centrum, von flachem Bau; ſehr reichblühend. Schön zu Gruppen.

Endoxie, Blumen groß, voll, ſchalenförmig, lebhaft roſa, die Ränder der Blumenblätter lilaroſa ſchattirt; Wuchs kräftig. Gute Gruppenroſe.

La négresse, Blumen mittelgroß, voll, von flachem Bau, dunkelpurpurroth; die dunkelſte dieſer Gruppe. Gute Gruppenroſe.

La ville de Bruxelles, Blumen groß, voll, von flachem, ſchönem Bau, lebhaft roſa, nach den Rändern hin mehr und mehr verblaſſend; Wuchs kräftig, daher als Säulenroſe gut zu verwenden.

Léda, (Pointed Damask), Blumen mittelgroß, voll, flach, vom ſchönſten Karminlila, wenn ſie in gutem Boden ſteht, aber ihr Kolorit blaßt leicht und verwandelt ſich in Blaßroth oder Weiß, wenn ſie in der Kultur vernachläſſigt wird oder in ſchlechtem Boden ſteht, und verliert dann allen Werth; Wuchs kräftig; Blätter breit und kurz. Gute Gruppenroſe.

Madame Hardy, Blumen ſehr groß, dicht gefüllt, von ſchönem ſchalenförmigen Bau, rein weiß mit ganz zartem Anhauch von Fleiſchfarben; faſt unübertroffene Prachtroſe; Wuchs kräftig; muß lang geſchnitten werden, indem beim Kurzſchneiden der Flor zuweilen fehl ſchlägt; gedeiht am beſten wurzelächt, oder veredelt in Pyramidenform gezogen. Eignet ſich wurzelächt auf Raſenplätze als Einzelpflanze oder auch zur Bildung von Gruppen, ſowie zur Säulenroſe.

Madame Soëtmans, Blumen groß, voll, ſchalenförmig, zartfleiſchfarben, in Weiß übergehend; Wuchs kräftig. Gute Gruppenroſe, ſowie auch zur Säulenform geeignet.

Madame Zoutmann, Blumen groß, ſehr gefüllt, rahmweiß, von ausnehmend gutem Effekt; Blumenblätter feſt, halten ſich daher ſehr gut ſowohl bei feuchtem als bei heißem Wetter; Wuchs kräftig; darf nur wenig geſchnitten werden. Zur Säulenform geeignet.

Oeillet panaché, Blumen gefüllt, weiß, lilafarbig geſtreift. Wie die vorige zu verwenden.

4. Rosa Damascena var. omnium calendarum — Rose de quatre saisons.

Die Vierjahreszeitenrose.

(Wird auch als zu 5. gehörend betrachtet.)

Sie bildet nur eine Abtheilung der gewöhnlichen Damascener-Rose und weicht in ihrem Habitus auch nur wenig von dieser ab. Sie zeichnet sich hauptsächlich durch ihren remontirenden Charakter aus, indem sie in einem Jahre zu mehreren Malen Blüthen hervorbringt. Von ihr wurden auch mehrere Spielarten erzeugt, welche durch dicht gestellte, drüsige Stacheln einige Aehnlichkeit mit der Moosrose haben. Die Vierjahreszeitenrose ist vollkommen hart, macht keine anderen Ansprüche, als die einmal blühenden Sorten, und ist auch wie diese zu verwenden.

Céline Briont, Blumen hellrosa, mittelgroß, voll, Blumenblätter schmal, gefaltet; blüht in großen Büscheln und auch noch im Herbste gut; moosartig bekleidet.

Clares, Blumen groß, gefüllt, zartrosa, mit blaßrothen Rändern, von flachem Bau.

Crimson, Blumen rosafarben, groß, voll, von flachem Bau; Wuchs kräftig; Belaubung schön und merkwürdig; moosartig bekleidet.

Didon, Blumen mittelgroß, voll und schön gebaut, blaßfleischfarben, mit dunklem Centrum; sehr reich blühend, in Dolden von 12 bis 15 Blumen; moosartig bekleidet.

Julie d'Étange, Blumen mittelgroß, voll lebhaft karminrosa, mit gekräuselten und sonderbar gestellten Blumenblättern, Form flach; Wuchs kräftig; moosartig bekleidet.

Scarlet, Blumen groß, halbgefüllt, hochrosa, mit Purpur überzogen, schalenförmig; von schöner Farbe und sehr reichblühend.

White oder alba, Blumen weiß, groß, gefüllt, von flacher Form.

5. Rosa Damascena bifera — R. Portlandica — Rose perpétuelle.

Die Perpetuelle oder mehrmals blühende Damascener- und die Trianon-Rose.

Diese Abtheilung der Damascener-Rose ist hauptsächlich von der alten Monats- und der Vierjahreszeitenrose entstanden, und ihre Spielarten zeichnen sich durch köstlichen Wohlgeruch, frisches und schönes Kolorit, ansehnliche Größe und regelmäßigen Bau aus. Die Zweige stehen aufrecht und sind

mit feinen, ungleichen Stacheln beſetzt. Die Blättchen ſtehen zu 3, 5 oder 7 am Hauptblattſtiele und haben hervortretende Nerven. Die wohlriechenden und meiſtens ſchön gebauten Blumen ſtehen oft einzeln, mitunter zu Doldentrauben vereinigt, aber niemals in großer Anzahl. Zu einem guten Gedeihen erfordern die Roſen dieſer Gruppe einen recht nahrhaften Boden und freie Lage. Am zweckmäßigſten iſt es, ſie wurzelächt zu ziehen oder niedrig zu veredeln; ſie ſind von mäßigem Wuchſe und weichen hierin wenig von einander ab. Verlangen keinen Winterſchutz.

Abbé de l'Épée, Blumen groß, ſehr voll, ſammetartig lilapurpurn, von flachem Bau; einer Moosroſe ähnlich; ſehr dankbar blühend.

Anne de Melun, Blumen mittelgroß, voll, dunkelroſa, in Dolden ſtehend mit langen Blumenſtielen. Zur Bildung von Gruppen verwendbar.

Bernard, (Madame Ferray), Blumen mittelgroß, voll, lachsfarbenroſa, ſchalenförmig; ſtammt von Rose du roi ab. Eignet ſich auch zur Topfkultur und zum Treiben.

Céline Dubos oder Blanche du roi, Blumen mittelgroß, voll, weißfleiſchfarben, in rein weiß übergehend und zuweilen in roſa ſchimmernd; Habitus und Wohlgeruch in allen Theilen vollſtändig der Rose du roi gleich. Wie die vorige zu verwenden.

Colonel Lory, Blumen mittelgroß, voll, prachtvoll lebhaft roth, ſehr remontirend; hat viel Aehnlichkeit mit Bernard und iſt auch wie dieſe zu verwenden.

Du roi, die Königsroſe, Blumen prächtig karmoiſin, zuweilen purpurn, groß, voll, ſchalenförmig; von reichem, unausgeſetztem Flor und ſchöner Haltung, wohl eine der ſchönſten in dieſer Gruppe. Iſt auch zur Topfkultur und zum Treiben von großem Werthe.

Du roi strié, Blumen hochroſa, zuweilen geſtreift, meiſtens aber weiß gefleckt, groß und ſehr gefüllt, ſchalenförmig. Eine Spielart der vorigen, welche die gleichen Eigenſchaften beſitzt.

Eurydice, Blumen mittelgroß, voll, atlasartig hochroſa, kugelförmig, von ſchönem Bau.

Joasine Hanet, Blumen mittelgroß, voll, leuchtend purpurroth, in ſchönen Bouquets ſtehend, früh- und reichblühend. Gute Gruppenroſe.

Joséphine Antoinette, Blumen groß, voll, kugelförmig hochroth, blaßroſa eingefaßt, ſehr wohlriechend.

Joséphine Robert, Blumen groß, voll, ſchön gebaut, dunkelroſa, hell- umrandet; Wuchs kräftig.

Julie de Krudner, Blumen mittelgroß, voll, blaßfleischfarben.

Le Prince de Salm-Dyck, Blumen groß, voll, kirschroth, von flachem Bau, mit gefalteten, schön dachziegelig gestellten Blumenblättern.

Le Sueur, Blumen groß, voll, rosaviolett, schalenförmig, im Centrum mit sehr schmalen Blumenblättern, schön gebaut, in Doldentrauben stehend; Wuchs kräftig; sehr dankbar blühend und imponirend.

Mogador, (Crimson superb), Blumen brillant purpurkarmoisin, mittelgroß, voll, schalenförmig; Habitus ästig; Wuchs mäßig. Ein Seitenstück zu du roi und läßt sich auch wie diese verwenden. Sie blüht noch voller, die Blumen sind aber nicht ganz so schön geformt, als bei jener.

Requiem, Blumen sehr groß, sehr voll, zart fleischfarben, schalenförmig, in Rispen stehend; bis spät in den Herbst blühend.

Sidonie, Blumen groß, voll, lachsfarbenrosa, von gewölbtem, schönem Bau, sehr imponirend; Wuchs kräftig.

Yolande d'Aragon, Blumen groß, voll, hochroth, blaßlilarosa umrandet, schalenförmig; Wuchs kräftig; sehr dankbar blühend und von großem Effekt. Gute Gruppenrose.

6. Rosa lutea, Mill. — R. eglanteria — Rose capucine.

Die gelbe Rose; Kapuzinerrose; Fuchsrose.

Blättchen elliptisch bis verkehrt eiförmig, beiderseits gleichfarbig, lebhaft grün, doppelt und drüsig gesägt; Wurzelschößlinge mit geraden, pfriemlichen, ungleichen, Aeste mit gekrümmten, stärkern Stacheln; Kelchzipfel fiederspaltig, kürzer als die Blumenkrone; Blumen dottergelb oder orangeroth, einzeln oder zu zweien an den Spitzen der Zweige stehend; Früchte schwarz, plattkugelig mit zurückgebogenen Kelchzipfeln. Die Rinde des Holzes ist meistentheils chocoladefarbig. Sie stammt aus Südeuropa und erreicht eine Höhe von 2,50 Meter.

Diese Gattung enthält, wie schon der Name andeutet, nur gelbe Rosen von allerdings nicht angenehmem Geruche, wogegen aber die Blätter um so angenehmer riechen, weshalb sie in Griechenland als Thee benutzt werden. Sie unterscheidet sich auffallend von den anderen Rosen. Alle die hierher gehörigen Varietäten sind hart, sogar die härtesten aller Rosen, verlangen aber zur Entfaltung vollkommener Blüthen eine luftige, sonnige Lage und trocknen Boden. Die Pflanzen werden beim Schneiden gut ausgedünnt, die zum Blühen gelassenen Zweige aber nur um einige Augen eingestutzt.

Wegen ihres etwas überhängenden Habitus eignen sie sich besonders gut zur Bepflanzung von Terrassen.

Bicolor, die Fuchsrose, auch Wiener oder türkische Rose genannt, Blumen auswendig gelb, inwendig sammetartig feuer- oder blutroth, oder kapuzinerbraun, mittelgroß, und obgleich nur einfach, so ist sie doch von herrlichem Effekt.

Double yellow, (lutea plena), Blumen hellgelb, mittelgroß, halbgefüllt, schalenförmig; reich- und frühblühend; Habitus ästig; Wuchs mäßig.

Globe yellow, Blumen mittelgroß, gefüllt, citronengelb, von Kugelform.

Harrisonii, Blumen schön tiefgoldgelb, mittelgroß, halbgefüllt, schalenförmig, reich- und frühblühend; Habitus hängend; Wuchs mäßig. Eignet sich gut zur Trauerrose, sowie auch zum Treiben.

Persian yellow, (persica lutea), die gelbe persische Rose, Blumen glänzend dunkelgoldgelb, zuweilen mit Scharlach gestreift, groß und voll, von schöner Kugelform. Ist wohl die schönste gelbe Landrose, welche sich alljährlich reich mit meistens vollkommenen Blumen bedeckt, während bei den anderen die Blumen bei ungünstiger Witterung sehr häufig fehlschlagen; blüht fast blos an den Spitzen der Zweige, darf daher nur sogleich nach der Blüthe beschnitten werden, oder man muß alljährlich einen Theil der Zweige unbeschnitten lassen. Sie gedeiht gleich gut wurzelächt oder auf Wildling niedrig- oder hochveredelt; in letzterer Weise ist sie reichblühender. Sie läßt sich gut zu größeren Gruppen, mit den gleichzeitig blühenden Varietäten der Pimpinellrose (R. pimpinellifolia), und der Fuchsrose (R. lutea bicolor) vereinigt, verwenden; eignet sich auch zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur und zum Treiben.

7. Rosa sulphurea, Ait. — Rose jaune.

Die gefüllte schwefelgelbe Rose; gelbe Centifolie.

Die Stengel sind braun, glatt, glänzend; Stacheln zahlreich, von ungleicher Größe, gelblich, dünn; Blättchen zu 7, klein, verkehrt-eirund, gesägt, meergrün; Blüthen schön schwefelgelb, stark gefüllt, rund gebaut, wie eine starke Centifolie, geruchlos; Frucht kugelig, drüsig.

Die gelbe Centifolie stammt aus dem Orient. Sie ist ein schön belaubter, 2 bis 2,25 Meter hoch werdender Strauch, schattirt ganz blaugrün und wächst auch üppig. Leider aber entfalten sich die Blumen bei nasser, kalter Witterung nicht und die Knospen bersten. Bisweilen sogar vertrock-

nen die Blumenblätter, noch ehe sich die Blumen völlig geöffnet haben. — Ein alter englischer Rosenzüchter, Namens Hanbury, sagt, daß in dem brennend heißen Sommer des Jahres 1762 alle seine gefüllten gelben Rosen in den wärmsten und völlig südlichen Lagen, sowie auf trockenen Anhöhen, so rein und schön geblüht haben, daß er nicht ein einziges zusammengeschrumpftes Blumenblatt und nicht eine einzige von Würmern zerfressene Knospe gefunden habe. — Will man also die Blumen vollkommen und schön sich entwickeln sehen, so gebe man den Pflanzen einen sonnigen und dabei luftigen Standort, am besten an einer Mauer, wo sie bei anhaltendem Regenwetter leicht durch Fenster oder Decken geschützt werden können. Der Boden sei mehr schwer und nur mäßig kräftig, und man helfe lieber, wenn der Trieb schwach ist, durch einen Düngerguß nach. Der Schnitt muß auch gleich nach dem Flor ausgeführt werden, worauf sich das Holz, welches im nächsten Frühjahre Blumen bringen soll, reichlich entwickelt. Auch darf man nicht versäumen, zu dicht stehendes oder verworren gewachsenes Holz auszuschneiden.

Jaune double, Blumen groß, sehr voll, gesättigt glänzend gelb, kugelförmig.

Pompon jaune, Blumen klein, gefüllt, gelb.

Sulphurea pumila, (nana minor), mit niedrigerem Stengel und kleinen starkgefüllten Blumen.

8. Rosa centifolia, L. und centifolia hybrida — Rose centifeuille.

Die Centifolienrose, Centifolie, Gartenrose und ihre Hybriden.

Die Stacheln sind stark zusammengedrückt; die 5- bis 7-zähligen Blätter nicht bleibend, abfallend; die Blättchen doppelt- und drüsig gesägt, beiderseits weich-flaumhaarig und drüsig. Die Nebenblätter an den Zweigen sind von gleicher Form und Größe, der Länge nach mit dem Blattstiel verwachsen, die obern Zipfel frei; die Blüthen stehen einzeln oder in Dolden beisammen; die Blumen roth, stets gefüllt, wohlriechend. Griffel frei, nicht mit einander verwachsen.

In den Wäldern des östlichen Kaukasus und in Persien wächst sie wild, kann bis 18 Grad Kälte ertragen. Aus Italien kamen um 1322 die ersten Centifolien nach England. Sie ist es, welche als die eigentliche Königin der Blumen gilt. Zu einem kräftigen Wachsthume und einer vollkommenen Entwickelung ihrer Blüthen verlangen sie einen reichen und durch

Beimischung von vollständig verrottetem Dünger oder Kompost gekräftigten Boden und einen mehr sonnigen als schattigen Standort. Ein Düngerguß leistet zur Zeit, wo das Laub auszubrechen beginnt, ebenfalls sehr gute Dienste. Nur mit Ausnahme einiger kräftig treibenden Sorten werden sie auf 2 bis 3 Augen geschnitten. Am besten gedeihen sie wurzelächt, können aber auch hoch- und niederstämmig veredelt gezogen werden. Die gewöhnliche Centifolie liefert, wie schon früher an geeigneter Stelle bemerkt wurde, vortreffliche Unterlagen zu Topfveredlungen.

Bullata, die Kopfkohlrose, Salatblättrige Centifolie, Lattichrose, sehr stachelig; Blättchen sehr groß, blasig gewölbt, einfach gesägt; Blumen groß, voll, rosenroth, von vollkommenem Centifolienbau. Merkwürdig schön und obgleich älteren Ursprungs, so erregt ihr Anblick doch immer wieder neue Bewunderung. Wurzelächt eignet sie sich zur Bildung von Gruppen, auf Hochstamm veredelt zur Kugel- und Pyramidenform.

Communis, die gewöhnliche, allbekannte Gartencentifolie. Eignet sich zur Bildung von Gruppen und sehr gut zum Treiben für den Winter, jedoch erst vom Januar ab, sowie auch ihre anderen zum Treiben geeigneten Varietäten.

Comtesse de Ségur, Blumen mittelgroß, voll, zart rosa. Ist eine ausgezeichnet schöne Rose, welche sich wurzelächt sehr gut zur Säulenform eignet, auf Hochstamm veredelt zur Kugel- und Pyramidenform; ist auch zur Topfkultur verwendbar.

Cristata, die Kammrose, Blumen rosenroth mit Lila, die zierlich gebildeten, hahnenkammartigen, halbgefiederten und mit zierlichen Einschnitten versehenen Kelchblätter geben ihr ein reizendes Ansehen. Sie bildet gleichsam den Uebergang zu den Moosrosen. Eignet sich wurzelächt zur Bildung von Gruppen, sowie zum Treiben im Winter, und nimmt sich, hochstämmig veredelt und in Kugelform gezogen, besonders schön aus.

Dométille Becar, Blumen groß, leuchtend rosa, weiß bandirt; eine der schönsten bunten Rosen.

Lady Stuart, Blumen groß, von vollendet schöner Kugelform, zart weißfleischfarben, sehr reichblühend. In jeder Beziehung eine der schönsten Sommerrosen.

Minor, kleine Centifolie, große Pomponrose; Stengel niedriger, Stacheln und Blumen kleiner als bei der gemeinen Centifolie; Blumen gefüllt, rosenroth, weniger geschlossen, als bei der großen Centifolie. Eignet sich zur Einfassung von Beeten und läßt sich gut zum Treiben verwenden.

Parviflora, das Dijonröschen, Burgunderröschen; Blumen sehr klein, voll, schalenförmig, dunkelroth. Als Einfassung von Beeten brauchbar.

Pompon carné, Blumen klein, blaßfleischfarben mit dunklerem Herz. Wie die vorige zu verwenden.

Pompon de Bourgogne à fleurs blanches, weißes Dijonröschen; Blumen weiß mit kirschrothem Centrum, sehr klein, von der Größe einer Bellis und schön schalenförmig gebaut. Wie die vorigen zu verwenden.

Princesse Caroline, (speciosa), Blumen von ungewöhnlicher Größe, rosa; die Knospen sind sehr zierlich mit langen Kelchblättern umgeben. Eine der werthvollsten Centifolien, welche sich besonders gut auf Hochstamm macht.

Unica, (Unique blanche), die weiße Centifolie, Blumen groß und voll, schalenförmig, weiß; Wuchs aufrecht und kräftig; bekannt als eine der edelsten weißen Rosen. Eignet sich zur Bildung von Gruppen, sowie zur Säulenform, auf Hochstamm veredelt zur Kugel- und Pyramidenform, blüht oft im Herbste noch einmal; läßt sich auch gut treiben.

Unique panachée, Blumen groß, voll, weiß, blaßroth gestreift, von schöner Schalenform; wechselt oft in der Farbe, denn es kommen zuweilen ganz weiße und ganz rothe Blumen vor. Damit die Panachière konstant bleibt, ist es gerathen, die Pflanzen etwas mager zu halten. Wuchs aufrecht, kräftig; Triebe sehr stachelig. Ist eine der schönsten gestreiften Rosen; eignet sich zur Bildung von Gruppen und zur Säulenform.

9. Rosa centifolia muscosa, Ait. — Rose mousseuse.

Die Moosrose.

Ist eine Varietät der vorigen, durch ihre drüsig-moosblättrigen Kelche und Blüthenstiele von ihr aber unterschieden. Man nimmt allgemein an, daß die Moosrose ein Naturspiel der Centifolie und nicht durch Samen, wie die meisten Varietäten, entstanden sei, sondern durch einen Zweig der Centifolie, welcher Blumen brachte, die sich im Charakter von den andern ihres Gleichen unterschieden — Blumen, die in Moos gehüllt waren. Wahrscheinlich entstand die erste weiße Moosrose Unica, (Unique de Provence) durch eine Ausartung eines Exemplars oder eines Zweiges der weißen Centifolie (Unica), welcher in Moos gehüllte Blumen erzeugte; von

dieſem Zweige ward vermehrt, und die ſo vermehrten Pflanzen behielten ihren mooſigen Charakter.

Durch umſichtige Kultur und Hybridiſirung ſind beſonders durch franzöſiſche, belgiſche und engliſche Roſenzüchter eine große Anzahl von Spielarten erzeugt worden, und es gehen mit jedem Jahre noch mehr neue und prachtvolle hervor, beſonders auch remontirende, in deren Form der reizende Centifolienbau ſich mehr und mehr veredelt, in deren Kolorit die zarteſten Nüancen auftreten, deren Knospen, Blumen und Blattſtiele, mit zierlichem, verſchiedenartig gefärbtem, balſamiſch duftendem Mooſe bekleidet ſind. Die Mooſroſe verlangt ſtets einen kräftigen, mäßig trocknen und warmen Boden bei freier Lage, der alljährlich durch Zufuhr von gutem Kompoſt bereichert werden ſollte. Wo dies ihnen nicht geboten werden kann, ſollten nur die härteſten, und dieſe auf die Hundsroſe veredelt, kultivirt werden. Sie eignen ſich zu Hoch- und Niederſtämmen. Am dankbarſten erweiſen ſie ſich wurzelächt, oder auf den Wurzelhals veredelt, und der Flor iſt um ſo reichlicher, je energiſcher der Schnitt geübt wird, wovon aber die ſtarkwüchſigen Sorten eine Ausnahme machen, indem ſie nur einen mäßigen Schnitt vertragen.

Die mooſähnliche Maſſe, welche die Blumenknospen dieſer Roſen umgiebt, iſt ein hinlängliches Unterſcheidungszeichen, aber unter ſich ſind ſie insgeſammt im Bau ſehr verſchieden, ebenſo im Habitus und in der Kräftigkeit des Wuchſes.

Africaine, Blumen mittelgroß, dunkelviolettroth, braun bemooſt.

A long pédoncule, Bouquet-Mooſroſe, Blumen mittelgroß, zartroſa fleiſchfarben, in ſchönen großen Dolden ſtehend, gelbolivengrün bemooſt, ſtarkwachſend; eignet ſich zu hohen Pyramiden. Eine ſehr ſchätzbare Roſe.

Aristides, Blumen groß, purpur mit karmoiſinſammet.

Baron de Wassenaër, Blumen groß, gefüllt, von ſehr regelmäßigem Kugelbau, ſchön karminroth, Rückſeite der Blumenblätter lila und weißlich, in großen aus 20 bis 30 Blumen beſtehenden Dolden blühend; Wuchs kräftig, daher zur Säulenform ſich eignend.

Blanche de Bath, (Blanche virginale, White Bath der Engl.), Blumen groß, voll, kugelig, weiß, bisweilen ſtreifige oder einzelne ganz roſenfarbene Blumenblätter bringend, gut bemooſt; ausgezeichnet in der Knospe; Wuchs aufrecht, mäßig. Eine der ſchönſten weißen Mooſroſen, von überaus zarter und weicher Färbung und vollendet ſchönem Centifolienbau. Leider aber iſt ſie ſehr wähleriſch und verliert an Werth, wenn Klima und Boden ihr nicht zuſagen. Eignet ſich ſehr gut zur Topfkultur.

Blanche Simon, Blumen rein weiß, mit grünlichem Centrum, groß, voll, von flachem Bau.

Boursier de la Rivière, Blumen feurig dunkelroth, groß, voll, schön gebaut.

Captain John Ingram, Blumen fast schwarzpurpurn und sammtig mit feurigem Reflex, groß, gefüllt von schöner Form; Wuchs mäßig. Eine der dunkelsten und prächtigsten Moosrosen.

Celina, Blumen groß, voll, von flacher Form, hochrosa mit karmoisinrother und purpurner Schattirung, zuweilen durch die Mitte des Blumenblattes nach dem Centrum ein weißer Streif gezogen; brillante Farbe beim Aufblühen; reich mit dunkelbraunem Moos besetzt; wird in ihrer Art von keiner anderen neueren Rose übertroffen; sie bildet einen kräftigen und dichten Busch von bewundernswürdigem Blüthenreichthum. Wenige Rosen eignen sich so gut, wie sie, zur Bepflanzung von ganzen Gruppen, sie eignet sich aber auch gut zur Stammrose.

Communis, die alte gewöhnliche Moosrose, welche bis auf den heutigen Tag als Modell der Vollkommenheit gilt; Blumen groß, voll, blaßroth, kugelförmig, gut bemoost; Wuchs kräftig; schönes Blattwerk. Gedeiht eben so gut hoch- und niederstämmig veredelt, als wurzelächt und eignet sich gut zum späteren Treiben.

Comtesse de Murinais, Blumen groß und schön gefüllt, schalenförmig, blaßfleischfarben im Aufblühen, bald in Weiß übergehend; an Form und Färbung zwar etwas geringer als Blanche de Bath, aber dafür kräftiger und überall gedeihend, was diese nicht ist. Verlangt einen mäßigeren Schnitt und eignet sich sowohl zur Säulenrose, als zur Stammrose.

Eugène Verdier (Eug. Verdier) 1873, Blumen sehr groß, gut gefüllt, schön gebaut, prächtig karmoisinroth, Centrum leuchtender.

Gloire des mousseuses, Blumen groß, voll, fleischfarbigrosa, mit dunklerem Centrum, reichlich bemoost; die Blumenblätter dachziegelartig liegend, im Centrum gefaltet. Eignen sich gut zur Topfkultur.

Gracieuse, Blumen groß, dunkelpurpur mit karmoisinscharlach, sammetig und tiefblauvioletter Schattirung, dunkelolivenbraun bemoost; sehr schön.

Gracilis, (Minor, Prolifique), Blumen hochrosa, klein und voll, kugelförmig, gut bemoost; sehr reichblühend; Wuchs mittelmäßig; schön belaubt. Ausgezeichnet zur Bildung von Gruppen, sowie als Stammrose; auch zur Topfkultur zu empfehlen.

Jean Bodin, Blumen groß, prächtig lila, roſenroth, dicht gefüllt und von vollendet ſchönem Centifolienbau.

Joséphine, Blume groß, leuchtend dunkelroſenroth, olivengrün bemooſt; eine der prächtigſten Centifolien-Moosroſen.

Lanei, Blumen groß, voll, kugelförmig, glänzend karmoiſinroſa, zuweilen mit purpurähnlichem Anſtrich; Knospen groß, ſchön in der Form beim Aufblühen, ſtark bemooſt; Laub ſehr kräftig. Auch zur Topfkultur geeignet.

Madame de la Roche Lambert, Blumen groß, prächtig amarantroth, dicht gefüllt und ſchön gebaut; eine ſehr ſchätzbare Moosroſe.

Marie de Blois, Blumen ſehr groß, voll, kugelförmig, hellroſa mit atlasartigem Lilaſchimmer. Erreicht zwar nicht die Schönheit der vorigen, verdient aber dennoch empfohlen zu werden, zumal ſie ſich auch ſehr gut zur Topfkultur eignet.

Multiflore, Blumen klein, in großen Dolden beiſammenſtehend, beſonders ſchön auf Hochſtamm veredelt.

Nuit de Young, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, dunkelſammetpurpurn, olivenbraun bemooſt; eine der dunkelſten Moosroſen. Auch zur Topfkultur geeignet.

Princesse Adélaïde, Blumen glänzend hellroſa, von flachem Bau, groß und voll, in Büſcheln ſtehend. Eine der am kräftigſten wachſenden Moosroſen, deren Laub ſich bis in den Winter hinein grün erhält, daher zur Bekleidung von Säulen, Wänden, Lauben ꝛc. vorzüglich paſſend; erreicht eine Höhe von 3 Meter und noch höher, und erfordert denſelben Schnitt wie alle ſtarkwachſenden Roſen.

Princesse royale, Blumen lachsfarben, von mittlerer Größe, aber vollkommen in Form, beſonders wenn der Strauch kräftig geſchnitten wurde; gut bemooſt; Blumenſtiele ſehr aufrecht; Blüthen in zahlreichen Rispen. Eignet ſich zur Säulenform und zur Topfkultur.

Reine blanche, Blumen rein weiß, groß, voll, ſehr regelmäßig gebaut, aber etwas flach.

Soeur Marthe, Blumen groß, voll, roſa mit dunklerem Centrum, gut bemooſt; Wuchs aufrecht und kräftig, darf daher nur mäßig beſchnitten werden. Zur Säulenform geeignet.

Unique de Provence, Blumen rein weiß, nach dem Aufblühen bisweilen lackroth gefärbt, gut bemooſt, ſchalenförmig; Wuchs aufrecht und in gutem Boden kräftig; Triebe ſehr ſtachelig. Man vermuthet, daß es ein Naturſpiel von der Unica oder weißen Centifolie ſei. Die ſchönſte der

weißen Moosrosen, zeigt in allen den Habitus der weißen Centifolie. Zum späteren Treiben geeignet.

William Lobb, Blumen mittelgroß, in zahlreichen prächtigen Doldentrauben blühend, dunkelviolett schattirt mit azurblau; sehr schön.

10. Rosa centifolia muscosa bifera — Rose mousseuse perpétuelle.

Die mehrmals blühende Moosrose.

Die Abstammung der mehrmals blühenden Moosrose läßt sich von einer Hybridisirung derselben mit den indischen und Remontanterosen herleiten. Sie ist hauptsächlich dadurch werthvoll, weil sie den Flor der einmal blühenden fortsetzt. Sie erfordert einen ziemlich reichen Boden und einen kurzen Schnitt. Am besten gedeihet sie in veredeltem Zustande und macht sich am schönsten auf Stämmen von mittlerer Höhe.

Abel Carrière, Blumen violettroth, leuchtend roth umrandet, mittelgroß, nicht ganz gefüllt, kugelförmig; ziemlich kräftig wachsend; Aeste kurz mit zahlreichen braunen Stacheln; Blätter dunkelgrün; die jungen Blätter erscheinen völlig roth, und die jungen Zweige und Knospen sind reichlich bräunlich bemoost. Remontirt sehr gut.

Alfred de Damas, Blumen rosa, weißfleischfarben umrandet, voll und rund gebaut, in großen Dolden stehend und sehr lange blühend, gelbbraun bemoost. Sehr empfindlich, verlangt daher gute Bedeckung.

Césonie, Blumen mittelgroß, voll, karminroth, in großen Bouquets blühend.

Clémence Robert, Blume groß, gefüllt, in Büscheln blühend, becherförmig, vollkommene Form, sehr leuchtend rosa, ins Lila übergehend veränderlich in dieser Farbe, sehr bemoost und wohlriechend.

Eugène de Savoye, Blumen groß, gefüllt, leuchtend roth.

Eugénie Guinoisseau, Blumen groß, gefüllt, schöne Form, kirschroth, ins Violett übergehend, kräftig und sehr bemoost.

Fornarina, Blumen mittelgroß, gefüllt, lebhaft karminroth.

Général Drouot, Blumen mittelgroß, halbgefüllt, aber schön gebaut, purpurkarmoisin; ziemlich kräftig wachsend; Blätter schön bräunlich-olivengrün; die Triebe sind mit feinen rothbraunen moosähnlichen Stacheln völlig überzogen. Zur Topfkultur geeignet.

Gloire d'orient, Blumen mittelgroß, voll, dunkelrosa, sehr stark bemoost.

Hortense Vernet, Blumen weiß mit lilarosigem Herz, von schönem Bau.

James Veitch, Blumen mittelgroß, gefüllt, feurigroth mit Schieferfarben, in Büscheln beisammenstehend; remontirt gut; Wuchs kräftig.

Impératrice Eugénie, Blumen lebhaft rosa mit dunklerem Herz, mittelgroß, gefüllt; vollkommen schön gebaute zarte Prachtrose; ist schwer bei guter Gesundheit zu erhalten; Wuchs mäßig. Eignet sich besser zur Topfkultur als fürs freie Land.

Madame Charles Salleron, Blumen groß, gut gebaut, öffnet sich leicht und ist karmoisinroth mit blendendem Feuerroth.

Madame de Staël, Blumen fleischfarbenrosa, mittelgroß, voll, von schönem Bau.

Madame Édouard Ory, Blumen groß, dicht gefüllt, feurig karmoisinrosa, hellumrandet, von vollendet schönem Centifolienbau; Wuchs kräftig, die Belaubung graugrün, die Spitzen und jungen Blätter röthlichbraun. Zeichnet sich ganz besonders dadurch aus, daß die aufrechten, sehr stacheligen graugrünen Zweige je fünf Blumen tragen. Eine der schönsten dieser Gruppe.

Madame Moreau (Moreau) 1873, Blumen sehr groß, gut gefüllt, öffnen sich leicht, schön zinnoberroth und weiß gestrichelt; soll die schönste und reichblühendste ihrer Gattung sein.

Madame Platz, Blumen mittelgroß, gefüllt, flach, schön imbriquirt, vollkommene Form, sehr leuchtend rosa, in Zartrosa übergehend, wohlriechend, kräftig und reichlich blühend.

Madame Ponctuée, Blumen mittelgroß, voll, kirschroth, weißpunktirt.

Madame Soupert, Blumen mittelgroß, gefüllt, in Dolden blühend, Centrum rosettförmig, leuchtend kirschroth.

Madame William Paul, Blumen groß, gefüllt, becherförmig, schön hellroth oder leuchtend rosa, sehr blühbar.

Maria Leszinska, Blumen mittelgroß, gefüllt, kugelförmig, hellroth mit Nüancen, sehr reichblühend und gut remontirend.

Maupertuis, Blumen mittelgroß, voll, dunkelsammetigroth.

Micaëla, Blumen groß, gefüllt, rosettförmig, leuchtend kirschroth, kräftig und sehr blühbar.

Perpétuelle Mauget, Blumen leuchtend rosa, mit dunklerem Herz, mittelgroß, voll, schalenförmig; Wuchs mäßig. Sie ist die älteste dieser Gruppe und steht vom Frühjahre bis zum Herbste in ununterbrochener Blüthe.

Pompon perpétuelle, Blumen klein, voll karmoisinrosa.

Quatre saisons mousseuse blanche, Blumen rein weiß, leicht gefüllt, in sehr großen gelbgrünen bemooften Dolden stehend; prächtig belaubt; vielleicht die interessanteste dieser Gruppe.

René d'Anjou, Blumen dunkelrosa, in Zartrosa übergehend, mittelgroß, voll, kugelförmig; die Blumen stehen meistens blos einzeln auf den Trieben, ist aber eine sehr schöne Rose, die auch gut remontirt.

Salet, Blumen groß, gefüllt, lebhaft rosa, bei den äußeren Blumenblättern in Hellrosa übergehend, schön gebaut; üppig belaubt; von kräftigem Wuchs und hart.

Sophie de Marsilly, Blumen mittelgroß, beinah flach, schön leuchtend rosa und weißpunktirt, kräftig und sehr bemooft.

Souvenir de Pierre Vibert, Blumen groß, voll, dunkelroth, karmin und bischofsviolett schattirt.

II. Rosa bifera hybrida — Rose hybride remontante.

Die mehrmals blühende Hybride; Remontante-Rose.

Ein fester, allgemeiner Charakter läßt sich bei den Remontante-Rosen nicht aufstellen, da die hierher gehörenden Varietäten ächte Hybriden von unbestimmter Abstammung, zur Mehrzahl aber durch Kreuzungsbefruchtung zwischen der öfter blühenden Damascener-Rose mit Bourbon-, Thee-, Bengal- und Noisetterosen entstanden sind, daher eine von einander oft weit abweichende Verschiedenheit zeigen.

Ein großer Theil der hierher gehörigen Varietäten hat das Ansehen von Bourbonrosen. Der Wuchs ist bald kräftiger, bald schwächer; das Holz fest, die Stacheln glatt und spitzig; die Fiederblättchen rundlich, etwas zugespitzt, auf der Oberfläche glänzend, stark gezähnt, mit sehr hervortretenden Nerven. Die Blumen sind meist von centifolienartiger Füllung und prangen vom tiefsten Dunkelroth und Violett bis zur zartesten Fleischfarbe und Weiß. Sie haben einen sehr angenehmen, bald schwächeren, bald stärkeren Duft und stehen meistens auf der Spitze der Zweige zu einem Bouquet vereinigt, seltener einzeln.

Man hat von der Remontante auch noch eine Unterabtheilung gebildet, die sogenannte Rosomenen-Rose (Rose de Rosomène), welche zwischen den Remontante- und Bourbonrosen steht. Die hierzu gehörigen Sorten zeichnen sich durch die feurigsten, leuchtendsten und dunkelsten Farben und einen sehr reichen und anhaltenden Flor aus. Aber durch gegenseitige Hybridisirung der gewöhnlichen Remontanten und Rosomenen und den da-

durch in den letzten Jahren entstandenen großen Zuwachs haben sich die Grenzen zwischen beiden immer mehr verwischt, weshalb ich sie auch nicht getrennt anführe.

Eine ziemliche Anzahl der Remontanten ertragen unsere gewöhnlichen Winter ohne allen Schutz im Freien, und es ist in dieser Beziehung zu weiteren Versuchen anzurathen. Die meisten sind von zarterer Natur und müssen durch eine leichte Bedeckung geschützt werden. Sie gedeihen bei gewöhnlicher Behandlung in jedem humusreichen Boden und lassen sich gleich gut auf Wildling veredelt oder wurzelächt erziehen und eignen sich zum großen Theil auch zur Topfkultur. Zum Treiben läßt sich ebenfalls eine große Anzahl verwenden.

Abbé Bramerel, (Guillot fils) 1872. Blumen sehr groß, gefüllt, von schöner Form und guter Haltung, glänzend karmoisinroth mit braunpurpur und dunkelsammetig nüancirt; sehr effektvoll.

Abbé Giraudier, Blumen groß, voll und gut gebaut, gute Haltung, Wuchs kräftig, röthlich kirschroth, sehr blühbar.

Abd-el-Kader, Blumen groß, voll, dunkelsammetartigpurpur mit Hellroth nüancirt.

Abel Grand, Blumen weißrosa mit Atlasglanz, groß voll und schön gebaut; sehr reichblühend.

Abraham Lincoln, Blumen groß, voll und gut gebaut, schwärzlichpurpur, sehr schön.

Achille Gonod, Blumen lebhaft karminroth, groß, gefüllt, in Büscheln beisammenstehend; Wuchs kräftig.

Adèle Maugé, Blumen prächtig hellrosa-fleischfarben, in reichen Bouquets blühend.

Adeline Patti, Blumen groß, voll, gut gebaut und von guter Haltung, lebhaft rosa-karmin; sehr blühbar.

Adolphe Brongniart, Blumen groß, voll, gut gebaut, leuchtend karminroth.

Adrien Marx, Blumen sehr groß, lebhaft kirschroth, voll und schön gebaut.

Adrienne de Montebello, Blumen groß, gefüllt und von schönem, flachen Bau, seidenartig rosa.

Alba carnea, Blumen mittelgroß, voll und schön gebaut, weiß mit rosa Schein und rein weißen Rückseiten der Blumenblätter.

Alba floribunda, Blumen mittelgroß, voll und schön gebaut, sehr frisch fleischfarben, in rein Weiß übergehend.

Albion, Blumen groß, voll, sehr schön kugelförmig, scharlach kirschroth.

Alexandre Dumas, Blumen schwarzsammetig karmoisinroth mit Hochroth gestreift, groß, voll und schön gebaut.

Alexandrine Backmeteff, Blumen groß, gefüllt, feurig dunkelroth, schalenförmig; Wuchs kräftig. Eignet sich gut zur Säulen- und Pyramidenform, wegen ihres dankbaren Blühens zur Gruppenrose, sowie auch zur Topfkultur. Hat sich an vielen Orten als hart bewährt.

Alexandrine de Belfroy, Blumen glänzend rosa, weiß punktirt, groß, sehr voll; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Alfred Colomb, Blumen groß, voll und gut gebaut, sehr leuchtend, feuerroth, erinnert an die Prachtrose Charles Lefebvre; eine Prunkrose von großem Effekt.

Alfred de Rougemont, Blumen groß, voll und gut gebaut purpurkarmoisin mit Feuerroth schattirt; eine der dunkelsten Prachtrosen.

Alpaïde de Rotalier, Blumen groß, gefüllt, schön hellrosa.

Alphonse Damaizin, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt und gut gebaut, leuchtend scharlach, dunkel umrandet, in Dolden stehend.

Alphonse Fontaine, Blumen groß, voll und schön gebaut, karminroth, leuchtend kirschroth schattirt.

Alphonse Karr, Blumen fleischfarbenrosa, mit dunklerem Herz und ausgezackten Blumenblättern, mittelgroß, sehr voll, von schönem Centifolienbau; mäßig wachsend. Zur Topfkultur geeignet.

Amiral Lapeyrouse, Blumen sammetigroth mit dunkelviolett, purpur und feurigem Reflex; groß, voll und sehr reichblühend; von großem Effekt.

André Dunant (Guillot père), 1872, Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, zartrosa, Centrum frischer Umfangsblumenblätter silberig; Wuchs kräftig; stammt von Victor Verdier.

André Fresnoy, Blumen groß, voll und gut gebaut, leuchtend roth, purpur schattirt; Wuchs kräftig.

André Leroy, Blumen groß, gefüllt, weißlich rosa, sehr blühbar.

André Leroy d'Angers, Blumen sehr groß, voll und gut gebaut, dunkelviolett; eine Prachtrose in dieser Färbung.

Anna Alexieff, Blumen rosa, mit Lachsfarben nüancirt, groß, voll, gewöhnlich in Büscheln stehend; sehr reichblühend; schön belaubt; Wuchs kräftig; remontirt sehr gut und ist ziemlich hart. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, sowie zur Bildung von höheren Gruppen; besonders ist es eine vorzügliche Treibrose.

Anna Diesbach, Blumen ſehr groß, voll, zuweilen etwas weniger voll, feurig roſa mit Karmin, ſilberfarben nüancirt, Blumenblätter ſehr groß. Eignet ſich zur Pyramiden- und Säulenform, verlangt aber guten Winterſchutz.

Annie Laxton (Laxton), 1873, Blume mittelgroß, gefüllt, ſchöne Form, friſch roſa, mit karmoiſin und kirſchroth nüancirt.

Antoine Alléon (Damaizin), 1873, Blumen groß, gefüllt, vollkommen imbriquirt, ſehr leuchtend kirſchroth.

Antoine Ducher, Blumen ſehr groß, gefüllt, ſchön gebaut, kugelförmig, glänzend roth; Wuchs kräftig. Sämling von Madame Domage, größer und dunkler als dieſe.

Archevêque de Paris, Blumen ſammetig purpurviolett auf feurigem Reflex, groß, voll und ſchön gebaut.

Ardoisée du Chalet, Blumen mittelgroß, gefüllt, purpurſchieferfarben, mit karminviolett und feurigem Reflex; ſehr reichblühend.

Aristide Dupuis, Blumen groß, voll, von ſchöner Haltung, feuerroth geflammt und bordirt; Prachtroſe von wundervollem Kolorit.

Armide, Blumen groß, voll, von ſchönem Schalenbau, roſa, mit lachsfarbigem Schein; iſt dornenlos; remontirt ſehr gut. Hat ſich als hart bewährt.

Arthur Sansal, Blumen ſchwärzlichpurpur mit violettem Sammet und feurigem Reflex, ſehr groß, dicht gefüllt und vollendet ſchön gebaut; ſehr dankbar blühend. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet; friert aber im Winter gern zurück, verlangt daher gute, trockne Bedeckung.

Aspasia, Blumen groß, gefüllt, ſehr ſchön geformt, hellroſenroth, mit dunkler kolorirtem Centrum; Wuchs kräftig.

August Rigotard (Guillot père), 1872 Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, kirſchroth mit weißlichen Reflexen.

Auguste Mie, Blumen ſehr groß, voll, ſchön, glänzend roſa, ſchalenförmig. Zur Bildung von Gruppen, ſowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Auguste Neumann, Blumen groß, voll, ſchön gebaut, brillant ponceau mit violetter Schattirung und oft weiß gefleckt.

Aurore, Blumen groß, gefüllt, hellroſa, Centrum kupferig, Rückſeite der Blätter roth.

Aurore du matin, Blumen ſehr groß, gefüllt, aurorafarbig, Rückſeite der Blumenblätter weiß.

Baptiste Desportes, Blumen groß, voll, gut gebaut, leuchtend scharlachroth, sehr reichblühend.

Baron Adolphe de Rothschild, Blumen groß, leuchtend feuerroth, oft mit weißen Spitzen; eine volle, schön gebaute Effektrose. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Baron de Rothschild, Blumen groß, gefüllt, dunkelkarmoisinroth mit violett.

Baron Hausmann, Blumen groß, voll und schön gebaut, prächtig karminroth.

Baron Lassus de St. Geniez, Blumen groß, voll und gut gebaut, kirschroth mit seidenartig-fleischfarbigem Rosa.

Baronne de Maynard, Blumen sehr schön weiß, mittelgroß, voll und gut gebaut.

Baronne de Hallez-Claparède, Blumen groß, voll, von sehr schöner Form, lebhaft karminroth, sehr angenehm duftend; reichblühend; Wuchs aufrecht, mäßig. Eine vorzügliche Rose, auch für den Topf.

Baronne Louise Oxkul (Guillot fils), 1872, Blume sehr groß, gefüllt, becherförmig, sehr gut gebaut und von guter Haltung, prächtig glänzend karminrosa, sehr wohlriechend, von kräftigem Wuchse und sehr reichblühend.

Baronne Prévost, Blumen sehr groß, voll, glänzend rosa, Form kompakt; Wuchs aufrecht, kräftig. Eignet sich zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur und zum Treiben.

Béatrix, Blumen groß, voll und von schönem Centifolienbau, leuchtend karminrosa mit hellerem Herz.

Beauté française, Blumen dunkelblutroth, mit violettem Sammet, sehr groß und gut gebaut; prachtvoll.

Beauty of Waltham, Blumen sehr groß und voll, leuchtend roth.

Belle Normande, Blumen sehr groß, voll und rund gebaut, zartrosa mit Silberschein, ähnlich der Rose la reine; von kräftigem Wuchse.

Belle rose, Blumen sehr feurig hellrosa, ungewöhnlich groß, dicht gefüllt, von vollendet schönem Bau und guter Haltung.

Bernard Palissy, Blumen groß, voll, röthlichkarmin; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Berthe Baron, Blumen groß, gefüllt und gut gebaut, prächtig rosa, weißlich umrandet.

Bessie Johnson (Curtis et Co.), 1873, Blumen sehr groß, gefüllt, hellfleischfarbig, sehr wohlriechend.

Blanche de Méru, Blumen mittelgroß, von ſchönem vollen Bau, in Büſcheln ſtehend, weiß, im Aufblühen leicht roſa.

Boule de neige, Blumen mittelgroß, gefüllt, rein weiß.

Bouquet de Marie, Blumen groß, gefüllt, grünlich weiß.

Bürgermeister Carl Müller (Soupert et Notting), 1873, Blumen groß, gefüllt, päonienförmig, amarantroth, feurig ſammetig-ſchwarz, violett und zinnoberroth nüancirt, ſpäter in lebhaft Kirſchroth übergehend, veränderlich; ſehr wohlriechend.

Camille Bernardin, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, leuchtend roth mit Weiß umrandet; eine ſehr werthvolle Roſe.

Candide, Blumen mittelgroß, gefüllt, von ſchöner Form und Haltung, weißfleiſchfarben, in Weiß übergehend, ſehr blühbar und wohlriechend.

Capitaine Lamure (Levet), 1872, Blumen groß, gefüllt, vollkommene Form, dunkelroth in Violett übergehend; ſehr ſchön und von kräftigem Wuchſe.

Capitaine Paul, Blume groß, voll und gut gebaut, leuchtend roth.

Cardinal Patrizzi, Blumen blendend roth, mit Bräunlichpurpur ſchattirt, mittelgroß, voll und ſchön gebaut; eine der ſchönſten älteren dunkeln Roſen.

Carl Capelle (J. Wft.), Blumen groß, voll, nach dem Centrum roſettförmig, roſa mit hellſchieferfarben nüancirt; von Génie de Chateaubriand abſtammend und wie dieſe geformt.

Carl Coers, Blumen ſehr groß, voll, dunkelpurpurn; Blätter und Zweige dunkelgrün; Wuchs kräftig; eine ſehr ſchöne Roſe.

Caroline Sansal, Blumen groß, voll, hellfleiſchfarben, mit roſigem Centrum, kugelförmig; Wuchs aufrecht, kräftig. Eignet ſich zur Pyramiden- und Säulenform, ſowie auch zur Topfkultur. Eine prächtige Roſe, welche aber leider nur bei gutem Wetter und vielem Sonnenſchein gut aufblüht.

Charles Fontaine, Blumen groß, voll, dunkelroth, purpur ſchattirt und mit feurigem Reflex, ſehr reichblühend.

Charles Lée, Blumen groß, ſehr gefüllt, gut gebaut, ſehr friſch dunkelzinnoberroth, auf kurzen ſtarken Stielen ſtehend; Wuchs üppig, Zweige hellgrün, aufrecht, mit ungleichen hellrothen Stacheln; Belaubung dunkelgrün.

Charles Lefebvre, Blumen ſehr groß, feurigroth, mit purpurnem Herz, voll und von ſchön gewölbtem Schalenbau, mit feſten und ſubſtanzreichen Blumenblättern. Eignet ſich zur Pyramiden- und Säulenform, ſo-

wie auch zur Bildung von niedrigen Gruppen, da sie kurzen Schnitt verträgt; eine Prunkrose ersten Ranges.

Charles Margottin, Blumen groß, gefüllt, blendend karminroth mit feurigrothem Herz.

Charles Rouillard, Blumen groß, von prächtigem Bau, sehr schön hellrosa.

Charles Turner, Blumen groß, voll, von schönem becherförmigen Bau, glänzend feuerroth.

Charles Verdier, Blumen sehr groß, gefüllt, von schöner Form, schön rosafleischfarbig, weiß gerandet; Wuchs kräftig. Sämling von Victor Verdier.

Charles Wood, Blumen groß, voll und gut gebaut, tief dunkelroth schattirt mit Schwarz; eine Prachtrose ersten Ranges.

Château Brussow, Blumen sehr groß, schön und gut gebaut, hellfleischfarbenrosa.

Christian Püttner, Blumen groß, voll, leuchtend purpur; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Claude Levet (Levet), 1873, Blumen groß, gefüllt und gut gebaut, sehr schön sammetig-johannisbeerenroth, sehr wohlriechend.

Claude Million, Blumen groß, gefüllt, schalenförmig, schön karminscharlach, erhellt mit Rosa und Violett. Eine vorzügliche Rose; auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Colonel de Rougemont, Blumen sehr groß, voll, hochroth, mit Karmin nüancirt, schön gebaut. Etwas zärtlich, erfordert kurzen Schnitt und reichen Boden zu ihrem Gedeihen. Eignet sich zu niedrigen Gruppen, sowie zur Topfkultur.

Comte Alphonse de Serényi, Blumen sehr groß, voll und von vollendet schönem Bau, leuchtend hellroth, nüancirt mit Purpur.

Comte Bobrinsky, Blumen mittelgroß, voll, lebhaft dunkelkarmin, sehr imponirend. Auch zur Topfkultur geeignet.

Comte de Cavour, Blumen groß, voll, purpur mit dunkelschwarzroth, Centrum feurig, von schönem Centifolienbau.

Comte de Nanteuil, Blumen groß, voll lebhaft rosa, kugelförmig, von prächtigem Bau. Hat sich an verschiedenen Orten als hart bewährt.

Comte de Raimbaud, Blumen groß, gefüllt, dunkelkirschroth mit Karmin, sehr schön, von kräftigem Wuchse.

Comte de Ribeaucourt, Blumen groß, voll und gut gebaut, dunkelroth mit leuchtend-karmin.

Comte Litta, Blumen groß, gefüllt, Blumenblätter gewellt, breit, ſammetartig auf feurigem Purpur mit Violett gemiſcht; in großen Büſcheln blühend.

Comtesse Cécile de Chabrillan Blumen groß, gefüllt, glänzend karminroſa, mit ſilberfarbener Rückſeite der Blumenblätter, von prächtiger Haltung und Regelmäßigkeit. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Comtesse de Jaucourt, Blumen groß, gefüllt, von gutem Bau, ſchön roſa-fleiſchfarbig; anmuthig und diſtinkt; Wuchs kräftig.

Comtesse de Vallier, Blumen mittelgroß, voll und ſchön gebaut, dunkelviolettpurpur, nüancirt mit Schwarz und mit feurigem Reflex.

Comtesse d'Oxford, Blumen ſehr groß, voll und ſchön gebaut, leuchtend karmin, roth nüancirt.

Coquette des Alpes, Blumen mittelgroß, voll und ſchön gebaut, weiß mit karmin-ſchattirtem Herz.

Coquette des blanches (Lacharme), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, centifolienförmig; ſchön rein weiß.

Curé de Charantay, Blumen ſehr groß, gefüllt, dunkelpurpur, in Büſcheln blühend.

Denis Hélye, Blumen leuchtend karminroſa, von ungewöhnlicher Größe und auffälligem Effekt.

Deuil du Prince Albert, Blumen feurig dunkelpurpur, groß, voll, von prächtigem Bau. Eignet ſich wegen ihres hängenden Habitus zur Trauerroſe.

Devienne Lami, Blumen groß, voll, von ſehr ſchönem Bau, karminroth.

Docteur Andry, Blumen ſehr leuchtend dunkelkarminroth, groß, voll und von vollkommenem Dachziegelbau; ſehr werthvoll.

Docteur Guépin (Moreau), 1873, Blumen groß, gefüllt, glänzend ſammetigroth; ſtammt von Duc Decazes.

Docteur Henon, Blumen weiß mit gelblichem Schein, mittelgroß, gut gebaut, faſt dornenlos.

Docteur Spitzer, Blumen groß, voll, roth mit Violett, die Rückſeite der Blumenblätter purpur, ſchön gebaut und von leuchtender Färbung.

Dominique Daran, Blumen dunkelſammetpurpur, mit Feuerroth ſchattirt, becherförmig, groß und voll.

Dorothea Krey, Blumen groß, voll und schön gebaut, zart rosa.

Duc Decazes, Blumen purpurkarmoisin, groß, voll, prächtig geformt und von herrlichem Effekt; Wuchs kräftig. Will nur mäßig geschnitten sein und eignet sich zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Bildung von höheren Gruppen.

Duc de Harcourt, Blumen groß, sehr voll und schön gebaut, leuchtend karminroth, sehr reichblühend, von großem Effekt und kräftigem Wuchse. Eine ziemlich harte Rose.

Duc de Rohan, Blumen sehr groß, kugelförmig, feurig roth mit Zinnober schattirt, voll und schön gebaut, Farbe sehr beständig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Duc de Wellington, Blumen sammetartig hochroth, mit schwärzlicher Schattirung und leuchtend feuerrothem Herz.

Duchesse d'Aoste, Blumen groß flach, von sehr breiten abgerundeten Blumenblättern umgeben, lachsrosa.

Duchesse de Cambacérès, Blumen groß, gefüllt, lebhaft rosa, von schönem Bau, überaus angenehm duftend, in Büscheln stehend; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, sowie zur Topfkultur und zum Treiben. Hat sich als hart bewährt.

Duchesse de Caylus, Blumen groß, gefüllt, schön gebaut, leuchtend karminroth. Zu niedrigen Gruppen geeignet.

Duchesse de Magenta, Blumen mittelgroß, gefüllt, rein weiß.

Duchesse de Medina-Celi, Blumen groß, gefüllt, dunkelblutroth; Wuchs kräftig, sehr schöne Belaubung.

Duchesse de Montpensier, Blumen groß, voll, schön rosa mit blasseren Rändern, sehr wohlriechend; gut remontirend; Wuchs aufrecht, kräftig.

Duchesse de Morny, Blumen groß, ziemlich gut gefüllt, von prächtiger Schalenform, rosa, auf der Rückseite heller, auf starken Trieben in Büscheln stehend. Zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Duchesse de Norfolk, Blumen feurig karmoisin, groß, voll, von prächtiger Schalenform und köstlichem Geruch. Zu niedrigen Gruppen geeignet.

Duchessse de Sutherland, Blumen lebhaft dunkelrosa, sehr groß und sehr gefüllt, schalenförmig, sehr wohlriechend; Wuchs aufrecht, kräftig, setzt leicht Samen an. Zur Pyramiden- und Säulenform, zur Bildung von höheren Gruppen, sowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Duchesse d'Orléans, Blumen groß, voll, hortenſienroth, ſchön ſchalenförmig gebaut; kräftig wachſend, verträgt aber kurzen Schnitt, eignet ſich daher zu niedrigen Gruppen, ſowie zur Topfkultur.

Duhamel du Monceau (Charles Verdier), 1873, Blumen groß, gefüllt, leuchtend roth, Centrum ſehr glänzend, äußere Blumenblätter mit bläulich-violett nüancirt.

Dupuy Jamin, Blumen groß, gefüllt, leuchtend kirſchroth.

Édouard Morren, Blumen ſehr groß, voll und gut gebaut, ſehr zart roſakarmin; von kräftigem Wuchſe.

Élie Morel, Blumen ſehr groß, voll und gut gebaut, lilaroſa mit weißen Umfangsblättern.

Elisa Boelle, Blumen groß, gefüllt und gut gebaut, weiß, leicht fleiſchfarben ſchattirt.

Élisabeth Vigneron, Blumen ſehr groß, gefüllt, ſchönes friſches Roſa.

Émile Hausbourg, Blumen groß, voll und von vollendet ſchönem Dachziegelbau, zart ſeidenartig glänzend roſa, weißlich umrandet.

Empereur du Maroc, Blumen dunkelſchwarzbraun mit dickem Sammet, voll und ſchön gebaut, in Büſcheln ſtehend, eine der dunkelſten und prachtvollſten Remontanten. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, ſowie zur Topfkultur, bei kurzem Schnitt zu niedrigen Gruppen.

Empereur du Mexique, Blumen ſehr groß, voll, leuchtend roth, Centrum hellviolett; Laub roth gerandet, wie auch die Stacheln; Wuchs kräftig. Iſt aus Samen von Général Jacqueminot enſtanden und eine der ſchönſten Roſen, welche in den letzten Jahren in den Handel gekommen iſt.

Empereur Napoléon III., Blumen groß, gefüllt, feurig karmoiſin, ſammetbraun ſchattirt; gut remontirend und vorzüglich zum ſpäteren Treiben.

Enfant de France, Blumen ſehr groß, dicht gefüllt und ſchön gebaut, weißfleiſchfarben mit dunklerem Herz, eine der ſchätzbarſten unter den hellen Remontanten.

Ernest Boncenne, Blumen groß, becherförmig, inwendig leuchtend roſa, außen blaßroth, mit karminrother Marmorirung. Von Madame Laffay abſtammend.

Esmeralda, Blumen mittelgroß, gefüllt, kirſchroth mit Karmin.

Eugène Appert, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, brennend karmoiſin. Zur Pyramiden- und Säulenform, ſowie zur Topfkultur und

zum Treiben geeignet, bei kurzem Schnitte auch zu niedrigen Gruppen. Eine der prachtvollsten Remontanten.

Eugène Scribe, Blumen groß, leuchtend feuerroth; von Triomphe de l'exposition abstammend.

Eugène Verdier, Blumen sehr groß, gefüllt, prächtig dunkelviolettpurpur. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, bei kurzem Schnitt zu niedrigen Gruppen.

Exposition de Brie-Comte-Robert, Blumen groß, gefüllt, blendend leuchtend roth, von vorzüglichem Bau; mit röthlich grünen Zweigen, großen rothen Stacheln und tief eingeschnittenen Blättchen.

Exposition du Havre, Blumen sehr groß, voll und rund gebaut, brillant dunkelkarmin.

Fanny Petzold, groß, voll und von schönem Dachziegelbau, hellrosa mit Atlasweiß.

Félicien David (E. Verdier), 1873, Blumen sehr groß, gut gefüllt, dunkelroth, mit Karmin und Rosa erhellt und mit leichtem Violett nüancirt.

Félix Généro, Blumen groß, voll und sehr schön gebaut, schön rosaviolett; sehr gut remontirend.

Feu brillant, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend feuerroth, zuweilen weiß gestreift.

Fille du printemps (Touvais), 1873, Blumen mittelgroß, gut gefüllt und sehr schön gebaut, sehr zart frisch-fleischfarbig.

Fisher Holmes, Blumen groß, voll und von schönem imbriquirten Kamellienbau, prächtig, brillant scharlachroth.

Forster, Blumen groß, voll und von schönem Dachziegelbau, leuchtend hochroth, stark schattirt mit Violett.

François Arago, Blumen mittelgroß, voll, sammetamarantroth, sehr schön gebaut, reichblühend; eine der werthvollsten unter den dunkeln Rosen. Auch zur Topfkultur geeignet.

François Fontaine, Blumen groß, sehr dunkelroth, feuerroth illuminirt; Wuchs kräftig.

François Lacharme, Blumen groß, gefüllt, lebhaft karmin, von schöner Form, in Büscheln stehend. Zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet; bei kurzem Schnitt auch zu niedrigen Gruppen.

François Louvat, Blumen karmoisin mit lila schattirt; von schönem Bau.

François I., Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, kirſchroth mit dunkelrothen Nüancen, die Blumenblätter ſchön gefaltet.

François Treyve, Blumen groß, gefüllt, in der Form einer Centifolie ähnlich, glänzend dunkelſcharlach; Wuchs kräftig.

Frédéric Bihorel, Blumen groß, gefüllt, violettroth, Centrum karmin.

Géant des batailles, Blumen groß, voll, feurig karmoiſin, von prächtigem Bau. Vorzüglich zur Topfkultur und zum Treiben, desgleichen zu niedrigen Gruppen.

Général Baral, Blumen mittelgroß, voll und gut gebaut, violettroſa.

Général Championnet, Blumen groß, voll und von ſchalenförmigem Bau, leuchtend roth nüancirt mit Lila.

Général de la Martinière, Blumen ſehr groß, voll und gut gebaut, lebhaft karmin mit dunklerer Umrandung, ſchöner Belaubung und von kräftigem Wuchſe.

Général de Hautpoult, Blumen groß, voll und rund gebaut, leuchtend ſcharlachroth.

Général Forey, Blumen ſehr groß, voll, ſchalenförmig, weinroth.

Général Grant, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, ſcharlachroth, dunkelkarmoiſin ſchattirt, ſehr ſchön.

Général Jacqueminot, Blumen groß, gefüllt, feurig glänzend karminroth, von kräftigem Wuchſe und dunkelgrüner Belaubung; trägt leicht und reichlich Samen und die daraus gezogenen Sämlinge ſind im Allgemeinen ſo ſehr von einander unterſchieden, daß man ſchon eine große Menge von Abarten aus ihr gezogen hat. Sie eignet ſich ſehr gut zu höheren Gruppen, ſowie zur Topfkultur und zum ſpäteren Treiben.

Général Mirandol, Blumen groß, voll, von ſchalenförmigem Bau, ſammetig purpurroth.

Général Pélissier, Blumen groß, voll, lebhaft karminroſa, ſehr blühbar.

Général Simpson, Blumen mittelgroß, ſehr gefüllt, lebhaft karminroth, von ſchönem Bau; außerordentlich reichblühend und gut remontirend.

Général Washington, Blumen ſehr groß, gefüllt, prächtig leuchtend roth; der erſte Flor nicht ſo reich als der zweite. In gutem Boden und unter günſtigen klimatiſchen Bedingungen eine ausgezeichnete Roſe, in

weniger günstigem Boden zuweilen nur mittelmäßig. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Génie de Chateaubriand, Blumen groß, voll, lebhaft violettroth, Rückseite der Blumenblätter silberscheinglänzend. Hat sich an verschiedenen Orten als hart bewiesen.

George Paul, Blumen groß, glänzend karminrosa, von herrlichem Effekt, Wuchs kräftig; remontirt gut.

George Prince, Blumen groß, von centifolienartigem Bau, leuchtend roth, mit hellerer Rückseite; Wuchs kräftig.

George Simon, Blumen groß, gefüllt, kugelförmig, sehr leuchtend roth; außerordentlich reichblühend und besonders für den Spätjahrsflor von großem Werthe.

Gerbe des roses, Blumen halbgefüllt, fleischfarben-lila, in sehr großen, aus 30 — 50 Blumen bestehenden Dolden blühend.

Gloire des amateurs, Blumen groß, voll, lebhaft rosa, in Hellrosa übergehend, flach gebaut, mit Rosette.

Gloire de Ducher, Blumen sehr groß, dicht gefüllt und schön gebaut, bläulichviolett, fast schieferfarben, mit leuchtend purpurnem Herzen, reich und dunkel belaubt. Prachtrose ersten Ranges.

Gloire de France, Blumen groß, voll, schön gewölbt, karmoisinroth, lebhaft hochroth schattirt; von kräftigem Wuchse.

Gloire de mon plaisir, Blumen groß, gefüllt, von vollkommener Form, brillant roth; Wuchs kräftig.

Gloire de Santenay, Blumen scharlachkarmoisinroth, groß, gefüllt, mit festen Blumenblättern, entwickeln sich aber zuweilen nicht gut.

Grand Capitaine, Blumen groß, gefüllt, dunkelrosa, sehr reichblühend.

Gustave Persin, Blumen sehr groß und schön gebaut, purpurroth mit feuerrother Schattirung; gleicht in ihrer reichen Färbung der Monte Christo.

Gustave Rousseau, Blumen groß, gefüllt, bischofsviolett, mit Feuerroth erhellt, in Büscheln blühend.

H. Laurentius, Blumen groß, gefüllt, karmoisinroth mit schwärzlichem Sammet, von schönem schalenförmigen Bau.

Héliogabale, Blumen groß, gefüllt, leuchtend sammetig roth, sehr reich und in Dolden blühend.

Henri Ledechaux, Blumen groß, voll und schön gebaut, leuchtend karminrosa.

Henri Pajes (Levet), 1872, Blumen groß, centifolienförmig, leuchtend roſa, von kräftigem Wuchſe; ſtammt von Victor Verdier ab.

Hippolyte Flandrin, Blumen groß, gefüllt, leuchtend roſa.

Hippolyte Jamin, Blumen groß, gefüllt, ſchön gebaut, lilaroſa.

Horace Vernet, Blumen außerordentlich groß, gefüllt, prächtig ſammetroth, dunkelkarmoiſin ſchattirt; Wuchs kräftig. Eine ſehr effektvolle Roſe von ſehr ſchönem Habitus.

Impératrice Charlotte, Blumen groß, voll und von ſchönem Dachziegelbau, ſehr leuchtend roſa, in Büſcheln ſtehend.

Impératrice Eugénie, Blumen nicht ſehr groß, aber von herrlichem Bau, gefüllt, beim Aufblühen blaßfleiſchfarben, dann in rein Weiß übergehen, von ſchöner Becherform; reichblühend, Wuchs ſchwach, etwas zart.

Impératrice Marie Alexandrine, Blumen groß, gefüllt, weiß; widerſteht beſonders gut der Hitze.

Jacob Pereire, Blumen groß, gefüllt, in Büſcheln ſtehend, ſchön roſa lachsfarben.

Jacques Lafite, Blumen groß, voll, dunkelkarmoiſinroſa, von prächtigem Centifolienbau; Wuchs kräftig. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Jacques Plantiers (Damaizin), 1872, Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, imbriquirt, fleiſchfarbig-roſa; ſehr blühbar, von kräftigem Wuchſe.

James Dickson, Blumen groß, voll, karmoiſinroth, mit Purpur ſchattirt.

Jean Baptiste Guillot, Blumen violett, ſchattirt mit Purpur, ſehr effektvoll und vollendet ſchön gebaut.

Jean Goujon, Blumen groß, gefüllt, ſchön gebaut, prächtig hellroth.

Jean Lambert, Blumen von ungewöhnlicher Größe, die Knospen vielfach von Taubeneigröße, hochroth nüancirt mit Feuerroth; ſehr werthvolle Roſe.

Jean Touvais, Blumen ſehr groß, gefüllt, purpurroth mit Karmoiſin ſchattirt; ſehr reichblühend und gut remontirend. Auf Hochſtamm veredelt beſonders ſchön, aber auch zur Pyramiden- und Säulenform, ſowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Jeanne Gros (Damaizin), 1872, Blumen ſehr groß, gefüllt, becherförmig, ſchön ſeidenartig roſa; von kräftigem Wuchſe.

Jeanne Sury, Blumen groß, voll und von ſchönem Bau, ſchön dunkelroſa.

John Grier, Blumen außerordentlich groß, voll und von vollendet schönem runden Bau, hellroth oder dunkelrosa mit silberweißer Rückseite der Blumenblätter, in Büscheln stehend; eine Rose ersten Ranges.

John Hopper, Blumen sehr groß, sehr gefüllt, prächtig feurig-rosa, nach innen dunkelkarmoisin. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, bei kurzem Schnitt zu niedrigen Gruppen.

John Keynes, Blumen groß, sehr voll und schön gebaut, sehr glänzend scharlachroth mit Kastanienbraun schattirt, von großem Effekt.

John Laing (E. Verdier), 1873, Blumen groß, gefüllt, in Büscheln blühend, dunkelkarmoisin, mit blendendem Sammetroth, von großem Effekt.

John Nesmith, Blumen groß, gut gefüllt, reich karmoisin, schön schalenförmig.

Joseph Fiala, Blumen groß, sehr gut gefüllt, von schöner Schalenform, lebhaft dunkelroth, die Ränder der Blumenblätter etwas heller; gut remontirend; Wuchs kräftig. Zum Treiben geeignet.

Joséphine de Beauharnais, Blumen sehr groß, voll und schön gebaut, zart rosa.

Jules Calot, Blumen groß, von vollkommener Form, feurig roth, weißlich umrandet; Wuchs kräftig.

Jules Chrétien, Blumen groß, voll und von vollendet schönem Dachziegelbau, leuchtend seidenartig-rosa.

Jules Lavay, Blumen groß, voll und schön gebaut, leuchtend seidenartig rosafleischfarben, sehr reichblühend.

Jules Margottin, Blumen sehr groß, voll, hellleuchtend kirschroth, die Blumenblätter dachziegelartig liegend, von vollendet schön gewölbtem Centifolienbau; sehr reichblühend; stark remontirend; Wuchs kräftig; hat die Eigenthümlichkeit, an alten Pflanzen die Blumen einzeln, an einjährigen Veredelungen in Büscheln zu bringen. Eignet sich zur Pyramiden- und Säulenform, zur Bepflanzung von höheren Gruppen, sowie zur Topfkultur und zum Treiben; ist ziemlich hart.

Julie Touvais, Blumen sehr groß, voll und von vollendet schönem Bau, weißfleischfarben mit lebhaft rosenrothen Umfangsblättern.

Julie Treyve, Blumen mittelgroß, voll und rund gebaut, weiß mit Rosa und bläulichem Reflex.

Juliette Halfen, Blumen groß, voll und von vollendet schönem runden Bau, fleischfarbigrosa.

Kings Acre, Blumen ſehr groß und von ſchönem runden Bau, glänzend zinnoberroth, mit ſeidenartiger Rückſeite der Blumenblätter; prachtvoll.

La brillante, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend karmin, von großem Effekt; in Rispen blühend.

La favorite (Guillot père), 1872, Blumen groß, gefüllt, dunkelroſa in zartroſa übergehend, von kräftigem Wuchſe.

La fontaine, Blumen groß und voll, leuchtend roſenroth.

La France, Blumen groß, voll, von eigenthümlich ſchöner Form, blendend lilaroſa mit faſt ſilberweißer Mitte, ſehr reichblühend.

La Motte Sanguin, Blumen ſehr groß, voll und von ſchönem Bau, dunkelkarminroth.

La Phocéenne, Blumen groß, voll, glänzend karminroth, ins Sammetartige übergehend.

La reine, Blumen ſehr groß, voll, ganz ähnlich der Centifolienroſe, roſa, mitunter mit Lila oder Karmoiſin ſchattirt; ſchalenförmig; Wuchs aufrecht, mäßig; ſehr reichblühend; gut remontirend. Wurzelächt oder niedrig veredelt eignet ſie ſich ſehr gut zur Bepflanzung ganzer Gruppen; zur Topfkultur und zum Treiben iſt ſie ebenfalls vorzüglich. Sie iſt eine der älteſten und werthvollſten Remontanten.

La reine de la pape, Blumen groß, voll, ſchön violettroſa.

La tour de Crouy, Blumen groß, gefüllt, lachsroſa mit ſeidenartigem Weiß.

Laurent Descourt, Blumen mittelgroß, gefüllt, ſammetartig-purpur, ſchön gebaut.

Lauriol de Barny, Blumen groß, voll, ſehr leuchtend kirſchroth und von rundem dachziegelförmigen Bau.

La ville de St. Denis, Blumen groß, voll, karmoiſinroſa, von vorzüglich ſchönem Bau; von der la reine abſtammend. Zu höheren Gruppen geeignet.

Le lion des combats, Blumen groß, voll, dunkelroth, violett ſchattirt, ſehr effektvoll; ſehr reichblühend und von ſtarkem Wuchſe. Zur Bildung von Gruppen, ſowie zur Topfkultur geeignet.

Le météore, Blumen groß, voll, ſchön gebaut, dunkelroth, ſehr reich blühend; beim zweiten Flor meiſtens noch ſchöner als beim erſten.

Léopold Hausbourg, Blumen ſehr groß, voll, karminroth mit purpur nüancirt.

Léopold II., Blumen ſehr groß, voll und von ſchöner Becherform, ſehr ſchön roſa mit leicht lachsfarbigem Scheine.

Le Rhône, Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, glänzend zinnoberroth. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Lord Palmerston, Blumen leuchtend roth, mittelgroß, voll und gut gebaut, in Büscheln stehend; überaus reichblühend und gut remontirend.

Lord Raglan, Blumen groß, voll, leuchtend roth im Centrum, sammetartig-purpurviolett umrandet, von schönem Kamellienbau, bei dichter Füllung; sehr reich und anhaltend bis zum Herbste blühend; wurzelächt von schwachem Wuchse. Zur Topfkultur geeignet.

Louis Charlin (Damaizin), 1872, Blumen sehr groß, leuchtend rosa. Centrum zart, sehr effektvoll; von kräftigem Wuchse.

Louis XIV., Blumen leuchtend-sammetartigkarmosin, mittelgroß, voll und gut gebaut; eine prachtvolle Rose, aber sowohl wurzelächt als auch veredelt von schwachem Wuchse.

Louis van Houtte, Blumen groß, voll, von schönem Centifolienbau, leuchtend karminroth.

Louise Darzens, Blumen mittelgroß, gefüllt, rein weiß, sehr reich blühend.

Louise d'Autriche, Blumen groß, gefüllt, violettroth.

Louise Peyronny, Blumen sehr groß, voll, dunkelrosenfarben, mit Karmin schattirt, Blumenblätter silberfarben umrandet; eine schöne von der la reine abstammende Rose. Zur Topfkultur und zum Treiben geeignet. Hat sich an vielen Orten als hart bewährt.

Lyonnaise (Lacharme), 1873, Blumen sehr groß, gefüllt, centifolienförmig, zart rosa, Centrum leuchtender.

Mac Mahon (E. Verdier), 1873, Blumen groß, gefüllt, dunkelrosa.

Madame Adèle Huzard, Blumen groß, kugelförmig, leuchtend hellrosa mit weißlichen Rändern.

Madame Alfred de Rougemont, Blumen weiß, leicht rosa schattirt, groß, voll; Wuchs kräftig; reich und gut blühend.

Madame Alice Dureau, Blumen kugelförmig, karmoisinrosa nüancirt.

Madame Ambroise Triollet, Blumen groß, sehr voll und schön gebaut, prächtig lachsrosa, sehr blühbar.

Madame André Leroy, Blumen lachsfarbenrosa; eine große volle und schön gebaute Prachtrose.

Madame Anne Bugnet, Blumen groß und voll, dachziegelförmig, weißjaspisfleischfarben mit Rosa, in Dolden blühend.

Madame Baptiste Desportes, Blumen groß, voll, Form und Haltung vollkommen, prächtig roſa.

Madame Baronne de Rothschild, Blumen ſehr groß, faſt voll, Form und Haltung vorzüglich, zart karmoiſinroſa, weiß nüancirt. Von Souvenir de la reine d'Angleterre abſtammend.

Madame Barriot, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, roſa, karmin ſchattirt.

Madame Bellenden Ker, Blumen von mittlerer Größe, rein weiß, gefüllt, in Büſcheln blühend; Wachsthum mäßig. Eine gute weiße Roſe.

Madame Bellon (Pernet), 1872, Blumen ſehr groß, voll, ſchön zart roſa, ſchön belaubt, von mittelkräftigem Wuchſe.

Madame Boll, Blumen leuchtend roſa mit fleiſchfarben, ſehr groß, voll und von guter Form; Wuchs kräftig; prächtig reich belaubt. Zur Pyramiden- und Säulenform, ſowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Madame Bouttin, Blumen groß, gefüllt, ſchön kirſchroth, prächtig geformt; eine vollendet ſchöne Prachtroſe.

Madame Bruny, Blumen groß, gefüllt, fleiſchfarben mit lila, ſehr reichblühend, die Blumen ſtehen jedoch nicht aufrecht; läßt ſich gut treiben.

Madame Cadel (Pernet), 1873, Blumen ſehr groß gefüllt, ſchön lilaroſa, zuweilen leuchtend roſa.

Madame Campbel d'Islay, Blumen ſehr groß, voll, ſeidenglänzend lilaroſa. Von der la reine abſtammend und wie dieſe zu verwenden.

Madame Canrobert, Blumen groß, gefüllt, leuchtend karminroth, ſehr reichblühend.

Madame Charles Crapelet, Blumen kirſchroth, glänzend ſilberlila ſchattirt, eine vollendet ſchön gebaute Prachtroſe. Zu höheren Gruppen, ſowie auch zur Topfkultur geeignet.

Madame Charles Verdier, Blumen, groß, gefüllt, prächtig metallroſa.

Madame Charles Wood, Blumen ſehr groß, gefüllt, blendend roth, in dunkelroſa übergehend. Zu höheren Gruppen geeignet.

Madame Chirrard, Blumen groß, gefüllt, leuchtend roſa.

Madame Clémence Joigneaux, Blumen ſehr groß und gut gebaut, leuchtend hochroth, ſchalenförmig. Zur Pyramiden- und Säulenform, ſowie zu höheren Gruppen geeignet.

Madame Clert, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, mit großen Kelchblättern, lachsroſa; Wuchs kräftig.

Madame Collet, Blumen groß, voll und schön gebaut, dunkelkarminrosa, mit leuchtendem, lachsfarbenem Herz.

Madame Creyton, Blumen groß, voll und schön gebaut, glänzend karminroth, rosa schattirt, weiß gespitzt; Wuchs sehr kräftig.

Madame de Cambacérès, Blumen leuchtend purpurrosa, sehr groß und voll, von prächtiger Schalenform; zeichnet sich durch besonders schöne Belaubung aus.

Madame Décour, Blumen sehr groß, fast gefüllt, schön gebaut, leuchtend rosa; von großem Effekt; Wuchs kräftig.

Madame Deurreulx Douvillé, Blumen groß, gefüllt, schön gebaut, von prächtigem Ceriseroth, Blumenblätter weiß umrandet, tief schalenförmig, in großen Büscheln stehend; gut remontirend.

Madame Domage, Blumen sehr groß, voll, leuchtend purpurrosa, von Centifolienbau, sehr wohlriechend; Wuchs kräftig. Auch zur Topfkultur geeignet.

Madame Dubus, Blumen groß, voll und schön gebaut, brillant zinnoberroth.

Madame Elisa Jaenisch, Blumen groß, gefüllt, flach, Blumenblätter breit, bisweilen gezähnt, blutroth, glänzend feuerroth nüancirt, bisweilen violettroth.

Madame Emma Combey (Gonod), 1873, Blumen groß, voll, sehr schöne Form, glänzend karminroth; vorzügliche Rose.

Madame Eugénie Appert, Blumen groß, voll und sehr schön gebaut, prächtig lachsrosa.

Madame Farfouillon, Blumen sehr groß, voll und schön gebaut, seidenartig rosa, mit Orange- und Lachsfarbe gemischt; Wuchs kräftig; von mère de St. Louis abstammend.

Madame Fillion, Blumen sehr groß, voll und gut gebaut.

Madame Freeman, Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, gelblichweiß, von edler Form und ziemlich kräftigem Wuchse; sehr dankbar blühend.

Madame Fresnoy, Blumen groß, voll, leuchtend rosa.

Madame Furtado, Blumen sehr groß, gut gefüllt, karminrosa, schalenförmig von vorzüglicher Schönheit, ungemein wohlriechend, sehr reichblühend; wurzelächt von schwachem Wuchse. Zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Madame George Paul, Blumen groß und von schönem vollen Dachziegelbau, leuchtend dunkelrosa, sehr auffallend weißlich umrandet. Eine sehr edle Rose.

Madame Georges Schwartz (Guillot père) 1872, Blumen sehr

groß, voll, ſehr gut gebaut, ſchön hortenſienroſa, in glacirtes Roſa übergehend; beſonders ſchön.

Madame Guillot de Mont Favet, (Gonod) 1872, Blumen groß, voll, kugelförmig, fleiſchfarbig-weiß; Wuchs kräftig; ſtammt von Duchesse de Sutherland.

Madame Gustave Bonnet, Blumen mittelgroß und von ſchönem Centifolienbau, virginalweiß mit Karminroſa ſchattirt; ſehr reichblühend und prächtig.

Madame Hector Jacquin, Blumen gröſs, voll, ſeidenartig glänzend roſa.

Madame Hersilie Ortgies, Blumen mittelgroß, voll und ſchön gebaut, weiß, leicht lachsroſa ſchattirt.

Madame Hoste, Blumen groß, voll, von vollendet ſchönem Dachziegelbau, fleiſchfarben mit leuchtend Roſa punktirt, ſehr reich blühend.

Madame Jacquier, Blumen ſehr groß, voll und von ſchönem runden Bau, prächtig biſchofsviolett.

Madame James Gros, Blumen groß, voll, leuchtend hellkarmin.

Madame Julie Daran, Blumen ſehr groß, gefüllt, kugelförmig, ſeidenartig zinnoberroth. Zu hohen Gruppen, ſowie zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Madame Knorr, Blumen groß, voll, lebhaft roſa, hellumrandet, ſchön gebaut; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet. Hat ſich an vielen Orten als hart bewieſen.

Madame Lacharme (Lacharme), 1873, Blumen ſehr groß, voll, centifolienförmig, weiß, Centrum beim Aufblühen leicht roſa ſchattirt, in rein Weiß übergehend; ſtammt von Jules Margottin und ſoll bis jetzt die ſchönſte weiße Remontanteroſe ſein.

Madame la Comtesse Félicie Morgès, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, leuchtend roth mit weißen Streifen in der Mitte.

Madame Lafay, Blumen groß, gefüllt, purpurroſa, ſchalenförmig; blüht ſehr früh und vollkommen.

Madame la générale Decaen, Blumen groß, voll, ſchön geformt, lebhaft roſa mit fleiſchfarbenem Herz.

Madame la Princesse Henri des Pays-Bas, Blumen groß, beim Aufblühen centifolienförmig, ſilberig roſa, etwas gewölbt, ſpäter flach, dachziegelförmig, in Silberweiß übergehend, zart fleiſchfarben nüancirt.

Madame Laurent, Blumen groß, ſehr gefüllt, ſchöne Form, leuchtend kirſchroth.

Madame Lierval, Blumen groß, voll und schön gebaut, hellrosa mit leuchtend Karminroth.

Madame Livia Frege (Soupert et Notting), 1872, Blumen groß, sehr gefüllt, schöne Form und gute Haltung, zart violettes Rosa mit silberweißen Reflexen, Geruch der Rosa centifolia; stammt von Souvenir de la reine d'Angleterre.

Madame Louis Paillet (E. Verdier), 1873, Blumen sehr groß, voll, sehr zartrosa, Centrum leuchtender.

Madame Louise Garrique, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend karminroth.

Madame Marie Cirodde, Blumen groß, schön gebaut, von schönem frischen Rosa. Von Triomphe de l'exposition abstammend.

Madame Marie de Villeboisnet, Blumen sehr groß, gefüllt, dachziegelförmig, zartrosa.

Madame Marius Coté (Guillot fils), 1873, Blumen sehr groß, gut gefüllt und schön gebaut, becherförmig, hellroth in dunkelrosa übergehend; sehr schön.

Madame Martin Debessé, Blumen groß, voll und von schönem breiten Schalenbau, weiß mit zartem Anflug von Rosa. Auf der Ausstellung von Fontainebleau gekrönt.

Madame Masson, Blumen sehr groß, voll, brillant karmoisinroth, violett schattirt, von herrlichem Effekt. Zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur geeignet.

Madame Moreau, Blumen groß, prächtig karmoisinfarben, von tiefer Schalenform, innen mit kurzen Blumenblättern.

Madame Nomann, Blumen mittelgroß, voll und von sehr schönem Bau, rein weiß, sehr reichblühend.

Madame Prud'homme (Moreau), 1873, Blumen sehr groß, voll, schön gebaut, leuchtend kirschroth, Centrum feuerroth; stammt von Baronne Prévost.

Madame Pulliat, Blumen groß, gefüllt, von schöner Kugelform, dunkelrosa; Wuchs kräftig.

Madame Puissant, Blumen groß, voll und gut gebaut, leuchtend kirschroth in hellrosa übergehend; Wuchs kräftig.

Madame Renard (Moreau-Robert), 1872, Blumen sehr groß, kugelförmig, lachsfarbig-rosa; stammt von Jules Margottin.

Madame Richer, Blumen groß, voll, schön gebaut, dunkelrosa, sehr blühbar.

Madame Rivers, Blumen blaßfleischfarbig, groß, gefüllt, von vollkommenem Bau; eine prachtvolle Rose.

Madame Rolland (Moreau), Blumen groß, ſchön gebaut, hellroth mit weißlichem Centrum, von Victor Verdier abſtammend.

Madame Rolland (Rolland), Blumen ſehr groß, voll, ſchön gebaut, weißfleiſchfarbig-roſa, in der Ferne an Souvenir de Malmaison erinnernd.

Madame Schmidt, Blumen dunkelroſa, mit Karmin ſchattirt; Rückſeite der Blumenblätter ſilberfarben, übertrifft zuweilen la reine an Größe.

Madame Scipion Cochet (Cochet), 1873, Blumen ſehr groß, gefüllt, ſchön imbriquirt, leuchtend kirſchroſa, ſilberig gerandet. Dieſer Roſe wurde auf der Ausſtellung zu Montereau die erſte Medaille zuerkannt.

Madame Soubeyron (Gonod), 1873, Blumen klein, nur einige Centimeter groß, gefüllt, ausgezeichnet ſchöne Form, prächtig leuchtend roſa, ſehr wohlriechend; einzig in ihrer Art.

Madame Trotter, Blumen groß, voll, feurig dunkelroth; fängt etwas ſpät an zu blühen; von kräftigem Wuchſe und ſchöner Belaubung.

Madame Victor Verdier, Blumen groß, gefüllt, reich glänzend, kirſchroth, von ſchön ſchalenförmigem Bau, auf ſtarken Zweigen in großen Büſcheln ſtehend; Wuchs kräftig, Belaubung ſehr ſchön. Zu niedrigen Gruppen ſehr geeignet. Eine Prachtroſe erſten Ranges.

Madame William Paul, Blumen groß und voll, purpurviolett, mit Karmoiſin ſchattirt; von ſehr ſchönem auffälligen Kolorit.

Madeleine Nonin, Blumen groß, gefüllt, kugelförmig roſafarbig, lachsfarbig überhaucht; Wuchs kräftig. Eine ſchöne große Roſe von außerordentlichem Wohlgeruch.

Mademoiselle Adèle Launay, Blumen groß, gefüllt, im Aufblühen ſehr zartroſa, im Verblühen wird der Grund weiß und das Roſa erſcheint wie aufgemalt; ſehr dankbar blühend und gut remontirend; Wuchs aufrecht. Eignet ſich gut zum Treiben.

Mademoiselle Amélie Halfen, Blumen, groß, voll, ſchön gebaut, ſchön leuchtend karminroſa.

Mademoiselle Anne Wood, Blumen groß, gefüllt, wunderſchön hellroth; Wuchs kräftig.

Mademoiselle Berthe Channy, Blumen groß, voll, ſchön dachziegelförmig, leuchtend karminroſa, ſehr reichblühend.

Mademoiselle Berthe Lévêque, Blumen groß, dicht gefüllt und von vollkommenem Bau, im Sommer faſt weiß und bei dem Herbſtflor leicht roſa überhaucht; ſie gleicht der Caroline Sansal, die ſie jedoch an Schönheit weit übertrifft.

Mademoiselle Bonnaire, Blumen weiß, in der Mitte zartroſa,

groß, voll, von ausgesuchter Form; eine der besten weißen Remontanten. Zu niedrigen Gruppen geeignet.

Mademoiselle Éléonore Grier, Blumen groß, vollkommen, gebaut, lebhaftes Dunkelrosa.

Mademoiselle Eugénie Verdier, Blumen mittelgroß, gefüllt, weiß.

Mademoiselle Eugène Savary (Gonod), 1873, Blumen mittelgroß, in Büscheln blühend, fleischfarbig weiß, Rückseite der Blumenblätter leuchtend rosa.

Mademoiselle Fernande de la Forest (Damaizin), 1873, Blumen groß, gefüllt, vollkommene Form, schön zartrosa, Rückseite der Blumenblätter weiß, extra.

Mademoiselle Jeanne Marx, Blumen ungewöhnlich groß, voll und sehr schön, leuchtend rosa, marmorirt mit Purpur.

Mademoiselle Julie Péréard (Pernet), 1873, Blumen sehr groß, gefüllt, schön leuchtend rosa; stammt von Jules Margottin.

Mademoiselle Marie Cointet (Guillot fils), 1873, Blumen groß, gefüllt, Blumenblätter imbriquirt, leuchtend rosa, in schön zart seidenartig Rosa übergehend, weißlich.

Mademoiselle Marie Rady, Blumen groß, voll und von vollendet schönem Dachziegelbau, leuchtendroth mit Atlas weiß umrandet; eine sehr reichblühende Prachtrose.

Mademoiselle Marguerite Dombrain, Blumen groß, voll, von schönem runden Bau und sehr frischem, zartem Virginalrosa.

Mademoiselle Thérèse Coummer, Blumen groß und voll, leuchtend roth, mit rein weißem, glänzendem Herz.

Mademoiselle Thérèse Levet, Blumen sehr groß, gefüllt, schön glänzend rosa.

Marcel Gramont, Blumen groß, voll und von schöner Haltung, schön dunkelbraunroth, sehr reichblühend.

Marcella, Blumen groß, voll, becherförmig, lachsrosa; neue Färbung.

Maréchal Forey, Blumen groß, voll und schön gebaut, sammetartig karmoisinroth mit violettem Reflex.

Maréchal Suchet (Damaizin), Blumen sehr groß, voll, schön gebaut, karminrosa.

Maréchal Vaillant, Blumen groß, voll, leuchtend purpurroth, von großem Effekt. Zu höheren Gruppen geeignet.

Marguerite de Saint Amand, Blumen leuchtend roſa-fleiſchfarben, ſehr groß, voll und von eigenthümlich ſchönem Bau; Prachtroſe erſten Ranges.

Marguerite Lecureux, Blumen mittelgroß, gefüllt, feurig karmoiſin mit weißen Streifen, ſonſt ganz der Géant des batailles gleich.

Marie Baumann, Blumen leuchtend roth, in Allem dem Général Jacqueminot ähnlich, nur noch heller und leuchtender, voller und ſchöner gebaut; eine wahre Prachtroſe. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Marie Boissé, Blumen weiß, mittelgroß, gefüllt, ſchalenförmig; reichblühend. Eine ſehr ſchöne Roſe.

Marie Gonod (Gonod), 1872, Blumen mittelgroß oder groß, rein weiß, Wuchs kräftig; ſtammt von Madame Lafay.

Maurice Bernardin, Blumen groß, ſehr voll, von prächtiger Kugelform, hellſcharlachroth, Farbe ſehr beſtändig, ſehr imponirend, in Büſcheln ſtehend. Zu höheren Gruppen, ſowie zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Mère de St. Louis, Blumen weißlichchamois mit Fleiſchfarben, ſehr groß, voll, ſchalenförmig. Von la reine abſtammend und wie dieſe zu verwenden.

Merveille d'Anjou, Blumen ſehr groß, voll und ſchön gebaut, glänzend purpurroth.

Minerve, Blumen groß, voll und von ſchönem Dachziegelbau, ſchön karmoiſin mit Feuerroth nüancirt.

Mistress Laing (E. Verdier), 1873, Blumen groß, gefüllt und ſchön gebaut, leuchtend karminroſa, Rückſeite der Blumenblätter weißlich; ſehr wohlriechend.

Mistress Weitch (E. Verdier), 1873, Blumen groß, gefüllt, ſchön gebaut, Blumenblätter breit, vom ſchönſten, leuchtendſten Roſa; Blumenblätter oft mit einem weißen Streifen durchzogen; ſehr blühbar.

Monsieur Barilet-Dechamps, Blumen mittelgroß, etwas gewölbt, ſehr leuchtend roth. Von Comte de Bobrinsky abſtammend.

Monsieur Boncenne, Blumen groß, gefüllt, von ſchöner Becherform, ſammetig-ſchwarzpurpur.

Monsieur Chaix d'Estang, Blumen groß, voll, ſchön gebaut, glänzend zinnoberroth.

Monsieur Cordier, (Gonod) 1872, Blumen ſehr groß, gefüllt, ſcharchlachroth, von großem Effekt; ſtammt von Géant des batailles.

Monsieur Journeaux, Blumen groß, voll und gut gebaut, glänzend ſcharlachroth.

Monsieur Lierval, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, dunkelpurpur, ſtark feuerroth erhellt.

Monsieur Nomann, Blumen groß, gefüllt, zartroſa, weiß gerandet; Wuchs kräftig.

Monsieur Ravel, Blumen brillant purpurroth, dunkler als bei Géant des batailles, groß, voll, von ſchönem flachen Bau; ſehr dankbar blühend; verlangt guten Winterſchutz.

Monsieur Thiers, Blumen groß, die äußeren Blumenblätter regelmäßig, die des Centrums gekräuſelt, brillant roth.

Monte Christo, Blumen groß, gefüllt, dunkelſcharlachkarmoiſin, mit dickem, ſchwarzbraunem Sammet und ſehr feurigem Reflex, ſchön gebaut. Eignet ſich auch zur Topfkultur und zum Treiben.

Napoléon III. (Eugène Verdier), Blumen groß, aber nicht ganz voll, ſcharlachviolett ſchattirt, Farben prachtvoll; Wachsthum mäßig.

Nardy frères, Blumen ſehr groß, voll und ſchön gebaut, violettroſa mit ſchieferfarbigem Reflex.

Notaire Bonnefond, Blumen ſehr groß, voll und gut gebaut, ſammetig-purpurroth.

Octavie Choquet, Blumen mittelgroß, voll und gut gebaut, hellſilberroſa.

Oeillet fantaisie (Guillot fils), 1872, Blumen mittelgroß, gut gebaut, purpurroſa mit leuchtend Violett, äußere Ränder der Blumenblätter umzingelt und berandet mit Weiß, nelkenartig und von großem Effekt; Wuchs kräftig, ſehr blühbar.

Olivier Delhomme, Blumen groß, voll, von ſehr reinem Scharlach und vollkommener Form.

Oriflamme de St. Louis, Blumen ſehr groß und gut gefüllt, blendendkarmin, von herrlichem Effekt; dem Général Jacqueminot, von dem ſie abſtammt, ſehr ähnlich und wie dieſer zu verwenden.

Paeonia, Blumen groß, gefüllt, karmoiſinroth, ſehr effektvoll. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet; ſehr reichblühend.

Palais de cristal, Blumen mittelgroß, voll, lebhaft fleiſchfarben mit Kupferroſa, Blumenblätter dachziegelartig übereinander liegend, von prächtigem Bau; ſie erhalten ſich ſehr lange friſch. Auch zur Topfkultur geeignet.

Panachée de Luxembourg, Blumen groß, violett-purpurroth, mit Lachsroſa geſtreift und geflammt.

Panachée d'Orléans, Blumen weißfleiſchfarben, purpur- und roſenroth geſtreift und bandirt, ſehr ſchön reichblühend.

Paul Dupuy, Blumen groß, voll, dunkelkarmoiſin mit ſammetartigem Violett, von prächtigem Kolorit und vorzüglichem Bau; ſehr dankbar blühend. Zur Bepflanzung von Gruppen ſehr geeignet, ſowie auch zur Topfkultur.

Paul Néron, Blumen ſehr groß, voll von ſchöner Form, dunkelroſa; Wuchs kräftig.

Paul Verdier, Blumen gefüllt und von vollkommener Form, glänzend roſa, in Büſcheln von 3 bis 8 beiſammenſtehend; Wuchs kräftig.

Pauline Lancezeur, Blumen mittelgroß, gefüllt, im Aufblühen ſcharlachkarmoiſin, im Verblühen violett. Eine der dankbar blühendſten Roſen.

Pavillon de Prègny, Blumen mittelgroß, voll, innere Seite der Blumenblätter weinroth, Rückſeite weiß; ſehr dankbar blühend. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Perfection de Lyon, Blumen groß, voll, von ſchön becherförmigem Bau, roſa mit lila Widerſchein.

Perle blanche, Blumen ſehr groß, voll und ſchön gebaut, weiß mit fleiſchfarbigem Anhauche; eine prachtvolle Roſe.

Peter Lawson, Blumen glühend ſcharlach, groß, voll und von ſchönem runden Bau.

Pie IX., Blumen groß, voll und ſchön gebaut, inkarnatkarmoiſin, bei dem Herbſtflor violett.

Pierre Notting, Blumen ſehr groß, gefüllt, ſchwärzlichroth mit Violett, tief ſchalenförmig, Blumenblätter ſchön dachziegelartig geordnet; außerordentlich reichblühend. Zu höheren Gruppen geeignet und auf Hochſtamm veredelt von beſonderer Schönheit.

Pierre Seletzsky (Levet), 1873, Blumen groß, gefüllt und ſchön gebaut, prächtig dunkelpurpurroth, mit ſchieferfarbigen Reflexen; ſehr wohlriechend.

Pitord, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, feuerroth mit violettſammetner Mitte.

Pline, Blumen ſehr groß, gefüllt, gut gebaut, ſammetartig-zinnoberroth in Violettroth übergehend, von großem Effekt.

Pourpre d'Orléans, Blumen mittelgroß, gefüllt, ſammetartig-purpur, ſehr wohlriechend; anhaltend blühend.

Praire de Terre-Noire, Blumen groß, gefüllt, purpur und penſéeviolett marmorirt.

Président Grévy (E. Verdier), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, in Büſcheln blühend, purpurroth.

Président Lincoln, Blumen ſehr groß, voll, ſchön kirſchroth mit Braunroth nüancirt, von großem Effekt. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Président Mas, Blumen ſehr groß, voll und ſchön gebaut, ſehr ſchön glänzend ſammetig-roth, nüancirt mit Violett-ſchieferfarben, eine ſchöne Roſe in jeder Hinſicht.

Président Porcher, Blumen groß, ſchön hellroth, mit Karmin nüancirt.

Président Thiers (Lacharme) 1873, Blumen ſehr groß, gefüllt, ausgezeichnet ſchön centifolienförmig, feuerroth; extra.

Président Willermotz, Blumen groß, voll und ſchön gebaut, leuchtend roſa.

Prince Albert, Blumen groß, voll, purpur mit Karmin ſchattirt, bei dem Herbſtflor tief violett; der Herbſtflor meiſtens reicher und vollkommener als der Sommerflor. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet; hat ſich an vielen Orten als hart bewährt.

Prince Camille de Rohan, Blumen ſammetig-ſchwarzkarmoiſin mit Blutroth, ſehr groß und voll; einzig in ihrer tiefen Färbung. Zu höheren Gruppen geeignet.

Prince Eugène de Beauharnais, Blumen glänzend feuerroth, mit Purpur ſchattirt, mittelgroß, voll und ſchön gebaut, in Büſcheln ſtehend.

Prince de Porcia, Blumen groß, voll und gut gebaut, leuchtend dunkelzinnoberroth, eine der ſchönſten in dieſer Färbung.

Prince Henry des Pays-Bas, Blumen groß, voll, von leuchtend ſammetartiger Färbung und prächtigem Bau.

Prince Humbert, Blumen groß, Form und Haltung vollkommen, leuchtend ſammetviolettroth; ſehr kräftig wachſend. Eine prachtvolle Roſe.

Prince impérial, der la reine ſehr ähnlich, von der ſie abſtammt, doch ſind die Blumen noch größer und von lebhafterer Farbe; wurzelächt von ſchwachem Wuchſe.

Prince Léon Kotshubey, Blumen ſehr groß, voll, feurig kirſchrothkarmin, von weitgeöffneter Schalenform, ſehr effektvoll, mit feſten Blumenblättern, auch zur Topfkultur geeignet.

Prince noir, Blumen mittelgroß, faſt gefüllt, ſammetigſchwarzpurpur.

Princesse Clotilde, Blumen groß, voll, flach gebaut, zart rosa, sehr reich in Büscheln blühend.

Princesse de Joinville, Blumen mittelgroß, leicht gefüllt, lebhaft hochrosa.

Professeur Duchartre, Blumen groß, voll, kugelförmig, hellroth, mit seidenartiger Rückseite der Blumenblätter.

Professor Koch, Blumen kirschroth mit dunkelkarminroth, von vollendet schönem Bau; sehr reichblühend.

Prudence Besson, Blumen sehr groß, leicht gefüllt, schön gebaut, leuchtend karminroth, von großem Effekt.

Purpurine, Blumen groß, voll, roth nüancirt mit Purpur; besonders durch die purpurrothe Belaubung sehr effektvoll.

Queen Victoria, auch weiße la reine genannt, Blumen sehr groß, voll, mit rosigem Anhauch, in Büscheln stehend; eine prachtvolle Rose, aber leider wenig remontirend. Auch zur Topfkultur geeignet.

Reine blanche, Blumen groß, voll und von sehr schöner Form, weiß mit rosigem Anhauch.

Reine de Danemark, Blumen lilafleischfarben, bewundernswürdig durchsichtig, groß, voll und schön gebaut; meistens eine Rose ersten Ranges, blüht aber zuweilen auch schlecht.

Reine des beautés, Blumen groß, voll und gut gebaut, frisch fleischfarbig-weiß, sehr wohlriechend.

Reine des violettes, Blumen groß, gefüllt, dunkelviolett mit hellrothem Centrum.

Reine du Midi, Blumen groß, schön zartrosa, gut gebaut. Von la reine abstammend.

Reine Mathilde, Blumen groß, voll, schön gebaut, fleischfarbenrosa, sehr effektvoll.

Reynold Hole, Blumen groß, voll, von schönem Schalenbau, glänzend rosa.

Richard Schmidt, Blumen mittelgroß, gefüllt, dunkelpurpurroth, violett schattirt.

Rosa mundi, Blumen virginalrosa, groß, voll und schön gebaut; eine sehr schätzbare Rose.

Rose de Puebla, Blumen leuchtend roth mit schwarzem Sammet und weiß gefleckten Herz, sehr voll und von schöner Becherform.

Rose perfection, Blumen sehr groß, von edelster Form, glänzendes, sehr brillantes Dunkelrosa.

Rosine Ravaux, Blumen groß, voll und von wundervollem Bau, leuchtend dunkelrosenroth mit silberner Umrandung.

Rouge marbré, Blumen sehr groß, gefüllt, lebhaft roth, sammetartig violett nüancirt. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Rushton Radcliffe, Blumen groß, sehr gefüllt, hellkirschroth, die Blumenblätter dachziegelartig geordnet; Wuchs kräftig.

Sénateur Favre, Blumen groß, gefüllt, leuchtend zinnoberroth mit sammetigschwarz vermischt.

Sénateur Vaisse, Blumen groß, gefüllt, sammetig dunkelscharlach, sehr imponirend, mit festen Blumenblättern, Farbe sehr beständig. Eignet sich zu niedrigen Gruppen, sowie zur Topfkultur und zum Treiben.

Sidonie, Blumen groß, voll und von vollendet schönem, gewölbtem Bau, zart rosenroth.

Simon Oppenheim, Blumen groß, sehr gefüllt, schön gebaut, sammetartig karmoisin und purpur nüancirt, von großem Effekt; Wuchs kräftig.

Simon St. Jean, Blumen groß, fast gefüllt, purpurroth, sammetigschwarz nüancirt.

Soeur des anges, Blumen groß, gefüllt, weiß mit lila Schimmer, einzig in ihrer Färbung.

Sophie de la Villeboinet, Blumen sehr groß, voll und gut gebaut, glänzend weißrosa, sehr blühbar.

Souvenir d'Abraham Lincoln, Blumen mittelgroß, gefüllt, karmoisinroth, feuerroth erhellt.

Souvenir d'Adrien Bahivet, Blumen groß, voll, von schönem runden Bau, sammetig karmoisinroth, purpur und karminviolett schattirt.

Souvenir de Bellanger (Eude), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend purpur, äußere Blumenblätter glänzend feuerroth; ausgezeichnet schöne Färbung.

Souvenir de Bordeaux, Blumen groß, fast gefüllt, dunkelroth, ponceau schattirt.

Souvenir de Caillat, Blumen groß, voll, in Büscheln blühend, violettpurpur mit Feuerroth.

Souvenir de Charles Montault, Blumen sammetartig feurigscharlach, ähnlich der Géant des batailles, die sie an glühender Färbung aber bei weitem übertrifft; sehr reichblühend und der Herbstflor von besonderer Schönheit.

Souvenir de Comte de Cavour (Margottin), Blumen groß gefüllt, gut gebaut, leuchtend karmoisinroth; eine große volle Prachtrose. Auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Souvenir de Coulommiers, Blumen aufrecht, sehr groß, sehr gefüllt, gut gebaut, dunkelroth; Wuchs kräftig, Zweige dunkelgrün, besetzt mit ungleichen starken hellrothen Stacheln; Blätter sehr groß und dunkelgrün.

Souvenir de François Ponsard, Blumen groß, voll und rund gebaut, sehr breite Blumenblätter, leuchtend rosa.

Souvenir de John Gould Weitch (E. Verdier), 1873, Blumen groß gefüllt, schön dachziegelförmig, vollkommene Form, leuchtend dunkelkarmoisin, sammetig-purpur und violett nüancirt.

Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas (Liabaud), 1873, Blumen sehr groß und gut gefüllt, kugelförmig, granatroth, purpur schattirt; extra.

Souvenir de Lady Cardelay, Blumen groß, voll, schön scharlachroth.

Souvenir de la reine d'Angleterre; Blumen sehr groß, gefüllt, feurig karminrosa, schalenförmig, mit festen Blumenblättern; Wuchs sehr kräftig, so daß sie sich zur Bedeckung von Wänden und Spalieren, sowie zu hohen Pyramiden und Säulen eignet; auch zur Topfkultur und zum Treiben läßt sie sich verwenden. Hat sich an vielen Orten als hart bewährt.

Souvenir de la reine des Belges, Blumen groß, voll, feurig hellkarmin, Blumenblätter dachziegelartig geordnet.

Souvenir de Lewison Gower, Blumen sehr groß, voll, dunkelrubinroth, in Hellrubinroth übergehend; schön belaubt; Wuchs kräftig. Auch zur Topfkultur geeignet.

Souvenir de l'exposition de Darmstadt (Soupert et Notting), 1872, Blumen groß, gefüllt, schöne Form, äußere Blumenblätter schwärzlich, sammetig-dunkelviolett und blutroth, Centrum feurig karminroth, Rückseite der Blumenblätter lila, in Pflaumen- oder Stahlblau übergehend, reiche Färbung.

Souvenir de Madame Hennecart (Cochet), 1873, Blumen groß, gefüllt, schöne Form, leuchtend rosa, in Hellrosa übergehend; extra.

Souvenir de Monsieur Boll, Blumen sehr groß, gefüllt, vollendet schön gebaut, ceriseroth; Wuchs kräftig.

Souvenir de Romain Desprez (Jamin), 1873, Blumen groß, gefüllt, schöne Haltung, äußere Blumenblätter breit, fleischfarbigrosa, schieferfarben nüancirt, Centrum leuchtender.

Souvenir de William Wood, Blumen groß, sehr gefüllt, rund gebaut, dunkelschwarzpurpur mit feurigem Reflex. Wohl die dunkelste Prachtrose von großem Effekt.

Souvenir du Dr. Davier (Moreau-Robert), 1872, Blumen mittelgroß, kugelförmig, Haltung vollkommen, dunkel-sammetig-roth; Wuchs kräftig.

Souvenir du général Douai (Pernet), 1872, Blumen groß, beinahe gefüllt, schön leuchtend rosa; Wuchs kräftig.

Thomas Methven, Blumen groß, voll und schön gebaut, brillant karmin.

Thorin, Blumen groß, voll, leuchtend rosapurpur, sehr wohlriechend; von kräftigem Wuchse.

Thyra Hammerich, Blumen sehr groß, sehr gefüllt, anfänglich eine Schale bildend, deren Ränder sich später zu einer mehr flachen Blumengestalt ausbreiten, weiß mit sehr zartem, fleischfarbenem Rosa tingirt, das an der Basis der Blumenblätter etwas lebhafter wird. Eine sehr werthvolle Rose.

Tournefort, Blumen groß, sehr gefüllt, von sehr effektvollem Mohnroth. Von Général Jacqueminot abstammend.

Triomphe d'Alençon, Blumen groß, voll, lebhaft glänzend roth.

Triomphe d'Amiens, Blumen leuchtend karmin, dunkelpurpurbraun gestreift; eine werthvolle Prunkrose; Général Jacqueminot sehr ähnlich.

Triomphe d'Angers, Blumen groß, gefüllt, sammetig-dunkel-purpur mit Feuerroth nüancirt; sehr anhaltend blühend.

Triomphe de Bagatelle, Blumen sehr groß, gefüllt, leuchtend karminrosa.

Triomphe de Caen, Blumen groß, gefüllt, dunkel-sammetig-purpur mit Feuerroth nüancirt. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Triomphe de Français, Blumen leuchtend karmoisinroth, groß, in Büscheln stehend, sehr reichblühend.

Triomphe de Gand, Blumen groß, voll und schön gebaut, leuchtend roth, weißlich umrandet.

Triomphe de l'exposition, Blumen groß, gefüllt, leuchtend sammetigroth, von schönem Bau; gut remontirend; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, desgleichen zur Topfkultur und zum Treiben. Hat sich an vielen Orten als hart bewährt.

Triomphe de Montrouge, Blumen groß, voll, schön hellroth.

Triomphe de Paris, Blumen ſehr groß, voll, dunkelroth mit ſchwarzrothem Sammet, von ſehr feurigem Kolorit. Zu niedrigen Gruppen, ſowie zur Topfkultur geeignet.

Triomphe des beaux-arts, Blumen groß, leicht gefüllt, ſammetig-karmoiſin, ſehr ſchön gebaut und imponirend, dem Général Jacqueminot, von dem ſie abſtammt, ſehr ähnlich.

Triptolème, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend ſcharlachroth.

Vainqueur de Goliath, Blumen ſehr groß, voll, ſchön gebaut, leuchtend glänzend roth, von großem Effekt.

Van Houtte, Blumen ſehr groß, voll, prächtig centifolienförmig, amarant-feuerroth, Ränder der Blumenblätter ſchwarz-karmoiſin.

Velours pourpre, Blumen groß, gefüllt, glänzend ſammetig-karmoiſin mit dunkelbraun-ſcharlachrothem und violettem Schein; Wuchs mäßig.

Vicomte Maison, Blumen groß, voll und von ſchönem Bau, hellkarmin-kirſchroth, ſilberweiß ſchattirt.

Vicomte Vigier, Blumen groß, voll und gut gebaut, glänzend violettroth. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Vicomtesse de Vézins, Blumen ſehr groß, voll und gut gebaut, ſehr friſches, leuchtendes Roſa.

Victor de Bihan, Blumen ſehr groß, voll und ſchön gebaut, leuchtend karminroth.

Victor Trouillard père, Blumen ſehr groß, dicht gefüllt und ſchön gebaut, ſchön roth in violett übergehend.

Victor Verdier, Blumen centifolienroſa, leuchtend karmin ſchattirt, ſehr groß, voll und gut gebaut; ſchön belaubt; Wuchs kräftig. Zur Pyramidenform geeignet, ſowie zur Topfkultur und zum Treiben.

Victor Verne (Damaizin), 1872, Blumen groß, gefüllt, vollkommene Form, johannisbeerenroth, von großem Effekt; Wuchs kräftig.

Ville de Laon, Blumen groß, voll und von ſchönem Bau, ſchön roſa mit metalliſch ſeidenartigem Silberglanz.

Virgilie (Guillot père), 1872, Blumen ſehr groß, beinahe gefüllt, ſchöne Form, lachsfleiſchfarbig roſa, ganz neue Färbung; von kräftigem Wuchſe und ausgezeichneter Belaubung.

Virginale, Blumen faſt rein weiß, mittelgroß, in gutem Boden bisweilen groß, ſchön gebaut, etwas weniger gefüllt als Mademoiselle Bonnaire, aber ebenfalls eine werthvolle weiße Remontante; Wuchs etwas ſchwach. Iſt etwas zärtlich und verlangt guten Winterſchutz.

Vulcain, Blumen mittelgroß, faſt gefüllt, dunkelpurpur-violett.

Wilhelm Pfitzer, Blumen groß, gefüllt, schön scharlachroth. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

William Jesse, Blumen sehr groß, sehr gefüllt, hellkarmoisin mit purpurnem Anflug, von schönem Centifolienbau und Centifoliengeruch; Wuchs aufrecht, mäßig. Zu Gruppen, sowie zur Topfkultur und zum Treiben geeignet. Hat sich an vielen Orten als hart bewährt.

William Paul, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend karmoisinroth. Sehr reichblühend.

William Rollisson, Blumen groß und voll, kugelförmig, prächtig leuchtend scharlach mit kirschroth.

Xavier Olibo, Blumen groß, voll, schwarzsammetig, mit sehr leuchtend feurigem Amarantroth schattirt.

12. Rosa gallica, L. — Rose de Provence.

Die französische Rose; Provinzrose; Zuckerrose; Essigrose; rothe Apothekerrose; Gartenrose.

Hat mit der Centifolie gleiche Gattungsmerkmale, von ihr aber unterschieden durch die oberseits kahlen, unterseits bläulich grünen oder weißlichen, feinfilzigen, meist drüsenlosen ovalen oder rundlichen, spitzen oder abgerundeten Blättchen; die Blüthen stehen einzeln oder auch zu 2 bis 3 auf drüsenborstigen Stielen; Kelchzipfel fiederspaltig, sehr drüsig; Stacheln gedrungen, ungleich; Blumen voll, halbvoll, wohlriechend, weiß, rosenroth, violett, lila, bläulich, aschgrau, gestreift, marmorirt, punktirt. Sie stammt aus dem südlichen Frankreich und erreicht eine Höhe von 0,31—1 Meter. — Die französische Rose ist eine der härtesten, am wenigsten anspruchsvollen, reichblühendsten, aber leider weniger duftenden Rosen, und viele Varietäten aus dieser Gruppe besitzen den Fehler, daß sie zarte und hinfällige Blumenblätter besitzen, daher bei heißem Wetter und Regen, sowie nach dem Pflücken zu schnell vergehen. Aber wegen ihrer vielen anderen Vorzüge ist sie hauptsächlich denjenigen Rosenliebhabern zu empfehlen, bei denen Rosen im Allgemeinen nicht gut gedeihen wollen. Obgleich sie in jedem Boden und in jeder Lage gedeihen, so entwickeln sie doch ihre Blumen am schönsten, wenn sie einen lockern, fetten, warmen Sandboden und einen sonnigen Standort haben. In dieser Gruppe herrscht eine außerordentliche Mannichfaltigkeit und ihre Blumen zeichnen sich durch ihre Fülle, ihren vollkommenen Bau und ihre Regelmäßigkeit in der Stellung der Blumenblätter aus. Das Holz ist dick, kurz, und bildet gedrungenere, regelmäßigere und laubreichere

Büsche, als das der übrigen Gattungen. Sie gedeihen auch gut als Hoch- und Niederstamm. Die Kronen müssen gut ausgedünnt werden, da sie viel überflüssiges Holz machen; die stehen gelassenen Triebe aber stutze man so weit ein, daß 4 bis 6 kräftig entwickelte Augen bleiben.

Adèle Prévost, Blumen groß, voll, zartblaßrosa; zeichnet sich unter allen durch ihren Blüthenreichthum, durch die ausgesuchteste Form der Blumen und durch ihr zartrosiges Kolorit aus. Eignet sich gut zur Bildung von Gruppen, gedeiht gut veredelt als Hoch- und Niederstamm und ist auch zur Topfkultur zu verwenden.

Belle de jardin, Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, purpurroth mit leuchtend violett karmin, panachirt und gestreift mit rein Weiß. Neuheit von 1873, welche nach Aussage des Züchters (Guillot fils) Oeillet parfait und Perle des panachées übertreffen soll.

Blanche fleur, Blumen prächtig fleischfarbenweiß, groß, voll; verdient besondere Empfehlung, da sie außerordentlich reich blüht und in dieser Hinsicht keine andere Rose derselben Färbung mit ihr verglichen werden kann. Vorzüglich als Gruppenrose, sowie als Einzelpflanze; auch zur Topfkultur geeignet.

Boule de Nanteuil, (Comte de Nanteuil), Blumen sehr groß, voll, dunkelkarmoisinroth, Centrum zuweilen feurigkarmoisin, eine der besten Rosen dieser Färbung; Wuchs mäßig. Zur Topfkultur geeignet.

Cynthie, Blumen sehr groß, gefüllt, schalenförmig, rothpurpurn, violett angehaucht, mit weißer Rückseite, zeichnet sich durch reichen Flor aus.

George Vibert, Blumen groß, gefüllt, schalenförmig, rothpurpurn, violett angehaucht, mit weißer Einfassung; Wuchs kräftig.

Grandissima, (Louis Philippe), Blumen sehr groß und voll, von kompaktem Bau, dunkelkarmoisin; Wuchs mäßig. Auch zur Topfkultur geeignet.

Laetitia la volupté, Blumen groß, voll, von bewundernswürdiger Regelmäßigkeit, hellilafarbig. Eignet sich zur Topfkultur und ist eine wahre Ausstellungsrose.

Latour d'Auvergne, Blumen groß und voll, schalenförmig, rosakarmoisin, zuweilen in purpurartiges Karmoisin übergehend; Wuchs mäßig; zeichnet sich durch schöne dunkle Belaubung aus, Zur Topfkultur geeignet und ebenfalls eine schöne Ausstellungsrose.

Oeillet flambant, Blumen groß und sehr gefüllt, schalenförmig, weiß, auffallend rosa und rosalila gestreift; bringt ihre Blumen häufiger dem Charakter treu, als im Allgemeinen sonst die gestreiften Rosen.

Oeillet parfait, Blumen rein weiß, auffallend karmoisinrosa gestreift, die letztere Farbe mit Purpur schattirt, mittelgroß, gefüllt, schalen-

förmig; kann als eine der besten panachirten Rosen angesehen werden. Eignet sich auch zur Topfkultur.

Perle des panachées, Blumen weiß, rosafarben gestreift, mittelgroß, voll, von flachem Bau; Wuchs mäßig; ebenfalls eine der besten unter den gestreiften Rosen.

Tombeau de Napoléon, Blumen groß, voll, schwärzlichviolettpurpur; die Blumenblätter dachziegelförmig liegend; eine der schönsten dunkelsten; Wuchs mittelmäßig.

Tricolore de Flandre, Blumen mittelgroß, voll, weiß und karmoisin, lila und amarantroth gestreift; eine sehr schöne panachirte Rose. Sie entfernt sich durch ihren etwas kletternden Wuchs von den eigentlichen Provinzrosen; eignet sich zur Ueberkleidung von Mauern und Säulen mehr, als zur Bildung von Büschen.

13. Rosa arvensis Hud. — R. capreolata — Rosier Ayrshire.

Die Ayrschire-Rose; Feldrose; Ackerrose.

Die Aeste sind lang, peitschenförmig, niederliegend, krumstachelig; Blätter nicht bleibend, abfallend; Blättchen rundlich, elliptisch bis oval, kahl, unterseits blaßgrün; Kelchzipfel ei-lanzettlich, schwach fiederspaltig; Blüthen langgestielt, meist doldig, selten einzeln, weiß oder blaßrosa; Griffel in eine Säule verwachsen, kahl; Früchte kugelig, oder ellipsoidisch, roth, kahl.

Die Stammform dieser Gruppe ist ein Strauch mit 1 bis 2 Meter langen, schlaffen, niederliegenden, in Gebüschen der Wälder und in Hecken fortrankenden Aesten, welcher in Mitteleuropa, auch hier und da in Deutschland wild vorkommt. Ihre Abarten zeichnen sich noch mehr durch die langen peitschenförmigen niederliegenden Triebe aus, weshalb sie sich auch vortrefflich zur Bildung von hohen Säulen und Pyramiden, zum Bekleiden von Lauben und Wänden, hochstämmig veredelt zu Trauerrosen verwenden lassen. An Stellen, wo sie im Winter der Sonne nicht ausgesetzt sind, leiden sie nicht vom Frost, dagegen aber leicht an sonnigen Standorten, weshalb sie an solchen etwas geschützt werden müssen. Bis zu 20 Grad Kälte ertragen sie ohne Schutz. Sie wachsen noch kräftig an solchen Orten, wo eine andere Rose kaum das Leben fristen würde; in gutem humusreichen Boden entwickeln sie sich aber besonders üppig. Auf Hochstämmen veredelt, liefern sie Trauerrosen von reizender Form. Auch können sie dazu verwendet werden, kahle Stellen und besonders vegetationsarme Hügelabhänge in kurzer Zeit zu decken oder Felsenpartien zu dekoriren.

Carnea plena, Blumen mittelgroß, gefüllt, fleischfarben. Wie die folgenden zu verwenden.

Dundee Rambler, Blumen mittelgroß, gefüllt, schön gebaut, weiß mit röthlichen Rändern in reichen Bouquets stehend; Wuchs üppig. Ist zur Bildung von Pyramiden und Säulen, zur Bekleidung von Wänden ꝛc., und als Trauerrose zu verwenden.

Lutea-alba plena, Blumen gelblich weiß, schön gebaut. Wie die vorige zu verwenden.

Madame d'Arblay, Blumen groß, gefüllt, weiß, in reichen Bouquets stehend. Wie die vorigen zu verwenden.

Madame Lauriol de Barny, Blumen sehr groß, voll, imbriquirt, schön rosa, sehr kräftig wachsend und wie die andern zu verwenden.

Marmorea plena, Blumen mittelgroß, voll, weiß, roth marmorirt.

Ornement des bosquets, Blumen von Form und Farbe der gewöhnlichen Monatsrosa, (semperfl. pallida), sehr reichblühend, macht aber nur kurze Triebe, daher mehr als niederstämmige Trauerrose, oder zur Bekleidung nur niedriger Gegenstände zu verwenden.

Rose ruge, Blumen groß, gefüllt, schalenförmig, blaßfleischfarben, in Gelblichweiß übergehend, sehr angenehm theeartig duftend. Eine sehr werthvolle Rose zu Pyramiden und Säulen, eignet sich als Kletterrose für schattige Stellen und bildet eine herrliche Trauerrose.

Rubra plena, (Miller's Climber), Blumen rosa, halbgefüllt; ist die leuchtendste unter den Rankenrosen. Wie die vorhergehenden zu verwenden.

Splendens, (scandens), Blumen fleischfarben, Knospen karmoisin; sehr reichblühend. Eignet sich ihres raschen Wachsthums wegen vorzüglich zur schnellen Bekleidung von Wänden u. s. w., sowie zu hohen Pyramiden und Säulen.

Splendid garland, Blumen weiß mit fleischfarbenem Anhauch; sehr reichblühend. Wie die vorigen zu verwenden.

Thoresbiana, Blumen klein, gefüllt, weiß, in reichen Bouquets stehend.

Venusta pendula, Blumen mittelgroß, fast gefüllt, weiß, zartrosa angehaucht. Ist, wie Ornement des bosquets, von weniger starkem Wuchse, daher wie diese zu verwenden.

Virginalis superbissima, Blumen mittelgroß, gefüllt, rein weiß, in Büscheln stehend; ist eine sehr schöne und raschwachsende Rose, friert aber selbst in weniger harten Wintern zurück, verlangt daher eine gute, trockne Bedeckung. Wie die vorigen zu verwenden.

II. Nebenblätter an den blühenden Aestchen deutlich breiter und anders geformt als die an den blüthenlosen.

1) Früchtchen in der Kelchröhre **langgestielt** (so lang als die Früchtchen).

14. Rosa alba L. — Rose blanche.

Die weiße Rose.

Die Stacheln sind sichelförmig, derb, zusammengedrückt, verschieden geformt; die Blättchen der abfälligen Blätter sind rundlich oder elliptisch, einfach, oder fast doppelt gesägt, unterseits weichflaumig, bläulichgrün, oberseits dunkelblaugrün; die Kelchzipfel sind fiederspaltig, ohne Anhang, nebst den Blüthenstielen drüsig, borstig; die Blüthen wohlriechend, rein weiß oder roth angeflogen, meist gefüllt; Frucht kahl, Früchtchen in der Kelchröhre langgestielt. 3 bis 4 Meter hoher, süddeutscher Strauch.

Von dieser einheimischen Rose wurden s. Z. in den Gärten gegen 60 gefüllte Spielarten kultivirt. Dieselben können als Hoch- und Niederstamm erzogen werden, gedeihen aber am besten wurzelächt und sind im Bezug auf Boden und Lage durchaus nicht wähleriſch. Sie verlangen nur einen mäßigen Schnitt.

Celestial, Blumen mittelgroß, voll, blaßrosa-fleischfarben, von Schalenform; kann als eine der schönsten dieser Gruppe betrachtet werden. Eignet sich gut zur Säulen- und Pyramidenform.

Félicité Parmentier, Blumen mittelgroß, voll, weiß mit fleischfarbenem Herz; sehr reichblühend, Wuchs aufrecht, kräftig. Eine gute Säulenrose.

Gabrielle d'Estrées, Blumen groß, weiß, mit chamoisfleischfarbenem Herz.

Jacob von Baden, Blumen groß, sehr schön gebaut, weiß mit chamoisfleischfarbenem Anhauch.

Koenigin von Daenemark, Blumen mittelgroß, voll, ausgebreitet, rosa oder hellkarmin; Wuchs aufrecht, kräftig. Zur Säulen- und Pyramidenform geeignet.

La Séduisante, Blumen groß, voll, prächtig zartrosa; Wuchs aufrecht, kräftig; Triebe dicht mit kleinen rothen Stacheln besetzt. Eine schöne Rose, welche sich durch Größe und Füllung der Blumen auszeichnet. Eignet sich auch zur Topfkultur.

Madame Audot, Blumen groß, voll, schalenförmig, glänzend fleischfarben, die Blumenblätter gelblich rosa gerandet; Wuchs ästig, mäßig. Zeichnet sich durch Größe und Füllung der Blumen aus und eignet sich auch gut zur Topfkultur.

Madame Legras, (Le gras St. Germain), Blumen rein weiß, im Centrum bisweilen gelblich weiß, sehr groß und voll. Auch zur Topfkultur geeignet.

Maiden's blush, Blumen mittelgroß, voll, kugelförmig, weißlichrosa. Ist ebenfalls als eine der schönsten dieser Gruppe anzusehen.

Sophie de Marsilly, Blumen groß, voll, von prächtigem Bau, rein weiß mit blaßfleischfarbenem Herz; sehr stachelreich; Wuchs kräftig. Diese Rose würde vielleicht als die schönste dieser Gruppe gelten können, wenn ihre Blumen nicht gar zu leicht von Wind und Regen zerstört würden; sie ist deshalb eher zur Topfkultur zu empfehlen und eignet sich auch recht gut zum Treiben.

Surprice, Blumen mittelgroß, zartrosa, weiß umrandet.

Zu dieser Abtheilung gehören noch R. canīna *L.*, R. pomifĕra *Herm.*, R. tomentōsa *Sm.*, R. coriifolĭa *Fries*, R. rugōsa *Thunb.*, (Regeliana Linden et André), welche, obwohl sie (ausgenommen die letztere etwa) keinen blumistischen Werth haben, doch der Vollständigkeit halber beschrieben werden sollen:

1. Rosa canīna *L.*, Hundsrose, Hagebutte, Heckenrose. Strauch von 3 bis 4 Meter; Stacheln sichelförmig, derb, zusammengedrückt; Blättchen oval oder elliptisch, oft zugespitzt, 1- bis 3fach gesägt, oberseits lebhaft grün, unterseits kahl oder flaumig; Kelchzipfel mit langem Anhange; Blumen rosen- oder fleischroth oder fast weiß, einfach; Frucht länglich oder elliptisch, kahl, roth, erst im Herbste nach den ersten Frösten reifend. Erscheint überall durch ganz Deutschland in Gebüschen und Hecken. Ihre Verwendung als Unterlage ist hinlänglich bekannt.

2. Rosa pomifĕra *Herm.* (R. villosa *L.*), Apfelrose. Strauch 2 bis 3 Meter hoch; Stacheln verschieden geformt, derb, aus verbreitertem, zusammengedrücktem Grunde, pfriemlich, ungleich; Blättchen oval bis länglich-lanzettlich, unterseits feinfilzig und sehr drüsig, wie die Blattstiele; Blüthenstiele drüsenborstig; Blüthen rosenroth, einzeln; Blumenblätter am Rande drüsig-gewimpert; Frucht kugelig, kirschgroß, abwärts geneigt, drüsenborstig, violett, grau bestäubt und gekrönt von den zusammenschließenden, drüsigen Kelchzipfeln.

Die Apfelrose wächst in den deutschen Gebirgswäldern, den Voralpen, in Tyrol, Salzburg ꝛc. Sie wird auch ihrer schönen großen, trüb violetten

Früchte wegen kultivirt, weil diese nicht im Spätherbste knorpelig-hart, wie bei den übrigen Arten, sondern schon im August weich sind und deswegen in medicinischer wie ökonomischer Hinsicht allen andern, besonders zu Compots, vorgezogen werden.

3. Rosa tomentōsa *Sm.*, Filzblätterige Rose. Ein kurzästiger, 1,25 bis 2 Meter hoher Strauch, der häufig in Gesellschaft der Hundsrose wächst; Stacheln von verschiedener Größe und Dicke, sichelförmig und gerade; Blättchen eiförmig oder oval, spitz, doppelt-drüsig-gesägt, oberseits grün, zerstreut-kurzhaarig, unterseits graufilzig, drüsenlos; Blüthen kurzgestielt, einzeln, selten doldentraubig, roth; Kelchzipfel zurückgeschlagen, zuletzt abfallend; Frucht aufrecht, kugelig, roth. Ihre größeren Früchte werden häufiger als die Früchte der Hundsrose zum Einmachen benutzt, weshalb sie auch kultivirt wird.

4. Rosa coriifolĭa *Fries.*, Lederblätterige Rose. Diese Rose wird nach Thuillier auch für eine Spielart der Hundsrose (Rosa canina var. dumetorum) gehalten. Die Stacheln sind von verschiedener Größe, sichelförmig; Blättchen etwas lederartig, drüsenlos, anfangs beiderseitig graufilzig, später oberseits fast kahl; Kelch aufrecht, bleibend; Blüthen fast sitzend; Frucht kugelig, roth.

5. Rosa rugōsa *Thunb*, (Regeliana Linden et André). Strauch 1,50 bis 2 Meter hoch. Zweige bräunlichgrau, ziemlich dicht mit ungleich großen pfriemlichen Stacheln besetzt; Blattstiel ebenfalls mit Stacheln besetzt; Blätter aus 3 bis 7 Blättchen bestehend, Blättchen oval zugespitzt, glatt, glänzend, oberseits üppig dunkelgrün, unterseits graugrünlich, Blüthenstiele glatt; Blüthen in endständigen Doldentrauben stehend, von eigenthümlicher weinrother Farbe, einfach; Kelch aufrecht, bleibend; Frucht fast kugelrund, glatt, sehr schön roth.

Diese neu aus Japan eingeführte, aber vollständig harte und Effekt machende Rose verdient in Sammlungen, sowie in Landschaftsgärten einen Platz. Der Hauptwerth derselben möchte aber darin bestehen, daß sie eine gute Stammmutter zur Hervorbringung neuer Spielarten mittelst künstlicher Befruchtung abgeben mag. Auf dem Wege eigner Befruchtung ist schon eine weiße Abart aus ihr hervorgegangen.

15. Rosa rubiginosa L. — Rosier églantier.

Die rostfarbige Rose; Weinrose; Wohlriechende Zaunrose.

Die Stacheln sind ungleich stark, sichelförmig und fein; Blättchen unterseits sehr drüsig-punktirt, am Rande drüsig-gewimpert und klebrig, oval oder elliptisch-rundlich, klein; Blatt- und Blumenstiel, sowie Kelchzipfel drüsig-borstig; Blumenblätter nicht drüsig-gewimpert; Blüthen einzeln oder trugdoldig, roth; Frucht aufrecht, roth, kahl, kugelig oder ellipsoïdisch, an der Spitze nicht verschmälert; Früchtchen in der Kelchröhre langgestielt.

Die Weinrose kommt fast in ganz Deutschland in Gebüschen, Hecken und an trocknen Waldrändern vor, erreicht eine Höhe von 2 bis 3 Meter und macht sich, besonders bei warmer feuchter Luft durch ihren weinartig

aromatiſchen Duft bemerkbar. Sie und ihre Varietäten ſind ſehr hart, verlangen keine beſondere Kultur, gedeihen in jedem Gartenboden und wachſen gleich gut als Stammbäumchen oder niedrig gezogen. Der Verwendung der Stammform als Veredlungsunterlage, ſowie zu Hecken iſt ſchon §. 87 gedacht worden.

Celestial, Blumen blaßroſa, halbgefüllt, Form kompakt; Wuchs kräftig.

Chinensis, Blumen ſchön hochroſa, mittelgroß, gefüllt; Form kompakt; Wuchs aufrecht, niedrig.

Maiden's blush, Blumen blaßroſa, gefüllt.

Mossy, Blumen hellroſa, die Knospen mooſig.

Scarlet, (La belle distinguée), Blumen prächtig roſakarmin, klein und ſehr gefüllt, von kompakter Form; Wuchs aufrecht, mäßig.

Superbe, Blumen prächtig roſa, voll, ſchalenförmig; Wuchs ſtark.

2) Früchtchen in der Kelchröhre **kurzgeſtielt.**

16. Rosa alpina, L. — Rose des Alpes.

Die Alpen-Roſe; Bourſault-Roſe.

Die mehrjährigen, niederliegenden, kaum 31 Centim. hohen Stengel ſind faſt ſtachellos; die jungen jährigen Schoſſen mit borſtenförmigen, geraden, drüſenloſen Stacheln beſetzt; die Nebenblätter der 7- bis 11-zähligen, abfallenden Blätter ſind an den blühenden Aeſten breiter und anders geformt, als die an den blüthenloſen; die Blättchen ſind länglich oder elliptiſch, einfach, bis doppeltdrüſig geſägt, kahl oder behaart; die Kelchzipfel ungetheilt, lanzettlich, länger als die rothe Blumenkrone, oben über die elliptiſche oder längliche Frucht zuſammengeneigt; die Fruchtſtiele ſind zurückgekrümmt; die Blüthen ſtehen einzeln, paarig oder doldentraubig.

Dieſe Roſe wächſt durch die ganze Alpenkette Mitteldeutſchlands, und da ſie mehr als die Hundsroſe zur Erzeugung einer großen Menge feiner Faſerwurzeln in beſchränktem Raum geneigt iſt, ſo eignet ſie ſich vortrefflich zu Unterlagen von Topfroſen; beſonders gedeihen Bengal- und Theeroſen ſehr gut auf ihr. Die Bourſaultroſe (Rosa Boursaulti), eine Hauptvarietät der Alpenroſe, zeichnet ſich durch einen kräftigen Wuchs und lang geſtreckte glatte und etwas hängende Triebe aus, die nicht ſelten ohne Stacheln ſind und auf der einen Seite eine röthliche Färbung zeigen. Außerdem ſind die Augen weiter auseinander gerückt, als es bei den übrigen Gruppen der Fall

ist. Die Blätter bestehen aus 7 bis 9 ovalen, doppelt gesägten Fiederblättchen. Die Blüthen stehen theils einzeln, theils zu mehreren beisammen. Sie verlangt einen etwas geschützteren Standort und eignet sich wegen ihres kräftigen, hohen Wuchses vortrefflich zur Bekleidung von Mauern, Lauben, Bogengängen, Nischen, zur Bildung von hohen Säulen und Pyramiden, sowie hochstämmig veredelt zu Trauerrosen. Sie liebt einen guten, mäßig feuchten, lockern Boden. Beim Schneiden dünnt man sie nur stark aus, stutzt dagegen die stehenbleibenden stärkern Zweige nur mäßig ein.

Amadis, (Crimson), Blumen vom schönsten Purpur, mehr oder weniger mit lebhaft Karmoisin schattirt, groß und halbgefüllt, schalenförmig, erscheinen in hunderten schon Anfang Mai an gänzlich stachellosen Zweigen; die jungen Triebe sind weißlichgrün. Sie bildet einen kräftigen Strauch, welcher eben so gut in voller Sonne, wie im Schatten, und ganz unabhängig von Boden und Lage gedeiht. Nichts eignet sich besser zur Bekleidung von Gittern, Kolonnaden, Säulen und dergl., als diese kletternde Rose; sie steigt bis an 7 Meter hoch. Sie darf nur sehr wenig beschnitten werden, wenn sie reichlich blühen soll.

Belle de Lille, Blumen fleischfarben, mittelgroß; reichblühend; Wuchs kräftig. Verlangt etwas geschützten Standort. Als Trauerrose besonders zu empfehlen.

Blush Boursault, (Florida), Blumen sehr groß, sehr gefüllt, kugelförmig, blaßrosa mit fleischfarbigem Centrum; Wuchs kräftig, hängend; sie behält ihre Blätter länger als die andern dieser Gruppe. Außerordentlich reichblühend, verlangt aber eine gute Lage, wenn sie als Kletterrose ihrer Bestimmung entsprechen und die Blumen vollkommen entwickeln soll.

Drummond's thornless, Blumen groß, halbgefüllt, schalenförmig, beim Aufblühen rosakarmin, dann in Blaßroth übergehend; Wuchs kräftig, hängend. Eignet sich sehr gut zur Trauerrose.

Élégance, Blumen mittelgroß, gefüllt, purpurn mit weißen Streifen, in großen Büscheln stehend.

Gracilis, Blumen lebhaft kirschroth mit Blaßlila schattirt, von mittlerer Größe, voll, schalenförmig; von starkem ästigen Wuchse; Stacheln einzeln, groß und lang; Blätter ganz dunkelgrün, halten sich länger als bei den andern beiden Sorten dieser Gruppe. Außerordentlich blüthenreich, verlangt aber eine gute Lage, wenn sich die Blumen vollkommen entwickeln sollen.

Maheka, Blumen gefüllt, mittelgroß, purpurroth nüancirt.

Zu dieſer Abtheilung gehören noch die weniger blumiſtiſchen Werth habenden: R. lucĭda *Ehrh.*, R. rubrifolĭa *Vill.*, R. cinnamomĕa *L.* und R. turbinăta *Ait.*

1. R. lucĭda *Ehrh.* (R. baltĭca *Rth.*), Glänzendblätterige oder ſpiegelnde Roſe. Ein 1 bis 1,50 Meter hoher Strauch aus Nordamerika, wo er an Ufern von Flüſſen und Seen vorkommt. Stacheln ſchwach, gerade; Blättchen 7 bis 9, länglich lanzettlich, oberſeits glänzend grün, einfach geſägt, beiderſeits kahl; Kelchzipfel mit ſehr langem, an der Spitze gezähntem Anhange, von den frühreifenden Früchten abfallend; Blüthen einfach oder gefüllt, mittelgroß, doldentraubig, roſen- oder hellpurpurroth, etwas wohlriechend; Frucht plattkugelig, etwas ſcharfborſtig, ſchwarzbraun; Fruchtſtiele gerade.

Für Parkanlagen iſt dieſe Roſe wegen ihrer ſchönen glänzenden Belaubung ſehr ſchätzbar.

2 Rosa rubrifolĭa *Vill.*, Rothblätterige Roſe. Strauch von 1 bis 2 Meter Höhe, in Alpenthälern Süddeutſchlands, auch in Thüringen wildwachſend. Die Zweige ſind bläulich bereift und überhängend; die größeren Stacheln ſichelförmig, die kleineren ſchlank, entfernt ſtehend; Blättchen länglich oder elliptiſch, ſpitz, matt, unten ſchimmelgrün, mehr oder weniger roth geadert; Kelchzipfel mit langen, meiſt ganzrandigen Anhängſeln; Blüthen dunkelroſenroth, einfach; Frucht kugelig, frühreifend, markig, kahl, blutroth.

Dieſe Roſe iſt durch ihre anfangs purpurroth und ſpäter eigenthümlich bläulich-roth ſchimmernde Belaubung ein ſehr werthvoller Strauch für Parkanlagen, der mit jedem Standort fürlieb nimmt.

3. Rosa cinnamomĕa *L.*, Zimmetbraune Roſe, Zimmetroſe, Pfingſtroſe, Mairoſe. Ein 1,25 bis 2 Meter hoher Strauch, welcher in Mittel- und Südeuropa wild wächſt. Zweige zimmetbraun; Stacheln der Schößlinge gerade, ungleich, drüſenlos; die der Zweige zu zweien am Grunde der Blattſtiele, gekrümmt; Blattſtiele faſt wehrlos; Blättchen zu 5 bis 7, länglich eirund, fein geſägt, unterſeits blaß- oder bläulich-grün, weichhaarig; Blüthenſtiel und Kelch kahl; Blüthen mittelgroß, purpurröthlich, einfach, auch halb gefüllt; Frucht kugelig, kahl, von den zuſammengeneigten Kelchzipfeln gekrönt.

Dieſe Roſe zeichnet ſich durch ihr zeitiges Blühen aus und die Abart majalis, (Mairoſe) mit roſa-purpur gefüllten Blüthen iſt beſonders beliebt.

4. Rosa turbinăta *Ait.*, Kreiſelfrüchtige Roſe, Tapeten-Roſe, Frankfurter Roſe. Strauch von 2 bis 3 Meter Höhe, welcher nur bei Wien mit einfacher Blume wild vorkommt, aber mit halbgefüllter Blume für die Gärten ebenfalls einigen Werth hat. Die Aeſte ſind in der Jugend graugrün; die Stacheln der Schößlinge, ungleich mit drüſentragenden Borſten untermiſcht, verſchwinden im Alter faſt gänzlich; Zweige wehrlos; Blättchen zu 5 bis 7, wie die der vorigen, aber ganz kahl; Kelch drüſig-borſtig; Frucht kreiſelförmig, mit den abſtehenden oder aufrechten Kelchzipfeln gekrönt; Blüthen faſt doldentraubig oder einzeln, groß, halbgefüllt, hellpurpurroth. Wegen ihren langen geraden Triebe eignet ſich die Tapetenroſe zur Bekleidung von Mauern ꝛc.

B. Blätter immer bleibend und nicht abfallend.

I. Zweige hängend.

17. Rosa Banksiae Brown. — Rose de Banks.

Die dreiblätterige oder Banks-Rose.

Strauch schlank, kletternd, rankend oder am Boden hinkriechend, oft bis 5 Meter hoch und höher, unbewehrt; Zweige dünn, dunkelgrün; Stacheln meist fehlend oder sehr klein, verschieden groß; Blätter meistens aus 3 Blättchen zusammengesetzt, zuweilen gefiedert, zuweilen nur ein Blättchen vorhanden, glänzend, immergrün; Blättchen länglich-lanzettförmig, abgestumpft, 3 bis 4 Centim. lang, 1 bis 1½ Centim. breit, oft wellenförmig, einfach gesägt, nackt (außer an der Basis der Mittelnerven, wo sie sehr haarig sind), glänzend, grasgrün; Nebenblätter pfriemlich, manchmal haarig, bald abfallend; Blattstiel bald nackt, bald haarig, rückwärts mit Borsten besetzt; Blumenstiel verzweigt, nackt, dünn, ziemlich lang, am obern Ende dicker; Kelchröhre kugelig, nackt; Kelchblätter eirund, zugespitzt; gleichförmig, ungetheilt, später abfallend; Blumen klein, nickend, kaum von 2½ Centimeter Durchmesser, ziemlich gefüllt, rosettenartig gebaut, weiß oder nankingelb, fein nach Himbeeren, Thee oder Veilchen duftend, gefüllten Kirschenblüthen ähnlich, in Enddoldentrauben stehend; Pistille gesondert, mit rothen Narben; Frucht klein, kugelrund, schwarz, unbewaffnet.

Diese sehr interessante Rose stammt aus China und würde, wenn sie hart genug wäre, unsere Winter im Freien auszuhalten, von unschätzbarem Werthe sein, da ihre Varietäten sich durch einen außerordentlich kräftigen Wuchs auszeichnen und in kurzer Zeit bedeutende Flächen mit ihren kletternden Zweigen und der reizenden Fülle von Blumen bedecken. Alle hierher gehörigen Sorten sind, wenigstens in wurzelächtem Zustande, zu empfindlich gegen unsere norddeutschen Winter, als daß ihre Kultur im Freien gelingen könnte. Auf Hochstamm veredelt sind sie weniger empfindlich, bringen aber, mit Ausnahme von B. alba, keine Blumen. Am besten entwickeln sie sich, in ein Beet ausgepflanzt, an der Wand eines Grünhauses, oder an einem Spalier gezogen. Auf 0,63 bis 1 Meter hohe Stämmchen veredelt, eignen sie sich auch vortrefflich zur Topfkultur. In südlicheren Gegenden wächst sie sehr üppig an einer sonnig gelegenen Mauer, einem Spa-

lier oder einer Laube und ist alljährlich mit vielen Hunderten von Blumen geschmückt. Nach der Blüthe werden die Pflanzen gehörig ausgedünnt und die bleibenden Triebe um wenige Augen zurückgeschnitten.

Alba plena, Blumen klein, voll, rein weiß; sehr niedlich und wohlriechend. Ist weniger empfindlich als die Folgenden, und blüht auf Hochstamm veredelt im Freien ziemlich reich.

Atrolutea plenissima, Blumen sehr voll, mittelgroß, lebhaft gelb.

Lutea, Blumen prächtig gelb, klein, voll; zeichnet sich sehr aus.

Rosea, Blumen gefüllt, lebhaftrosa, schalenförmig.

Rose Fortuné, Blumen mittelgroß, sehr voll, rein weiß.

18. Rosa multiflora Thunb. — Rose multiflore.

Die vielblumige Rose.

Strauch fast kletternd, 3 bis 5 Meter hoch und höher; Zweige dünn, oft braunroth, nackt, hin und her gebogen, zahlreich; Stacheln unter den Nebenblättern paarweise stehend, hakenförmig; Blätter ziemlich groß, aus 5 bis 7 Blättchen zusammengesetzt, immergrün; Blättchen 3 bis 5 Centimeter lang, nahe zusammenstehend, fast stiellos, lanzettförmig, runzelig, oben dunkelgrün, glatt und glänzend, unten matt und filzig, auf beiden Seiten haarig, gezähnt; Blattstiel feinhaarig, seidenglänzend; Blumenstiel lang, wollig; Kelchröhre klein, kreiselförmig, oder zwischen eiförmig und kugelrund; Kelchblätter länglich-eiförmig, gespitzt, zurückgelegt, später abfallend; Blumen klein, einfach oder gefüllt, blaßrosenroth, halbkugelig, sehr zierlich, blos des Abends riechend, in prachtvollen Endsträußen zu 20 bis 30, oft über 100 in einer Dolde, an den Zweigen gleichsam Guirlanden bildend; Pistille in eine Säule verwachsen; Frucht kreiselförmig, klein, hoch- oder hellroth, glatt. Vaterland China und Japan.

Da die hierher gehörigen Varietäten, wenn sie auf zu fettem Boden stehen, sehr hoch wachsen, bevor sie Blüthen entwickeln, so pflanze man sie lieber in einen sandigen, etwas mageren Boden und zwar an einem warmen, sonnigen Standort, am besten gegen eine Mauer oder Bretterwand. Gegen Kälte sind sie sehr empfindlich und pflegen in nicht geschütztem Zustande schon bei 10° R. zu erfrieren, sie müssen daher sorgfältig verwahrt werden. In den kälteren Gegenden ist es vorzuziehen, ihnen einen geeigneten Platz in einem Kalt- oder Orangeriehause oder in einer nur für die Kultur der Rosen bestimmten Doppelpage (s. §. 59) zu geben, wo sie in den freien Grund gepflanzt zur Bekleidung der Pfeiler und Wände dienen

können. Von den aus den Hauptästen entsprossenen üppigen Trieben werden nur so viele gelassen, als der Raum es gestattet; die übrigen entfernt man ganz, die stehengebliebenen werden nur um wenige Augen eingekürzt. Die hervorkommenden Nebenzweige bringen dann hinreichende Blüthenästchen; die abgeblühten Aestchen werden auf 2 bis 3 Augen eingestutzt.

Alba, Blumen klein, gefüllt, weiß.

Carmin velouté, Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, von flachem Bau, lebhaft rosa, in reichen Büscheln stehend.

De la Grifferaye, Blumen groß, voll, blaßrosa, die Knospen hochrosa; sehr kräftig wachsend. Empfiehlt sich als Säulenrose und zur Bekleidung von Gitterwerk.

Graulhié, Blumen mittelgroß, voll, reinweiß, die äußeren Blumenblätter rosa angehaucht, schalenförmig. Auch zur Trauerrose geeignet.

Laure Davoust, Blumen hellrosenroth, in Fleischfarben übergehend, im Verblühen weiß, klein, voll, schalenförmig, stehen in großen eleganten Büscheln beisammen, und es treten meistens die drei Farben an einem und demselben Blumenbüschel gleichzeitig auf. Auch zur Trauerrose geeignet.

Parvula, Blumen sehr klein, von kaum 1 Centim. Durchmesser, sehr gefüllt, beim Aufblühen rosa, in Weiß übergehend, zu 20 — 40 beisammenstehend. Diese Sorte macht weniger lang Triebe als die andern, hält sich auf Hochstamm veredelt leidlich gut im Freien und blüht reichlich.

Russeliana, Blumen mittelgroß, sehr voll, reich dunkellackroth, nach und nach in Lila übergehend, von flachem Bau.

Tricolor, Blumen dreifarbig, hell- und dunkelrosa und weiß gestreift; von kräftigem Wuchse, mit steifen aufrechten Trieben und vielen Stacheln. Ist eine Hybride und weicht sehr von dem Charakter der multiflora ab.

19. Rosa rubifolia Brown. — Rosier de prairie.

Die brombeerblätterige Rose; Prairie-Rose; Michigan-Rose.

Die Triebe sind von geradem, aufwärtssteigendem, nicht rankendem Wuchse, bis zu 5 Meter hoch; Zweige glatt, sparsam stachelig; Stacheln nicht groß, zerstreut stehend, sichelförmig, röthlich, zuweilen nebenblattständig; Blätter groß, den Brombeerblättern ähnlich, auseinanderstehend, aus 5 Blättchen zusammengesetzt; Blättchen eirund, spitzig, groß, blaugrün, oben glänzend und glatt, unten matt und filzig, ungleich gezähnt; Nebenblätter blattständig, röthlich; Blattstiel stark, drüsig, mit einigen Stacheln besetzt; Deckblätter lang, drüsig; Blumenstiel lang, drüsig; Kelchröhre klein, kugel-

förmig, nackt, zuweilen mit Drüſenborſten bekleidet; Kelchblätter drüſig, kurz, mit einigen Anhängſeln; Blumen der Stammform klein, kaum über $2\frac{1}{2}$ Centim. breit, einfach blaßroth, faſt ohne Geruch, die der Spielarten zum Theil ziemlich groß, oft einzeln, meiſtens aber zu dreien beiſammenſtehend; Piſtille in ein längliches Säulchen verwachſen; Frucht klein, rund, nackt roth.

Die Prairierose ſtammt aus Nordamerika; ihre Varietäten und Hybriden ſind reichblühende, ſtarkwachſende Kletterroſen, und gewähren eine nicht gewöhnliche Zierde, wenn ſie große Wände oder ganze Gebäude bekleiden, oder man ſie zur Bildung von großen Säulen und Pyramiden verwendet. Sie blühen ſpäter als alle übrigen Kletterroſen und ſind deshalb von noch beſonderem Werthe. Sie lieben einen warmen ſonnigen Standort, vertragen aber unſere Winter bis zu 20 Grad Kälte recht gut ohne Bedeckung. Das Austreiben von Schößlingen im Herbſte, welche im Winter gewöhnlich erfrieren, verhindert man am beſten dadurch, daß man die Pflanzen mit eintretendem Herbſte trocken zu halten ſucht. Erſcheinen ſie dennoch, ſo müſſen ſie zeitig weggenommen werden. Außerdem befolgt man beim Schneiden dieſelben Regeln, welche bei der R. multiflora angegeben worden ſind.

Anna Maria, Blumen mittelgroß, gefüllt blaßroth.

Beauty of the prairies, Blumen groß, ſehr gefüllt, von kugeliger Form, lebhaft roſenroth, jedes Blumenblatt in der Mitte von einem weißen Streifen durchzogen, in großen Büſcheln ſtehend; zeichnet ſich vor allen anderen durch die Ueppigkeit des Wuchſes und lange anhaltenden Flor aus. Eignet ſich ſehr gut zu Lauben und Bogengängen.

Belle de Baltimore, Blumen mittelgroß, ſehr gefüllt und ſchön gebaut, milchweiß, oft fleiſchfarbig ſchattirt, in großen Bouquets ſtehend. Eine der ſchönſten dieſer Gruppe, beſitzt im Vergleich zu den andern nur einen mäßigen Wuchs und eignet ſich deshalb nur zu kleineren Pyramiden und Säulen, ſowie zur Trauerroſe.

Coradori Allan, Blumen mittelgroß, halb gefüllt, prächtig roſenroth, in großen Bouquets blühend.

Élégance, Blumen mittelgroß, in Weiß übergehend.

Eva Corinna, Blumen groß, gefüllt, zart-blaßroſa. Beſitzt dünnere und ſchlankere Zweige als die andern, iſt daher vorzugsweiſe zur Bildung von Trauerroſen geeignet.

Milledgeville prairies, Blumen hellkarmin.

Miss Hovey, Blumen groß, voll, weiß; ſehr kräftig wachſend.

Perpetual Pink, Blumen mittelgroß, gefüllt, dunkelrosa, in Purpur übergehend; oft im Herbste noch einmal blühend.

Président, Blumen klein, sehr gefüllt, hochrosa; blüht später als die übrigen dieser Gruppe und ist deshalb von besonderem Werthe.

Pride of Washington, Blumen mittelgroß, gefüllt, blaßrosa, von Schalenform.

Queen of the prairies, Blumen mittelgroß, gefüllt, brillant rosa; von vorzüglicher Schönheit.

Triomphant, Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, glänzend-hochrosa; besitzt ein sehr üppiges Laubwerk.

20. Rosa sempervirens L. — R. scandens Mill. — Rosier toujours vert.

Die immergrüne Rose; Kletterrose.

Strauch kriechend oder kletternd, 4 — 6 Meter lange Triebe machend, hellgrün, schwach, sehr verzweigt, an einer Seite röthlich; Stacheln schlank, dünn, oft roth, etwas gebogen oder ganz hakenförmig; Blätter aus 5 — 7 Blättchen zusammengesetzt, immergrün; Blättchen oval oder eirund-lanzettförmig, eben, einfach gezähnt, oben hellgrün, lederartig, glänzend, unten bläßer, an den Blattzähnen drüsig; Blattstiel drüsig mit Stacheln besetzt; Blumenstiel meist nackt, doch auch drüsig; Kelchröhre klein, oval, nackt, glatt; Kelchzipfel oval zugespitzt, einfach, drüsig, kürzer als die Blumenkrone, abfallend; Blumen mittelgroß, zahlreich, mit schwachem bisamartigen Wohlgeruch, in Büscheln oder Dolden beisammen stehend; Pistille in eine lange haarige Säule vereint; Frucht klein, rund oder länglichrund, nackt, glänzend, orangeroth.

Die Sempervirens ist in Südeuropa und Süddeutschland einheimisch und paßt zu gleichen Zwecken wie die Boursault-, Ayrshire-, die vielblumige und die Prairierose. Am nächsten steht sie der Ayrshirerose, übertrifft aber dieselbe in sofern, als ihre Blumen nicht einzeln, sondern in reichen reizenden Büscheln beisammen stehen und sie ihre dunkelgrünen Blätter bis in den Winter hinein behält; völlig immergrün ist sie in unserm nördlichen Klima nicht. Sie liebt einen guten, mäßig feuchten Boden, östliche oder westliche Lage an Gebäuden, verlangt einen leichten Winterschutz und denselben Schnitt wie die anderen schlingenden Rosen.

Adelaïde d'Orléans, (Léopoldine, d'Orléans) Blumen mittelgroß, voll, kugelförmig, blaßrosa, in großen Büscheln stehend; wächst sehr kräftig und gedeiht auch an einer schattig gelegenen Wand. Sie ist gut zur

Bedeckung von kahlen Stellen oder steinigen Flächen zu verwenden und schön als Trauerrose.

Carnea grandiflora, Blumen fleischfarben, groß, gefüllt, von Schalenform.

Donna Maria, Blumen reinweiß, mittelgroß, schalenförmig, stehen in großen schönen Büscheln; Belaubung blaßgrün; Wuchs weniger kräftig als bei den andern, eignet sich daher besser zu kleineren Pyramiden und Trauerrosen.

Félicité perpétuelle, Blumen mittelgroß, voll, fleischfarben, in Weiß übergehend, stehen in großen Büscheln. Eine der schönsten dieser Gruppe, als Säulenrose, zur Bekleidung von Lauben und Bogengängen, selbst einer schattigen Wand, zur Bedeckung von kahlen Stellen und steinigen Flächen und als Trauerrose zu empfehlen.

Princesse Louise, Blumen mittelgroß, gefüllt, im Aufblühen blaßroth, später rein weiß.

Princesse Marie, Blumen klein, schön schalenförmig, voll, dunkelroth, im Verblühen fleischfarben. Nimmt mit einer schattigen Mauer fürlieb.

Rampante, Blumen mittelgroß, voll, rein weiß; reichblühend, oft nochmals im Herbst. Eignet sich sehr gut zur Bedeckung von kahlen Stellen und steinigen Flächen.

Spectabilis, Blumen blaßrosa, mittelgroß, voll, schalenförmig.

21. Rosa bracteata Wendl. — Rose de Macartney.

Die deckblätterige oder Makartney-Rose.

Strauch 1,50 bis 3,50 Meter hoch, kletternd; Zweige aufrecht, stark, selten schmächtig, wollig oder filzig, stachelig; Stacheln stark gekrümmt, hart, oft borstenartig, zahlreich, zerstreut zu zweien oder auch einzeln unter den Nebenblättern; Blätter immergrün, aus 5 bis 9, gewöhnlich 7 Blättchen bestehend; Blättchen gestielt, 2 Centim. lang, 1 Centim. breit, oval, stumpf gezähnt, glänzend, auf beiden Seiten glatt, an der Hauptrippe der Rückseite behaart, oben dunkler grün als unten, mit sehr sichtbaren Rippen, Nebenblätter blattständig, bleibend, Blattstiel etwas stachelig, zu Zeiten haarig; Deckblätter konkav, oval, borstig, flaumartig; feingekämmt, zu 7 bis 8 in dachziegelförmiger Stellung die Blume umhüllend; Blumenstiel kurz, wollig; Kelchröhre eiförmig, seidenartig wollig; Kelchblätter beinahe einfach, oder ungetheilt, wollig; Blumen einfach, mittelgroß, (5 Centim. breit), beinahe

auf den Deckblättern sitzend oder von ihnen eingehüllt, rein- milch- oder schmutzig weiß, wohlriechend wie Aprikosen; Blumenblätter länger als der Kelch, oval; Blüthen einzeln, selten zu zweien; Pistille nackt, gesondert; Staubgefäße auf die Narben gebogen; Frucht wollig oder zottig, kugelig, pomeranzenroth.

Diese Rose wurde durch den Gesandten Lord Macartney gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts aus China in Europa eingeführt. Leider ist sie gegen Kälte empfindlich und gedeiht blos in südlichen Gegenden, an eine gegen Süden gelegene Mauer gepflanzt, gut, wo sie durch ihre glänzend dunkelgrünen Blätter, die sich bis in den Winter hinein halten, und die niedlichen, nach Aprikosen duftenden Blumen, welche von Anfang Juli bis in den Spätherbst in ununterbrochener Folge erscheinen, eine höchst prachtvolle Bekleidung bildet. In kälteren Gegenden kann sie mit Erfolg blos in Orangerien und Kalthäusern in eine Rabatte gepflanzt, an Pfeilern und Wänden gezogen werden. In einem Rosenhause eignet sie sich vortrefflich zur Bekleidung der Giebelseiten oder der hintern Glasbedachung. Sie darf nur mäßig beschnitten werden.

Lucide duplex, Blumen vom zartesten Blaßrosa, groß, gefüllt, schalenförmig; Habitus ästig; Blätter glänzend und schön.

Maria Léonida, Blumen weiß, im Centrum blaßrosa, zuweilen gelblichweiß, groß und voll, schalenförmig; Wuchs kräftig.

Scarlet Maria Léonida, Blumen prächtig roth, schalenförmig. Nebst der vorhergehenden jedenfalls die werthvollste dieser Gruppe.

22. Rosa mycrophylla Roxb. — Rosier à petites feuilles.

Die kleinblätterige Rose.

Strauch 0,60 bis 2 Meter hoch, von ziemlich gedrungenem Wuchse; Stacheln nebenblattständig, paarweise, gerade, aufwärtsstehend; Blätter immergrün, aus 5 bis 13, ja zuweilen 31 Blättchen zusammengesetzt; Blättchen sehr klein, (2 Centim. lang, 0,5 Centim. breit), glänzend, oval, gespitzt, fein gezähnt, glatt, auf der Unterseite an der fast hervortretenden Mittelrippe stachelig; Nebenblätter frei und abfallend, sehr klein, an der Spitze breiter; Blattstiel mit kleinen Stacheln ziemlich besetzt, sehr weich; Deckblätter schmal, länglich, lanzettförmig zugespitzt, kahl, am Rande drüsig, klein und nahe an der Blume; Blumenstiel kurz; Kelchröhre dick, rund mit Stachelborsten; Kelchblätter ungetheilt, ausgebreitet, zugespitzt, am Rande wollig, sonst ganz mit dichtgestellten geraden Stacheln besetzt, wodurch die Blumenknospen ei-

nem Stechapfel oder einer Kastanienkapsel nicht unähnlich sehen, bleibend; Blumen blaßroth oder rosenroth, in der Mitte dunkler, gegen 5 Centim. breit, stark gefüllt, schalenförmig gebaut, geruchlos; Blüthenstand immer einzeln; Blüthezeit Juni bis August; Frucht dickfleischig, kugelförmig, orangegelb, mit Stacheln besetzt und von den Kelchblättern gekrönt.

Diese schwachwachsende Kletterrose stammt ebenfalls aus China und dem Himalayagebirge, von wo sie in den dreißiger Jahren in Europa eingeführt wurde. Sie ist sehr empfindlich und verlangt dieselbe Behandlung wie die vorhergehende. Veredelt eignet sie sich trefflich zur Topfkultur und blüht dann bis in den Herbst hinein.

Carnea, Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, prächtig rosa, schalenförmig.

Du Luxembourg, Blumen groß und voll, hochroth, blaßrosa schattirt, schalenförmig; Habitus ästig; Wuchs mäßig.

Grandiflora, Blumen groß, voll, rosa, schalenförmig.

Le premier essai, Wuchs sehr kräftig; Blumen mittelgroß, die äußeren Blumenblätter dachziegelartig geordnet, fleischfarbig-weiß, Centrum karminroth, im Verblühen frisch rosa.

Purpurea, Blumen schön, hochpurpurrosa, schalenförmig.

Rubra, Blumen groß und voll, kugelförmig, rosakarmin, blaßrosa eingefaßt; Habitus ästig, Wuchs mäßig.

Striata, Blumen karmoisin, weißgestreift.

Violet cramoisi, (Cramoisi, Rubra violacea), Blumen hellpurpurkarmin, schalenförmig.

II. Zweige aufrecht oder schlank zurückgebogen.

23. Rosa indica Borbonica — Rosier ile Bourbon.

Die Bourbonrose.

Die Stammform dieser Gruppe wurde im Jahre 1817 von Bréon auf der Insel Bourbon unter einer Anzahl Sämlinge verschiedener Sorten entdeckt. Seitdem sind von ihr eine große Anzahl Varietäten und Hybriden gezogen worden. Obgleich ihre Abkunft in ein ziemliches Dunkel gehüllt, so läßt sich doch mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß sie eine Hybride von der Rosa chinensis, (Monatsrose), und der Rosa damascena omnium calendarum, (Vierjahreszeitenrose) ist. Der Habitus ist im Allgemeinen kräftig; die Zweige sind kurz und dicker als bei der Thee- und Bengalrose

und endigen je nach ihrem kräftigeren oder schwächeren Wuchse entweder in einer größeren oder geringeren Anzahl von büschel- oder doldenförmig gestellten Blumen. Die Rinde ist sehr glatt; die Stacheln sind kurz, stark, an der Basis breit und an der Spitze gekrümmt. Die Fiederblättchen sind dunkelgrün, glänzend, oval, abgerundet, gezähnt, und stehen zu 3, 5 und 7 am Blattstiel. Der Fruchtknoten ist rund, oft kurz und angeschwollen. — Die Bourbonrosen lieben einen lockeren, nahrhaften Boden und verlangen mit Ausnahme der kräftig wachsenden Sorten ziemlich kurzen Schnitt. Im Winter erfordern sie hinlänglichen Schutz.

Die Rosen dieser Gruppe sind wegen ihrer schön gebauten vollen Blumen, ihrer verschiedenen Farbenpracht, welche alle Nüancen vom zartesten Weiß bis zum dunkelsten Kolorit durchläuft, ihres reichlichen durch den ganzen Sommer bis zum Spätherbste fast ununterbrochenem Flors, der frischen und dunkelgrünen, meist glänzenden Belaubung und dadurch, daß sie sich, je nachdem die Sorten schwach oder starkwüchsig, wurzelächt oder nieder- oder hochstämmig gezogen sind, fast zu jeder beliebigen Form verwenden lassen und auch für die Topfkultur von großem Werthe sind, gleichwie die der Remontanten zu den beliebtesten der Neuzeit geworden.

Acidalie, Blumen groß, voll, reinweiß, im Centrum blaßrosa, kugelförmig, sehr angenehm duftend; Wuchs kräftig. Eignet sich zu höheren Gruppen, sowie zum späteren Treiben.

Amélie de la Chapelle, Blumen groß, voll und von schöner Form, sehr zart fleischfarbig rosa, sehr blühbar und wohlriechend.

Apolline, Blumen groß, voll, zart rosa, stark nüancirt, außerordentlich reichblühend.

Baron Gonella, Blumen groß, voll, schön gebaut, lachsrosa; Wuchs kräftig. Eignet sich zur Pyramiden- und Säulenform und bei kurzem Schnitt zu niedrigen Gruppen.

Baronne de Noirmont, Blumen groß, voll, lebhaft karminrosa, reichblühend, die Blumenblätter fast rechtwinkelig zurückgeschlagen. Veredelt von kräftigem Wuchse.

Bernadotte, Blumen mittelgroß, gefüllt, leuchtend karminroth.

Blanche Lafite, Blumen mittelgroß, voll, weißfleischfarben, in großen Dolden blühend.

Catherine Guillot, Blumen groß, voll, purpurrosa, von vorzüglichem Bau und Wohlgeruch; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, bei kurzem Schnitt zu niedrigen Gruppen, desgleichen für die Topfkultur und zum Treiben.

Céline Gonod, (Modèle de perfection), Blumen mittelgroß, voll, durchſichtig roſa, von ſehr ſchöner Form.

Comices de Tarn-et-Garonne, Blumen mittelgroß, voll, leuchtend karmoiſin.

Comtesse de Barbantane, Blumen fleiſchfarbenweiß, von elegan-ter Schalenform.

De Candolle, Blumen purpurviolett, ſehr groß, voll und von ſchö-nem, gewölbtem Bau; eine Muſterroſe in jedem Betracht.

Docteur Leprêtre, Blumen groß, voll, leuchtend roth; Wuchs kräftig. Sie iſt nicht ſo empfindlich wie die meiſten anderen Bourbonroſen, daher beſonders zu empfehlen.

Duc de Crillon, Blumen groß, voll, feurig karmin, in lebhaft Roſa übergehend.

Duchesse de Thuringe, Blumen mittelgroß, voll, atlasweiß, zartlila überhaucht, von ſchönem, rundem Bau, in reichen Dolden ſitzend. Als Stammroſe beſonders ſchön; auch zur Topfkultur geeignet.

Dupetit Thouars, Blumen groß, voll, brillant karmoiſin; ſehr reichblühend und von herrlichem Effekt; Wuchs kräftig.

Édith de Murat, Blumen mittelgroß, voll, weiß, roſa angehaucht, in Büſcheln ſtehend.

Édouard Desfossés, Blumen groß, gefüllt, prächtig roſa, von vollkommener Form.

Élise Lemaire, Blumen mittelgroß, von Centifolienbau, zartroſa; bis in den Spätherbſt außerordentlich dankbar blühend; eignet ſich ſehr gut zur Bepflanzung von Gruppen und zur Topfkultur.

Émotion, Blumen mittelgroß, voll, zartroſa; ähnlich der Souvenir de Malmaison; obgleich dieſer an Schönheit nicht ganz gleichkommend, ſo iſt ſie doch als vollkommen kulturwürdig zu empfehlen.

Guilletta, Blumen groß, gefüllt, fleiſchfarbenweiß, flach und regel-mäßig gebaut; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Hermosa, Blumen mittelgroß, voll, zartroſa, ſehr ſchön gebaut; ſehr reichblühend; Wuchs kräftig. Eignet ſich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, ſowie zur Topfkultur; auf Hochſtamm veredelt iſt ſie ebenfalls von beſonderer Schönheit.

Joseph Gourdon, Blumen groß, gefüllt, inkarnatroth, ſchön kugel-förmig; bis in den Spätherbſt außerordentlich reichblühend.

Jules César, Blumen groß, ſehr voll und ſchön gebaut, ſchön dun-kelkirſchroſa, in Büſcheln ſtehend; ſehr ſchön.

Julie de Fontenelle, Blumen mittelgroß, voll, dunkelpurpurviolett, schalenförmig, wie Veilchen duftend; Wuchs mäßig. Vorzugsweise zur Topfkultur geeignet.

Jupiter, Blumen mittelgroß, voll, dunkelschieferfarben, sehr reichblühend.

Lady Emilie Peel, Blumen mittelgroß, voll, schön gebaut, röthlich umsäumt, sehr reichblühend.

La Quintinie, Blumen mittelgroß, voll, dunkelpurpur, von schönem, gewölbtem Bau; Wuchs mäßig.

La reine de l'île Bourbon, Blumen mittelgroß, gefüllt, weiß, fleischfarben mit Zartrosa überhaucht, von schönem, gewölbtem Bau; eine werthvolle, reichblühende Rose.

Le florifère, Blumen mittelgroß und gut gebaut, lebhaft karminrosa, sehr schön, in seidenartiges Rosa übergehend; sehr reichblühend.

Le Roitelet, Blumen klein gefüllt, schön geformt, seidenartig-rosa.

Lewison Gower, (Souvenir de Malmaison rouge), Blumen sehr groß, voll, salmrosa, schalenförmig; pflegen sich beim ersten Flor meistens nicht gut zu öffnen, sind dann aber beim zweiten Flor um so schöner. Zur Topfkultur besonders zu empfehlen.

Louise Margottin, Blumen groß, gefüllt, zart seidenrosa in Weißlich übergehend; ist ein Abkömmling der nächstfolgenden, steht aber noch über dieser, da sie besser gefüllt ist und ihr Kolorit im Verblühen einen prächtigen Silberglanz gewinnt. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Louise Odier, Blumen groß, voll, leuchtend rosa, von schönem Centifolienbau. Zur Pyramiden- und Säulenform, bei kurzem Schnitt zu niedrigen Gruppen, sowie auch zur Topfkultur und zum Treiben geeignet; auf Hochstamm veredelt ebenfalls von besonderer Schönheit.

Madame Angelina, Blumen eigenthümlich chamoisgelb. Eine schöne Rose, aber etwas empfindlich, eignet sich daher besser zur Topfkultur.

Madame Charles Baltet, Blumen voll und von schönem Dachziegelbau, sehr schön zartrosa.

Madame Compatier, Blumen groß, schön gebaut, rosa, in großen Bouquets stehend.

Madame Cornelissen, Blumen atlasweiß mit inkarnatrosa Anflug und röthlichgelbem Herz. Bis auf die abweichende Färbung gleicht diese Prachtrose nicht nur in Bezug auf Größe, Bau und Füllung, sondern auch in ihrem übrigen Habitus der Souvenir de Malmaison.

Madame Forcade la Roquette, Blumen groß, voll, von ſchönem Bau, johannisbeerenroth.

Madame Just Detrey, Blumen groß, voll, breit, in Büſcheln ſtehend, ſchöne Form und gute Haltung, leuchtend ſammetig-karminroth.

Madame Luiset, Blumen groß, gefüllt, leuchtend roſa, mit Karminroth und Lachsfarbe gemiſcht. Von Louise Odier abſtammend.

Mademoiselle Aline Pierron, Blumen mittelgroß, voll, gelblich weiß.

Mademoiselle Emain, Blumen groß, gefüllt, weiß, im Centrum hellroſa.

Mademoiselle Favart, Blumen mittelgroß, voll, ſehr hell ſeidenartig glacirtes Roſa; ſehr blühbar.

Mademoiselle Félicité Truillot, Blumen mittelgroß, gefüllt, ſchön leuchtend roſa.

Mademoiselle Jenny Gay, Blumen weißfleiſchfarben mit roſa Wiederſchein, von dichter Füllung und von vollendet ſchönem Bau.

Mademoiselle Marie Larpin, Blumen mittelgroß, dachziegelig geformt, von ausgezeichnetem Roſakolorit. Von Louise Odier abſtammend.

Marie Joly, Blumen mittelgroß, voll, zart fleiſchfarbenroſa.

Marguerite Bonnet, Blumen weißfleiſchfarben, groß, voll und von ſchönem Dachziegelbau; ſehr ſchätzbar.

Mistress Bosanquet, (Pauline Bonaparte), Blumen weiß, im Centrum zart fleiſchfarben, groß, voll, ſchalenförmig, ſehr wohlriechend; ununterbrochen blühend; Wuchs kräftig. Eignet ſich zur Bepflanzung von Gruppen, zur Stammroſe und zur Topfkultur, ſowie zum Treiben.

Oeillet flambant, Blumen mittelgroß, gefüllt, flach gebaut, lebhaft roſa, durch weiße Striche und Streifen gehoben.

Omer Pacha, Blumen groß, ſcharlachkarmin mit violett; eine ſchöne Roſe.

Paul Joseph, Blumen groß, voll, reich purpurkarmoiſin mit Feurigkarmoiſin ſchattirt, ſchalenförmig; Wuchs mäßig; wächſt am beſten wurzelächt gezogen oder niederſtämmig veredelt.

Paxton, Blumen mittelgroß, voll, lebhaft roſa, mit Feuerroth ſchattirt. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Petite Amante, Blumen mittelgroß, ſehr gefüllt, Peripherie imbriquirt, die mittleren Blumenblätter eine Roſette bildend, friſches durch karminrothe Reflexe gehobenes Roſa.

Prince Chimay, Blumen amarantroth mit Violett, voll und rund gebaut; sehr schöne und reichblühende Rose.

Prince impérial, Blumen mittelgroß, voll, weißlichrosa, von schöner Becherform; kräftig wachsend und reichblühend.

Prince Napoléon, Blumen groß, fast gefüllt, leuchtend karminrosa; sehr reichblühend; von großem Effekt.

Reine de Castille, Blumen groß, voll, schön gebaut, virginalrosa, sehr blühbar.

Reine des vierges, Blumen groß, voll, blaßrosa mit fleischfarbenem Centrum. Eignet sich zum Treiben.

Reine Victoria (Schwartz), 1873, Blumen mittelgroß oder groß, vollkommene Form, leuchtend rosa; extra.

Réveil, Blumen groß, voll, kirschroth mit sammetig Dunkelviolett schattirt, von sehr vollkommenem Centifolienbau.

Révérend H. Dombrain, Blumen groß, gefüllt, schön schalenförmig, sehr glänzend karminroth, oft dunkler nüancirt, oft mit hellen Rändern; Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Souvenir d'Adèle Launay (Moreau), 1873, Blumen groß, gut gefüllt und schön gebaut, prächtig hochrosa; extra.

Souvenir de l'exposition de Londres, Blumen mittelgroß, reichsammetig hochroth.

Souvenir de Louis Gaudin, Blumen purpurroth mit Schwarz schattirt, sehr voll, schön gebaut und reichblühend.

Souvenir de Madame Charlet, Blumen mittelgroß, voll und gut gebaut, mit geröhrten Blumenblättern, zartlachsfarbig-rosa, in Büscheln blühend.

Souvenir de Malmaison, Blumen sehr groß und sehr voll, zart, atlasweiß mit chamoisfleischfarbenem Centrum, Form kompakt; unausgesetzt blühend; Wuchs kräftig. Wurzelächt vorzüglich als Gruppenrose, schön als Hochstamm, sehr gut zur Topfkultur, (besonders fürs Zimmer), und zum späteren Treiben geeignet. Bekannt als eine große und vollendet schöne Bourbonrose und bis jetzt noch von keiner anderen übertroffen.

Souvenir de Nemours, Blumen groß, gefüllt, sehr frisch leuchtendes Rosa, Rückseite der Blumenblätter blaßrosa.

Souvenir de Président Lincoln, Blumen groß, voll und gut gebaut, sammetig-karmoisinroth, schwärzlich schattirt, von auffälligem, effektvollem Kolorit.

Souvenir du baron de Rothschild, Blumen groß, voll, schön karmoisinroth sehr blühbar.

Victor Emanuel, Blumen purpurroth, mittelgroß, voll, von herrlichem Effekt.

Victor de Magenta, Blumen groß, gefüllt, sehr glänzendroth mit Purpur nüancirt, von schöner Form, in Büscheln stehend.

24. Rosa indica Noisettiana Ser. — Rosier de Noisette.

Die Noisetterose.

Strauch kräftig, 1 bis 2,50 Meter hoch; Zweige stark, hellgrün, markig; Stacheln stark gekrümmt, rothbraun, hart, selten gerade, zerstreut stehend; Blätter groß, glänzend, aus 3 bis 9 Blättchen zusammengesetzt, immergrün; Blättchen eirund, gespitzt, oben glänzend, unten mattgraugrün, scharf, doch einfach gezähnt, mit einwärts gebogenem Rande, sonst nackt; Nebenblätter blattständig, bleibend, klein, spitzig, einfach gezähnt, drüsig; Blattstiel mit kaum sichtbaren Borstenhaaren oder Drüsen besetzt, rückwärts oft bis zum Ende des Blattes mit kleinen krummen Stacheln besetzt; Blumenstiel dünn, haarig oder borstenhaarig, selten nackt, zu mehreren beisammen; Kelchröhre klein, länglich-eirund, meist glatt, zuweilen mit kurzen Borstenhaaren schwach besetzt; zwei der Kelchblätter sind getheilt, drei mit kleinen Anhängseln versehen, spitzig, am Rande mit wenig Drüsen besetzt, schon vor dem Aufblühen der Knospen zurückgebogen, abfallend; Blumen zahlreich, klein, mittelgroß, oder, wenn es Bastarde von Theerosen sind, auch groß, locker gebaut, weiß, fleischfarben oder gelb; Blüthenstand in sehr reichen Rispen, meist von 3 bis 20, zuweilen sogar bis 200 Blumen; Pistille gesondert, hervorstehend, haarig oder kahl mit rothen Narben; Frucht klein, nackt, orangeroth, länglich-eirund, ohne Kelchblätter.

Die erste dieser Rosen ist von Philippe Noisette in Nordamerika durch Befruchtung zwischen einer Bengal- und der bei uns sehr selten kultivirten Moschusrose (R. moschata) erzeugt worden und im Jahre 1817 nach Paris gekommen. Durch Hybridation ist von ihnen eine ziemlich reiche Nachkommenschaft erzielt worden, die durch ihren Blüthenreichthum und ihre Widerstandsfähigkeit gegen das Klima sich eine allgemeine Gunst der Rosenliebhaber erworben hat. Die meisten Varietäten und Hybriden dieser Gruppe fangen erst nach dem großen Sommerflor zu blühen an und entwickeln in den meisten Fällen einen außerordentlichen bis in den späten Herbst sich ausdehnenden Blüthenreichthum.

Die Noisetterosen gedeihen in jedem mäßig guten Gartenboden und bei gewöhnlicher Kultur. Diejenigen Sorten aber, welche durch Kreuzung mit der Theerose entstanden sind und auch meistens deren zärtliche Natur angenommen haben, verlangen auch dieselbe Behandlung wie die Theerosen und, wenn sie im Freien kultivirt werden, einen geschützten Standort. Man kann die Noisetten ebensowohl wurzelächt, als auf Wildling veredelt ziehen, in letzterer Beschaffenheit sind viele Sorten sogar reichblühender, als wurzelächt. Die kräftig wachsenden Sorten geben gute Säulen- und Trauerrosen. Das Schneiden der Noisetterosen geschehe sehr mäßig und man beschränke sich nur auf das Ausschneiden schlecht gestellter und überflüssiger Triebe und auf ein ganz mäßiges Einstutzen der bleibenden Zweige.

Aimée Vibert, Blumen mittelgroß, gefüllt, reinweiß; in prachtvollen Doldentrauben bis in den Winter hinein blühend; ist aber nur wirklich reichblühend, wenn sie auf Wildling veredelt ist. Eignet sich zur Bepflanzung von Gruppen, zur Säulenrose und zur Topfkultur. Sie ist ziemlich hart, gedeiht noch in geringem Boden und hat sich an vielen Orten als hart bewährt.

America, Blumen groß, voll und gut gebaut, lachsgelb, im Aufblühen dunkler, später in lebhaft Fleischfarbig-lachsroth übergehend; Wuchs kräftig. Eine Theehybride und daher etwas empfindlicher Natur.

Beauty of Greenmont, Blumen mittelgroß, voll, kirschroth mit Rosa, in reichen Büscheln stehend.

Bouquet d'or (Ducher), 1873, Blumen breit, gefüllt und schön gebaut, dunkelgelb, Centrum leicht kupferig; extra.

Caroline Marniesse, Blumen klein, voll, weißfleischfarben; bis in den Spätherbst in reichen Bouquets blühend. Eignet sich zur Bepflanzung von Gruppen und zur Topfkultur; hochstämmig veredelt besonders schön.

Céline Forestier, Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, reingelb, im Centrum dunkelgelb. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet. Theehybride, verlangt daher guten Winterschutz.

Chromatella, (Cloth of gold), aus der Noisette Lamarque gezogen, Blumen groß, sehr gefüllt, lebhaft gelb, von schönem Kugelbau und sehr wohlriechend, Wuchs kräftig. Muß, um gut zu blühen, an eine sonnige Mauer gepflanzt werden. Auf Centifolie oder auch auf gewöhnlichen Wildling veredelt blüht sie dankbarer, als wurzelächt. Verlangt guten Winterschutz.

Cornélie, Blumen mittelgroß, gefüllt, lebhaft rosa, in reichen Dolden stehend.

Du Luxembourg, Blumen groß, sehr gefüllt, lilarosa, mit hellem Centrum, schalenförmig; Wuchs kräftig. Auch zur Topfkultur geeignet.

Earl of Eldon, (Comte d'Eldon) (Copin), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, kupfrig-orange, sehr wohlriechend.

Eudoxia, Blumen fleischfarbig weiß, mit kupfergelbem Herz, von schön gefülltem, rundem Bau; sehr schön.

Fellenberg, Blumen mittelgroß, gefüllt, lebhaft roth; reichblühend. Vorzügliche Gruppenrose.

Fortun's double yellow, Blumen mittelgroß, beinahe gefüllt, gummiguttgelb mit Incarnatroth, als Trauerrose besonders schön; verlangt guten Winterschutz.

Jean Desprez, (Noisette jaune), Blumen mittelgroß, schön gebaut, rosa mit Kupferfarbe überhaucht, von prächtigem ananasartigem Wohlgeruch. Wächst an 6,60 bis 8 Meter hoch, daher gut zur Bekleidung von Wänden, verlangt aber einen leichten Winterschutz.

Isabelle d'Orléans, Blumen sehr groß, voll, schalenförmig, weiß mit strohgelbem Centrum; ist von der Lamarque nicht zu unterscheiden, aber viel weniger empfindlich, als jene.

Lamarque, Blumen sehr groß, voll, weiß, mit strohgelbem Centrum, schalenförmig; Wuchs kräftig; verlangt eine geschützte sonnige Mauer, an welcher sie ihre vorzüglich schönen Blumen in reichem Maße zu entwickeln pflegt, aber auch guten Winterschutz. Sie eignet sich auch sehr gut zur Bekleidung der Wände und Pfeiler in einem Grünhause oder besonderen Rosenhause, desgleichen zum Treiben.

Lamarque à fleurs jaunes, Blumen breit, sehr gefüllt, dunkelgelb, sehr blühbar.

Le Pactole, Blumen groß, voll, gelblichweiß, mit etwas dunklerem Centrum, schalenförmig. Verlangt guten Winterschutz. Eignet sich vorzugsweise zur Fensterkultur.

Madame Deslongchamps, Blumen weißfleischfarben, mittelgroß, voll und gut gebaut; Wuchs kräftig. Eignet sich gut zur Säulenrose, zur Bekleidung sonniger Mauern und zur Trauerrose.

Madame Schulz, Blumen strohgelb, im Centrum karmin schattirt, mittelgroß, voll, schön gebaut; sehr dankbar blühend. Eignet sich zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur.

Mademoiselle Aristide, Blumen mittelgroß, gefüllt, blaßgelb, Centrum röthlich, von sehr zarter Färbung. Verlangt guten Winterschutz.

Margarita, Blumen mittelgroß, voll, glänzend gelb, Ränder der Blumenblätter leicht weiß-rosa, von kräftigem Wuchse.

Marie Accary (Guillot fils), 1873, Blumen mittelgroß, gut gefüllt und schön gebaut, weiß mit leicht Rosa und Gelb tuschirt; sehr schöne Rose.

Multiflora, Blumen rosa, mittelgroß, und obschon nicht ganz gefüllt, so entwickelt sie doch, auf Hochstamm veredelt, einen wahrhaft prachtvollen Flor.

Ophire, (Ophirie), Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, aprikosenfarben mit Kupferroth schattirt, nach dem Centrum hin feurig goldorangefarben, schalenförmig, sehr wohlriechend, reich- und bis zum Spätherbst blühend; kräftig wachsend. Entwickelt ihre vollkommene Schönheit besser veredelt, als wurzelächt und verlangt guten Winterschutz; auch zur Topfkultur geeignet.

Phaloë, Blumen groß, voll, gelblichweiß, zart karmin überhaucht; reichblühend.

Rêve d'or, Blumen breit, sehr voll, schön geformt, dunkelgelb, bisweilen hellgelb.

Solfatare, aus der Noisette Lamarque entstanden, Blumen sehr groß, voll, gelblichweiß mit dunkelgelbem Centrum, schalenförmig, sehr wohlriechend; Wuchs kräftig; Belaubung schön glänzend grün. Eignet sich gut an eine sonnige Mauer, verlangt aber guten Winterschutz.

Triomphe de Rennes, Blumen prächtig kanariengelb, Centrum leuchtend gelb, voll, schön gebaut. Blüht auf Centifolie oder gewöhnlichen Wildling veredelt dankbarer als wurzelächt. Verlangt guten Winterschutz.

Unique jaune (Moreau), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, rosettförmig, in Büscheln von 15 bis 20 Blumen blühend; rothkupferiggelb, mit zinnoberroth nüancirt; einzig in ihrer Art; stammt von Noisette Ophire; extra.

Vicomtesse d'Avesne, Blumen mittelgroß, gefüllt, rosa, gut gebaut, Wuchs kräftig. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet, desgleichen zur Topfkultur. Ist ziemlich hart.

Zilia Pradel, Blumen groß, voll, rein weiß; dankbar blühend.

25. Rosa indica odoratissima Hort. — Rosa fragrans Red. — Rose tea Hort. — Rose thé.

Die Theerose.

Strauch niedrig, nur 0,30 bis 1 Meter hoch, Zweige gerade, markig, nicht sehr zahlreich; in der Jugend hellgrün, glänzend, mit wenig Stacheln besetzt; Stacheln zerstreut stehend, groß, braunroth, hakenförmig; Blätter groß, lebhaft grün, in der Jugend bei den meisten Sorten roth, glänzend, aus 3 bis 5, seltener 7 Blättchen bestehend; Blättchen groß, das Endblättchen beträchtlich größer, eirund, länglich gespitzt, oben hellgrün und glänzend, unten matt und zuweilen meer- oder graugrün, dick, lederartig, feingezähnt, ohne Drüsen und Behaarung, bleibend; Nebenblätter blattständig, bleibend, klein, pfriemenförmig, mit Drüsen und Haaren besetzt; Blattstiel auf der Unterseite mit einigen kleinen braunrothen gekrümmten Stacheln und Drüsenborsten versehen; Blumenstiel dick, doch dabei meist gebogen, gewöhnlich mit Gelenken oder Knoten, nackt, oft mit Drüsenborsten bekleidet; Kelchröhre bauchig, an der Basis kugelig, glatt, graugrün; Kelchblätter lang, schmal, scharf gespitzt, einfach oder mit kleinen Anhängseln an der Basis, gewöhnlich nackt, mit drüsigen oder wolligen Spitzen, zurückgebogen, abfallend; Blumen groß, gefüllt, in blaßroth, weiß, gelb, angenehm und stark nach Thee duftend, zur Erde gebogen; Blumenstand einzeln; Pistille gesondert; Frucht rund, glatt, ohne Kelchzipfel, orangeroth.

Die Theerose wurde ebenfalls zu Anfang dieses Jahrhunderts aus China in Europa eingeführt und bildet gegenwärtig eine sehr zahlreiche und wenigstens für die Topfkultur sehr bevorzugte Gruppe. Sie zeichnet sich nicht nur dadurch vor vielen anderen Rosen aus, daß sie bei geeigneter Behandlung fast das ganze Jahr hindurch blüht, sondern besonders auch durch ihren köstlichen Theegeruch, welchen die meisten ihrer Varietäten aushauchen.

Ihre Kultur verlangt einige Aufmerksamkeit, zumal wenn sie im Freien gepflegt werden, wo sie eines lockern, nahrhaften, nicht zu feuchten Bodens in warmer, geschützter Lage, und eines hinlänglichen Schutzes gegen Frost bedürfen. Bei wurzelächten Pflanzen schadet es wenig, wenn auch die Stengel vom Frost leiden; man schneidet sie dann ganz hinweg, worauf der Wurzelstock bald kräftige Schossen austreibt, die später mit zahlreichen Blumen bedeckt sind. Auf Hundsrose, (R. canina), veredelt, entwickelt die Theerose meistens ihre Blumen besser, auch werden sie größer. Die Pflanzen

werden dadurch auch weniger wähleriſch im Boden, dem man ſie anvertraut. Für die Topfkultur eignet ſich wegen ihres feinen Wurzelvermögens beſſer die Centifolie und die Bourſault-Alpenroſe (R. alpina Boursaulti) als Unterlage. Manche ſtarkgefüllte Sorten blühen bei naſſem und kühlen Wetter entweder gar nicht oder doch nur unvollkommen auf; daher thut man wohl, ſolche im Topfe zu ziehen und während der Blüthezeit unter Glas zu ſtellen. Die wurzelächten Theeroſen verlangen einen kurzen Schnitt, die veredelten, beſonders wenn ſie ſtarkwüchſig ſind, wollen nur mäßig geſchnitten ſein. Ueberhaupt unterlaſſe man zu keiner Zeit, die abgeblühten Blumenſtengel bis zu dem nächſten kräftigſten Auge wegzuſchneiden.

A. Bouquet (Liabaud), 1873, Blumen breit und groß, gefüllt, in Büſcheln blühend, weiß mit Zinnoberroth geſtreift; extra.

Adam, Blumen ſehr groß und voll, lebendig lachsfarbigroſa, kugelförmig, von ausgezeichnetem Wohlgeruch; Wuchs kräftig. Eignet ſich gleich gut für die Topfkultur, wie fürs freie Land.

Adrienne Christophle, Blumen groß, voll, kupferaprikoſengelb, roſa nüancirt, bisweilen dunkelgelb; Wuchs kräftig.

Alba plena, Blumen mittelgroß, voll, rein weiß.

Amabilis, Blumen, groß, voll, fleiſchfarben. Sehr dankbar blühend und wenig empfindlich, daher fürs freie Land geeignet.

Amazone (Pucher), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, gut gebaut, dunkelgelb, Rückſeite der Blumenblätter roſa geadert; ſehr ſchön.

Anette Seaut, Blumen, groß, voll, ſchön geformt, dunkelorangengelb, in Weißlichgelb übergehend.

Anna Ollivier (Ducher), 1873, Blumen breit, gut gebaut, fleiſchfarbig roſa, Rückſeite der Blumenblätter roſa nüancirt; ſehr blühbar.

Anthérose, Blumen groß, ſtark gefüllt, gelblich fleiſchfarben, im Centrum weiß.

Archimède, Blumen ſehr groß, voll, roſa mit Chamois ſchattirt, mit dunklerem Centrum, kugelförmig; die Blumen freitragend und dankbar blühend.

Auguste Vacher, Blumen mittelgroß, gefüllt, gelb mit Kupferroth nüancirt und goldnem Widerſchein, von ſchönem Bau; ſehr reichblühend; kräftig wachſend. Vorzüglich zur Topfkultur geeignet.

Belle cuivrée, Blumen groß, voll, ſehr leuchtend kupfriggelb.

Belle fleur d'Anjou (Touvais), 1873, Blumen ſehr groß, gut gefüllt und von ſchönem Bau, Centrum ſehr friſch leuchtend roſa; äußere Blumenblätter breit, ſeidenartig weiß glacirt.

Belle Mâconnaise (Ducher) 1872, Blumen breit, gefüllt, schöne Form, blaßrosa; Wuchs kräftig.

Belle Lyonnaise, Blumen groß, voll und schön gebaut, dunkelkanariengelb, lachsfarben schattirt.

Belle Marie, Blumen rosa, hellschattirt, gut gebaut.

Bougère, Blumen groß, voll, hortensienrosa, schalenförmig; Wuchs kräftig. Eignet sich besonders zur Topfkultur und zum Treiben.

Bouton d'or, Blumen sehr schön leuchtend dunkelgelb, aber etwas mangelhaft an Füllung; Rückseite der Blumenblätter weiß.

Canari, Blumen mittelgroß, nicht ganz gefüllt, aber sehr reichblühend.

Clotilde, Blumen groß, voll, hortensienrosa, mit Rosa-weiß, Centrum violett, rosa und roth, gute Form; sehr variirend.

Comte de Paris, Blumen groß, voll, zartrosa, von der edelsten Schalenform. Auch zum Treiben geeignet.

Comtesse de Brossard, Blumen mittelgroß, gefüllt, kanariengelb, sehr blühbar.

Comtesse de Labarthe, Blumen groß, voll, rosa mit gelblichem Schein.

Comtesse de Nadaillac (Guillot fils), 1872, Blumen groß, gefüllt, kugelförmig, sehr leuchtend prächtig fleischfarbigrosa, Grundfarbe kupferig-aprikosengelb, sehr blühbar und effektvoll.

Comtesse de Ouwaroff, Blumen groß, gefüllt, schön leuchtend rosa.

Comtesse de Woronzow, Blumen sehr groß, voll, chamois mit Rosa; Wuchs kräftig.

Coquette de Lyon (Ducher), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, gut gebaut, zeisiggelb; sehr schön; Wuchs kräftig.

David Pradel, Blumen groß, voll, hellrosa mit Purpur schattirt, gut gebaut.

Devoniensis, Blumen sehr groß, stark gefüllt, die innersten Blumenblätter regelmäßig kleiner, etwas gewunden und gekraust, was dem ganzen Bau einen eigenthümlichen Reiz verleiht, weiß, nach der Mitte gelblich, ganz innen fleischfarben und rosa-röthlich, vom köstlichsten Wohlgeruche. Eignet sich zur Bepflanzung von Gruppen, zur Topfkultur und zum Treiben.

Duc de Magenta, Blumen groß, voll, rosa mit Lachsgelb und Fleischfarbe.

Élise Sauvage, Blumen groß, voll, gelblich mit orangeröthlichem Centrum, kugelförmig. Eignet sich vorzüglich zur Topfkultur.

Enfant de Lyon (Narcisse), Blumen groß, voll; reichblühend; gelb in Strohgelb übergehend.

Eugénie Desgâches, Blumen groß, voll, rosa, schalenförmig; Wuchs kräftig. Eignet sich gut zum Treiben.

Frères Soupert et Notting (Levet), 1873, Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, gelb mit Karmin bordirt und lilacirten Reflexen, neue Färbung, stammt von Madame Falcot.

Gloire de Dijon, Blumen sehr groß, sehr gefüllt, lachsfarbengelb, im Verblühen mit Karmin gerandet, von der Form der Souvenir de Malmaison. Ihr unaufhörliches Blühen — bei geeigneten Vorkehrungen bis in den Winter hinein —, ihr gesundes, üppiges Blattwerk, ihr köstlicher, sich weitverbreitender Theegeruch erheben sie zu einer Rose ersten Ranges. Sie blüht eben so reich wurzelächt als veredelt, im freien Lande als im Topf; läßt sich auch gut zum späteren Treiben verwenden. Verlangt nur mäßigen Winterschutz.

Henry Bernet (Levet), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt und gut gebaut, hellrosa, Centrum dunkelschwefelgelb, sehr blühbar und wohlriechend. Stammt von Noisette Ophire.

Homère, Blumen mittelgroß, gefüllt, rosa mit lachsgelblichem Herz; Wuchs mäßig. Eignet sich gut zur Topfkultur, sowie zur Bepflanzung von Gruppen.

Hortensia (Ducher), 1872, Blumen breit, gefüllt, gut gebaut, rosa mit gelblichen Reflexen; von kräftigem Wuchse mit kurzen, dicken Zweigen.

Hyménée, Blumen groß, sehr gefüllt, gelblich weiß, mitunter zart mit Roth überhaucht. Blüht bei angemessener Kultur den ganzen Winter hindurch.

Isabelle Gray, Blumen tief goldgelb, sehr voll und schön gebaut. Blüht wurzelächt sehr spärlich, dagegen auf Centifolie oder Wildling veredelt, ist sie ziemlich reichblühend; die Blumen öffnen sich aber meistens etwas schwer.

Jaune d'or, Blumen mittelgroß, gefüllt, sehr schön goldgelb.

Jean Pernet, Blumen sehr groß, voll, leuchtend gelb.

La boule d'or, Blumen sehr groß, voll, goldgelb, Ränder der Blumenblätter grünlich weiß.

Lady Milton, Blumen mittelgroß, voll, weißlich, rosa angehaucht.

Lady Warander, Blumen mittelgroß, voll, rein weiß.

La tulipe, Blumen groß, voll, weiß, rosa tuschirt, bisweilen lila, von schöner Form und kräftigem Wuchse.

Laurette, Blumen groß, gefüllt, lachsgelb.

Le florifère (Ducher), 1872, Blumen mittelgroß, gefüllt, gut gebaut, weiß mit leicht Lachsfarbe; von kräftigem Wuchse mit starken Zweigen.

Le Mont Blanc, Blumen sehr breit, voll, schön geformt, weißlich gelb.

Léontine de Laporte, Blumen groß, voll, chamoisgelb; dankbar blühend.

Le Président, Blumen groß, voll, zartrosa, schön gebaut.

Lucrèce, Blumen groß und voll, chamoisrosa schattirt mit Dunkelrosa, groß und voll.

Madame Azélie Imbert (Levet), 1872, Blumen groß, gefüllt, gut gebaut, lachsgelb; sehr schön; stammt von Madame Falcot.

Madame Barillet-Deschamps, Blumen groß, gefüllt, weiß, mit gelbem Schein, von prächtigem Bau.

Madame Bérard (Levet), 1872, Blumen groß, sehr gefüllt, schön gebaut und gute Haltung, in Rispen blühend, hellrosa, sehr schön.

Madame Bravy, (alba rosea), Blumen mittelgroß, voll, gelblich weiß, schalenförmig; sehr reichblühend.

Madame Brémont, Blumen groß und gut gebaut, roth in Dunkelpurpur übergehend.

Madame Camille (Guillot fils), 1872, Blumen groß, gefüllt, becherförmig, zart aurora-rosa, geadert mit weißlichen Reflexen, effektvoll; sehr reichblühend und von kräftigem Wuchse.

Madame Céline Noirey, Blumen groß, voll, zartrosa, Kehrseiten der Blumenblätter purpurroth.

Madame Charlet, Blumen groß, gefüllt, flach gebaut, gelb, in der Mitte lachsfarbig; reichblühend; Wuchs kräftig.

Madame Chaveret (Levet), 1873, Blumen groß, gefüllt, aprikosengelb mit leicht Lachsfarben, etwas in Weißlichrosa übergehend, sehr wohlriechend und blühbar; extra.

Madame Damaizin, Blumen groß, voll, fleischfarbig mit Lachsgelb, sehr reichblühend; der Homère sehr ähnlich.

Madame Daru, Blumen fleischfarbigrosa mit Chamois, groß, gut gefüllt und stark duftend; reichblühend; Wuchs kräftig. Eignet sich gut fürs freie Land.

Madame Denis (Gonod), 1873, Blumen, groß, gefüllt, von schönem Bau, weiß, in Centrum leicht schwefelgelb; sehr blühbar.

Madame de Norbonne (Pradel), 1873, Blumen groß, gefüllt, ledergelb, sehr blühbar.

Madame Docteur Jutte (Levet), 1873, Blumen groß, voll, von schönem Bau, granatgelb, (neue Färbung), sehr wohlriechend; extra. Stammt von Noisette Ophire.

Madame de Reynies, Blumen groß, voll, reinweiß.

Madame de Vatry, Blumen groß, voll, dunkelrosa, von angenehmem Theegeruch; dankbar blühend.

Madame Émile Dupuy (Levet), 1872, Blumen gefüllt, gut gebaut, centifolienförmig, gelb mit leicht Lachsfarbe; sehr schön.

Madame Falcot, Blumen groß, gut gefüllt, nankingelb, sehr wohlriechend.

Madame François Janin (Levet), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, gut gebaut, schön dunkelorangegelb, Centrum zuweilen kupferig, sehr wohlriechend und blühbar; extra. Stammt von Vicomtesse Decazes.

Madame Gaillard (Ducher), 1872, Blumen breit, gefüllt, gut gebaut, lachsgelb, sehr schön; Wuchs kräftig.

Madame Hippolyte Jamin, Blumen groß, voll, schön geformt, Umfangsblumenblätter breit und reinweiß, die im Centrum kupferig gelb, sehr zartrosa berandet.

Madame Levet, Blumen groß, sehr gefüllt, schön geformt gelb, lachsgelb nüancirt.

Madame Margottin, Blumen groß, dicht gefüllt, fast kugelig, von vorzüglicher Haltung, dunkelcitronengelb; Wuchs kräftig.

Madame Maurin, Blumen mittelgroß, voll, weiß, lachsfarben schattirt.

Madame Mélanie Willermotz, Blumen groß, sehr voll, schön gebaut, hellgelb mit röthlichem Anflug; Wuchs kräftig; schön belaubt. Eignet sich besonders zur Topfkultur.

Madame Pauline Labonté, Blumen groß, gefüllt, rosa mit Lachsfarben nüancirt; Wuchs kräftig. Auf Hochstamm veredelt von besonderer Schönheit. Hält unter einer bloßen Erddecke im Winter gut aus.

Madame Trifle, Blumen groß, voll, schön gebaut, schön gelb, beim Oeffnen lachsfarben.

Mademoiselle Cécile Berthod (Guillot fils), 1872, Blumen groß, sehr gefüllt, becherförmig, sehr glänzend schwefelgelb, Kehrseiten der Petalen heller; sehr blühbar und von kräftigem Wuchse; prächtig.

Mademoiselle Polonie Bourdin, Blumen mittelgroß, voll, lachsgelb, sehr schön.

Marceline Rosa (Ducher), 1873, Blumen groß, gefüllt, weiß auf gelbem Grunde; ſehr ſchön.

Maréchal Bugeaud, Blumen groß, ſehr voll, glänzend roſa, ſchalenförmig. Zum Treiben geeignet.

Maréchal Niel, Blumen ungewöhnlich groß, von vollendet ſchönem, rundem Bau und außerordentlich ſtarkem Wohlgeruche, prächtig dunkelgelb; von ſehr kräftigem Wuchſe. Eine ausgezeichnete Roſe, welche an Schönheit alle bis jetzt bekannten Theeroſen übertrifft. Bei kühlem naſſen Wetter öffnen ſich die Blumen nicht gut.

Marie Arnaud (Levet), 1873, Blumen groß, gut gefüllt und ſchön gebaut, prächtig kanariengelb, in leicht Weiß übergehend, ſehr wohlriechend und von großem Effekt; extra.

Marie Ducher, Blumen ſehr groß, voll, ſehr ſchön hellroſa.

Marie Sisley, Blumen groß, voll, kugelförmig, gelblich weiß, Blumenblätter roſa berandet.

Monsieur Furtado, Blumen gefüllt, von guter Form, hellſchwefelgelb, in Büſcheln ſtehend; Wuchs kräftig.

Mon plaisir, Blumen ſehr groß, voll, dunkel-lachsgelb.

Mont Rosa (Ducher), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, lachsaurora, Kehrſeite der Blumenblätter nüancirt-roſa; ſehr ſchöne Färbung.

Niphetos, Blumen ſehr groß, gefüllt, weiß mit blaßorangefarbenem Centrum, kugelförmig; Wuchs kräftig. Zum Treiben geeignet.

Perle de Lyon (Ducher), 1873, Blumen groß, ſtark gefüllt und ſchön gebaut; dunkelgelb, zuweilen aprikoſengelb; extra.

Princesse Adélaïde, Blumen groß, voll, ſtrohgelb, am Rande bläſſer, von ſchönſter Schalenform und vorzüglichem Wohlgeruche. Hält unter einer bloßen Erddecke im Winter gut aus.

Régulus, Blumen groß, gefüllt, leuchtend kupferig-roſa, Centrum dunkler.

Reine de Portugal, Blumen groß, ſehr gefüllt, ſchön gebaut und von guter Haltung, prächtig goldgelb, ſehr leuchtend, bisweilen kupferiggelb mit Roſa nüancirt.

Rubens, Blumen mittelgroß, gefüllt, weiß mit aurorafarbigem Centrum.

Safrano, Blumen groß, leicht gefüllt, ſafrangelb, ins Aprikoſenfarbene übergehend, ſehr wohlriechend; reichblühend; Wuchs kräftig; Belaubung ſchön röthlich. Eignet ſich zur Bepflanzung von Gruppen, ſowie zur Topfkultur und zum Treiben.

Safrano à fleurs rouges, Blumen mittelgroß, beinahe gefüllt, leuchtend roth, kupferiggelb nüancirt.

Smith's yellow, Blumen groß, gefüllt, schön kugelförmig gebaut, strohfarben mit eigenthümlich starkem Duft. Blüht im Freien selten gut auf, eignet sich aber sehr gut zur Topfkultur unter Glas, und zum Treiben.

Socrate, Blumen groß, voll, dunkelrosa mit aprikosenfarbigem Centrum.

Sombreuil, Blumen groß, gefüllt, weiß, leicht mit Rosa schattirt, von sehr schönem Bau, in Büscheln stehend; Blüthenstiele stark, so daß sie die Blüthen aufrecht tragen; sehr dankbar blühend. Zur Pyramiden- und Säulenform, sowie zur Topfkultur geeignet. Hält unter einer bloßen Erddecke im Winter gut aus.

Souvenir d'Élise, Blumen groß, gefüllt, weiß, mit gelblichfleischfarbigem Centrum, kugelförmig.

Souvenir de Jenny Pernet, Blumen groß, sehr gut gefüllt, von guter Haltung, weißlichfleischfarben, leicht mit Rosa und Lachsgelb nüancirt; Wuchs kräftig.

Souvenir d'un ami, Blumen groß, voll, lachsfarbig mit Rosa schattirt, schön schalenförmig, sehr wohlriechend, außerordentlich reichblühend. Eignet sich gut zur Topfkultur und zum Treiben.

Sulfureux, Blumen mittelgroß, voll und schön gebaut, schön safrangelb.

Sylphide, Blumen groß, voll, gelblich fleischfarben, sehr wohlriechend und schön.

Triomphe de Bollwiller, Blumen sehr groß, gut gefüllt, hellschwefelgelb; besonders schön und dauerhaft auf Hochstamm veredelt. Hält unter einer bloßen Erddecke gut aus.

Triomphe de Guillot fils, Blumen sehr groß, gefüllt, im Aufblühen weiß, in Gelblichrosa übergehend.

Triomphe de Luxembourg, Blumen sehr groß und voll, fleischfarben mit Aurora überhaucht, sehr wohlriechend; Wuchs kräftig. Eignet sich gut zur Land- und Topfkultur, sowie zum Treiben.

Unique, Blumen groß, weiß, rosa purpur umrandet; neu in Bau und Färbung.

Vallée de Chamonix (Ducher), 1873, Blumen mittelgroß, gefüllt, im Centrum kupferig; Rückseite der Blumenblätter gelblich weiß; sehr schöne Färbung.

Vicomtesse Decazes, Blumen groß, voll, prachtvoll, orangegelb, kupferfarben übertuſcht, ſchalenförmig. Eignet ſich gut zur Topfkultur.

Victor Pulliat (Ducher), 1872, Blumen breit, gefüllt, gut gebaut, weiß mit leicht gelblich, mit kurzen kräftigen Zweigen; ſehr ſchön, ſtammt von Madame Mélanie Willermotz.

Yellow borde rouge, Blumen mittelgroß, voll, gelb mit rothen Streifen.

26. Rosa indica semperflorens Ser. oder R. Bengalensis Pers. — Rose Bengale.

Die immerblühende Roſe; bengaliſche Roſe; Monats-Roſe.

Aeſte ſchlank, aufrecht, grün; Stacheln zerſtreut, ſtark, mehr oder minder gekrümmt, röthlich, breit zuſammengedrückt; Blattſtiele gewimpert, ſtachelig; Blättchen in der Jugend oft purpurroth oder bräunlich-purpurroth, zu 3 bis 5, glatt, eirund, oder elliptiſch-lanzettförmig, einfach geſägt, oben glänzend, immergrün; Blumen häufig riſpenſtändig, mittelgroß, von ſchwachem Wohlgeruche oder geruchlos, in verſchiedenen Nüancen vom Weißlichen bis zum Dunkelpurpurrothen variirend; Fruchtknoten eiförmig, faſt kreiſelförmig, meiſtens glatt.

Die Bengal- oder hochrothe Chineſerroſe ſtammt aus Oſtindien, von wo ſie 1780 nach England kam. Sie iſt gewiß unter allen Roſenarten diejenige, welche ſich in der Spendung der Blüthen am dankbarſten beweiſt. Selbſt ſpät im Jahre, wenn naſſe und kalte Tage ihre Blüthen zurückgehalten haben, erzeugen ſie noch im November einen reichen Flor. Unter ihnen befinden ſich ſehr ſchön blutroth gefärbte, doch alle ſind von äſtigem Habitus und mäßigem Wuchſe. Nur wenige eignen ſich zu Hochſtämmen gut, aber wurzelächt wachſen alle üppig und bilden ſchöne, kräftige, buſchige Pflanzen, zumal wenn ſie in einem kräftigen, lockeren Boden ſtehen und kurz geſchnitten werden, wo ſie dann — beſonders in Gruppen auf Raſenplätzen gepflanzt —, eine Hauptzierde eines Gartens ſind. Hinſichtlich der Kultur im freien Lande gilt im Allgemeinen daſſelbe, was bei den Theeroſen geſagt worden iſt. Sie lieben eine fette lockere Erde, nicht zu feuchten, freien, ziemlich ſonnigen Standort, im Winter hinlänglichen Schutz gegen Kälte, und müſſen alljährlich kurz geſchnitten werden, worauf ſie dann die üppigſten Triebe entwickeln, welche die ſchönſten und größten Blüthen erzeugen. Die abgeblühten Aeſte ſind auch immer ſogleich etwas zurückzuſchneiden, worauf ſich ſofort wieder neue Blüthentriebe entwickeln.

Abbé Mioland, Blumen groß, gefüllt, purpurroth, kugelförmig. Eignet sich vorzüglich zur Topfkultur.

A cinq couleurs, Blumen mittelgroß, voll, fünffarbig.

Aetna, Blumen mittelgroß, voll, dunkelroth.

Anemoniflora, Blumen mittelgroß, leicht gefüllt, dunkelroth.

Archiduc Charles, Blumen sehr groß, voll, von Rosa zu Karmoisin übergehend. Eine vorzüglich schöne Rose.

Camélia panachée, Blumen mittelgroß, dunkelroth mit weißen Streifen, aufrechtstehend.

Cels multiflora, Blumen mittelgroß, voll, rosa.

Centifolia, dunkler, größer und gefüllter als die gewöhnliche semperflorens pallida. Vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen.

Citoyen de Deux Mondes, Blumen mittelgroß, gefüllt, schwärzlich purpurkarmoisin, von schönem, flachem Schalenbau.

Comble de gloire, Blumen groß, voll, hellviolett mit Rosa überhaucht. Zur Bepflanzung von Gruppen geeignet.

Couronne des pourpres, Blumen mittelgroß, voll, purpurroth.

Cramoisi supérieur, Blumen mittelgroß, sehr gefüllt, sammetartigkarmoisin, schalenförmig. Vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, zur Topfkultur und zum Treiben geeignet.

Ducher, Blumen mittelgroß, voll, rein weiß, von kräftigem Wuchse.

Élise Flory, Blumen groß, voll, rosa, heller gerandet; von kräftigem Wuchse. Eignet sich gut zur Topfkultur. Auch sehr schön auf Hochstamm veredelt.

Eremit, Blumen groß, sehr voll, dunkelroth.

Eugène de Beauharnais, Blumen mittelgroß, voll, purpurroth.

Eugénie Hardy, Blumen mittelgroß, reich gefüllt, sehr schön gebaut, weiß mit Fleischfarbe zart überhaucht. Auf Hochstamm veredelt von besonderer Schönheit.

Fabvier, Blumen mittelgroß, halbgefüllt, dunkelscharlach-karmoisinroth, von flachem Bau. Eine der vorzüglichsten Rosen zur Bepflanzung von Gruppen, macht sich auch sehr schön auf Hochstamm veredelt; blüht ununterbrochen vom Juni bis in den Spätherbst und bei geeigneter Behandlung den ganzen Winter hindurch.

Gloire de Rosomène, Blumen groß, fast einfach, feurig scharlachroth; von großem Effekt; sehr reichblühend; besonders auch zum Treiben zu empfehlen; von sehr kräftigem Wuchse.

Jacques Plantier, Blumen mittelgroß, voll, hellkarmoisinröthlich.

Impératrice Eugénie, Blumen groß, voll, lilarosa, silberglänzend.

La Fraîcheur, Blumen zartfleischfarben, sehr dicht gefüllt, mittelgroß, kugelförmig, wohlriechend, in reichen Büscheln stehend. Eignet sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen.

Louis-Philippe, Blumen mittelgroß, dunkelpurpur.

Lucullus, Blumen mittelgroß, sehr dicht gefüllt, dunkelpurpur, fast in Schwarz übergehend. Eine der schönsten Bengalrosen und ungemein dankbar blühend, wächst aber etwas spärlich. Eignet sich zur Bepflanzung von Gruppen und zur Topfkultur.

Madame Bréon, Blumen meistens sehr groß, voll, schön rosa, oft lachsfarbig überhaucht. Vorzüglich zur Fensterkultur und zum Treiben.

Marjolaine du Luxembourg, Blumen sehr groß, stark gefüllt, schalenförmig, karminrosa, in Dunkelkarmoisin übergehend; hat ein sehr reiches Laubwerk und ist auf Wildling veredelt von besonderer Schönheit. Eignet sich auch sehr gut zur Topfkultur.

Pallida, Blumen mittelgroß, halbgefüllt, rosa. Ist wegen ihres unausgesetzten Flores wohl die verbreitetste Gruppenrose.

Prince Eugène, Blumen mittelgroß, stark gefüllt, purpurkarmoisin, von schönem Bau. Zur Topfkultur geeignet.

Triomphante, Blumen groß, sehr gefüllt, violettpurpur.

Unique de Mauget, Blumen mittelgroß, voll, violettroth, weiß gerändert und weiß gestreift.

Virginie Lébon, Blumen groß, voll, rein weiß, schalenförmig.

Viridiflora, Blumen vollständig grasgrün, ohne jede Spur einer andern Färbung, sehr voll und eigenthümlich schön gebaut, in großen reichen Dolden blühend; eine der merkwürdigsten Erscheinungen.

27. Rosa indica minima oder Lawrenceana Sweet — Rose liliputienne.

Die Lawrence- oder Liliput-Rose.

Strauch niedrig, buschig, zwergartig, der kleinste der Rosen, 15 bis 30 Centim. hoch, selten höher; Zweige zahlreich, gerade, zart, dünn, stachelig; Stacheln gerade, seltener hakenförmig, lang, zerstreut, fein, roth; Blätter klein, dunkelgrün, aus 3 bis 5 Blättchen gebildet, immergrün; Blättchen sehr klein, kaum 1,50 Centim. lang und 1 Centim. breit, eirund, scharf gespitzt, doppelt gezähnt, oben dunkelgrün, unten meistens röthlich gefärbt, nackt, fest, das Spitzblättchen größer; Nebenblätter klein; blattständig, ge-

zähnt, spitzig; meistens drüsig; Blattstiel rauh, stachelig, drüsig; Deckblätter fehlend oder sehr klein; Blumenstiel lang drüsenborstig, oft auch glatt; Kelchröhre klein, oval oder birnförmig, oft nackt und graugrün; Kelchblätter einfach, selten getheilt; Blumen sehr klein, fast geruchlos, leicht gefüllt; Blumenblätter klein, spitzig; Blüthen einzeln; Pistille 2 bis 30, gewöhnlich hervortretend, gesondert; Frucht klein, eirund oder kugelig, nackt ohne Kelchblätter, scharlachroth.

Die erste dieser interessanten Rosen wurde zu Anfang dieses Jahrhunderts aus China eingeführt. Die hierher gehörigen Varietäten zeigen unter einander keine sehr in die Augen fallende Unterschiede. Sie sind den ganzen Sommer hindurch mit einer Fülle der niedlichsten, gefüllten Blumen bedeckt. In Töpfen kultivirt gedeihen sie vorzüglich gut, eignen sich aber auch fürs Freie, zu kleinen Gruppen vereinigt, oder als Einfassungspflanzen, und bewirken daselbst einen sehr günstigen Effekt. Gegen Frost sind sie sehr empfindlich und verlangen daher einen guten Winterschutz.

Blanc de Portemer, Blumen sehr klein, leicht gefüllt, weiß.

Caprices des dames, Blumen lebhaft rosa.

Fairy, Blumen blaßroth.

Gloire des Lawrences, Blumen sehr klein, voll, lebhaft purpurn.

Jenny, Blumen schön karmoisin.

La miniature, Blumen sehr klein, voll, dunkelkarmoisinrosa.

Multiflora, Blumen rosa, sehr klein, stark gefüllt.

Nigra, Blumen sehr dunkelkarmoisin, fast schwarze Berandung.

Pompon bijou, Blumen sehr klein, gefüllt, zartrosa.

Rosea, Blumen etwas größer, schöner geformt und stärker gefüllt als bei multiflora.

28. Rosa hybrida — Rose hybride.

Die Hybride-Rose.

Eine Rosengruppe von unbekannter Abstammung, die aber jedenfalls durch Kreuzung mit R. bengalensis, bourbonica und noisettiana entstanden und den Uebergang von den Sommerrosen zu den Herbstrosen zu vermitteln scheint. Auch sie bildet einen Glanzpunkt unserer Gärten, indem sie reich ist an überaus prächtigen, zarten, hellen und dunkeln Färbungen. Dabei sind die zu dieser Gruppe gehörigen Rosen hart, kräftig, oft von starkem Wuchse und bisweilen fast kletternd, daher zu allem zu gebrauchen, was man aus ihnen machen will. Zum größten Theil eignen sie sich gut zur Buschform, sowie zu Hoch- und Mittelstämmen; andere vorzugsweise

zur Ueberkleidung von Mauern und Kolonnaden. Einige empfehlen sich zur Topfkultur und sind daher doppelt werthvoll. Nur wenige vertragen den kurzen Schnitt, meistens wollen sie lang oder selbst gar nicht beschnitten sein.

Adolphe, leuchtend lilarosa, Blumen mittelgroß, in großen reichen Dolden stehend.

Blairii, Rose von Blair, Blumen sehr groß, gefüllt, sehr schön karminfarben; Wuchs ungemein kräftig; das Laub sehr schön und fest; verträgt nur einen sehr mäßigen Schnitt. Empfiehlt sich besonders zur Bedeckung einer ausgedehnteren Wandfläche.

Bouquet de Marie, (Noisette-Hybride), Blumen weiß, mit leisem grünlichen Anflug, schön gebaut, in Büscheln stehend. Zur Pyramiden- und Säulenform geeignet.

Brennus, (Bengal-Hybride), Blumen groß und voll, schalenförmig, lebhaft scharlachkarmoisin, sehr imponirend; Wuchs kräftig. Wie die vorhergehende zu verwenden.

Carmin brillant, Blumen rosa karmin.

Charles Duval, (Bourbon-Hybride), Blume groß und voll, schalenförmig, blaßroth; von raschem Wuchse; schön belaubt. Eignet sich zur Säulenform und ist auch zur Topfkultur und zum Treiben zu verwenden.

Charles Lawson, Blumen lebhaft rosenroth, groß, gefüllt, sehr effektvoll, mit festen Blumenblättern; von raschem Wuchse. Eignet sich gleich gut zur Buschform als zur Ueberkleidung von Wänden, sowie auch zur Topfkultur.

Chênedollé, (Bengal-Hybride), Blumen hellkochenillenfarbig, sehr groß, voll, schalenförmig; Wuchs sehr kräftig; Triebe sehr stachelig; reich Samen tragend. Ist von Werth für die Topfkultur, aber nicht weniger zur Wand- und Säulenrose geeignet, sowie zur Buschform als Einzelpflanze und zur Bildung von Gruppen; ist überhaupt eine der reizendsten Rosen.

Coupe de Hébé, (Bourbon-Hybride), Blumen hochrosa, groß, sehr gefüllt, mit festen Blumenblätter, von regelmäßiger Schalenform; Wuchs kräftig; Blattwerk schön; ist wohl die vorzüglichste in dieser Gruppe und fast ohne Gleichen in den übrigen. Wie die beiden vorhergehenden, so paßt auch diese für alle möglichen Formen und Kulturweisen, für Buschform, oder auf Hochstamm veredelt zur Kugel- und Pyramidenform, zur Bekleidung von Wänden, zur Säulenform und dergleichen mehr, und eignet sich auch zur Topfkultur und zum Treiben. Sie verlangt einen etwas kurzen Schnitt.

De Candolle, Blumen sammetig blauviolett, purpur mit Scharlachschimmer.

Frédéric II., Blumen purpurviolett, groß, gefüllt; Habitus äſtig; Wuchs kräftig. Eine brillante und imponirende Roſe, welche ſich zur Bildung von Pyramiden und Säulen ſehr gut eignet.

Général Jacqueminot,*) (Bengal-Hybride), Blumen groß und voll, von herrlichem Bau, hochpurpurn, brillant karmoiſin ſchattirt. Iſt von beſonders ſchöner Wirkung als Säulenroſe.

Général Lamarque, Blumen dunkelpurpur mit violett; eine der ſchönſten dunkeln Roſen.

Juno, (Bengal-Hybride), Blumen ſehr groß, voll von ſchönem Karminroſa; reichblühend; hat in ihrem Habitus Manches von der Rosa alba; kann ziemlich kurz geſchnitten werden. Entwickelt ſich beſonders ſchön als Topfroſe, was ſie doppelt werthvoll macht, da ſie nur in ſüdlichen Gegenden, die ſich einer beſtändig ſchönen Witterung erfreuen, im freien Lande gut gedeiht; in nördlicheren Gegenden dagegen, wo die Witterung weniger beſtändig iſt, werden ihre ſchönen Blumen vom Winde und Regen bald zerſtört.

Lady Hamilton, Blumen prächtig blauviolett, ſehr groß, voll und ſchön gebaut; eine prachtvolle Roſe.

Las Casas, (Bengal-Hybride), Blumen leuchtend karmin, mit Karmoiſinpurpur ſchattirt, brillant beim Aufblühen, mittelgroß, ſehr gefüllt, von Schalenform; ſehr reichblühend und imponirend; Wuchs kräftig, hängend; Triebe ſchlank. Sehr geeignet zur Säulenroſe, ſowie zur Trauerroſe.

Madame Plantier, (Noiſette-Hybride), Blumen rein weiß mit gelblichem Schimmer, mittelgroß, voll, kompakt, in Büſcheln vereinigt; ſehr reich und lange blühend; faſt ſtachellos; Blätter hellgrün; Habitus äſtig und Wuchs kräftig; Triebe ſchlank. Entfaltet ihre ganze Schönheit, wenn ſie in landſchaftlichen Gärten gruppenweiſe gepflanzt iſt; eignet ſich aber auch ſowohl als Einzelpflanze in Buſchform, ſowie zur Säulen- und Pyramidenform und macht ſich auch auf Hochſtamm ſehr gut.

Madeleine, (Noiſette-Hybride), Blumen groß und ſehr gefüllt, gelblich weiß oder zuweilen blaßfleiſchfarben, gewöhnlich karmoiſin eingefaßt. Eignet ſich zur Säulenform.

Malton, auch fulgens genannt, (Bengal-Hybride), Blumen feurigkarmoiſin, mittelgroß, gefüllt, ſchalenförmig; Habitus äſtig; Wuchs kräftig; Blattwerk dunkel und glänzend; verlangt wenig geſchnitten zu werden. Eine an Bau und Färbung wahre Prachtroſe, aber etwas empfind-

*) Nicht zu verwechſeln mit der Remontantenroſe Général Jacqueminot.

lich, verlangt daher einen Winterschutz. Eignet sich zur Säulen- und Pyramidenform, sowie zur Trauerrose.

Paul Perras, (Bourbon-Hybride), Blumen groß, gefüllt, prachtvoll blaßrosa, von kompakter Form; Wuchs kräftig; reich Samen tragend. Eignet sich sowohl zur Topfkultur als zur Säulenrose, gelangt aber bei ersterer Kulturweise zu einer höheren Vollkommenheit als bei einer andern.

Paul Ricault, (Bengal-Hybride), Blumen lebhaft karmoisinroth, groß, gefüllt, von herrlichem Bau, mit festen Blumenblättern; Wuchs kräftig. Eignet sich sehr gut zur Topfkultur und zum Treiben, gedeiht aber nicht minder im Lande in wurzelächter und hochstämmiger Form und ist auch zur Bildung von Pyramiden und Säulen gut zu verwenden. Liebt etwas kurzen Schnitt.

Perfection, Blumen mittelgroß, aber vollkommen schön gebaut, ihre Färbung erinnert an das dunkele Purpurkolorit der Pfirsiche; Wuchs kräftig. Eignet sich zur Säulenrose und auch zur Topfkultur.

Robin Hood, Blumen leuchtend karminroth, dicht gefüllt und schön gebaut; Wuchs kräftig. Wie die vorige zu verwenden.

Vivid, (Bengal-Hybride), Blumen lilaroth mit schwärzlich-sammetpurpurnem Centrum, groß, voll. Obwohl eine alte Rose, ist sie doch nur von wenigen neueren Rosen erreicht, so daß keine andere Rose als Hochstamm einen größeren Effekt hervorbringt. Diese Rose will nur sehr wenig geschnitten sein.

Eine Auswahl der schönsten Rosen zu verschiedenen Zwecken.

Um dem angehenden Rosenfreunde noch eine engere Auswahl der werthvollsten Rosen zu geben, so sollen nachstehend aus den „Herbstrosen" (Remontante-, Bourbon-, Noisette-, Thee- und Bengalrosen) eine Anzahl derjenigen Sorten angeführt werden, welche in Bezug auf kräftiges Wachsthum, einen gefälligen Habitus, Haltung, Form, Füllung und Wohlgeruch der Blumen, sowie gutes Remontiren nichts zu wünschen übrig lassen.

Remontirende Hybriden*): Abel Grand, † Alfred Colomb, † Alfred de Rougemont, Auguste Mie, Auguste Neumann, † Camille Bernardin, † Cardinal Patrizzi, † Charles Lée, † Charles Lefebvre, † Charles Margottin, Charles Verdier, Christian Püttner, † Comte de Cavour, Comtesse de Cécile de Chabrillan, Comtesse d'Oxford, † Doc-

*) Die mit † bezeichneten sind Effektrosen.

teur Andry, Duc de Harcourt, † Duc Decazes, Édouard Morren, † Eugène Appert, Eugène Scribe, † Exposition de Brie-Comte-Robert, † Fisher Holmes, Gloire de Ducher, Impératrice Eugénie, † Jean Lambert, John Hopper, † John Keynes, Jules Chrétien, Jules Margottin, La France, † Laurentius, Le Rhône, † Lord Raglan, † Louis van Houtte, Louise Darzens, Madame André Leroy, Madame Boll, † Madame Bouttin, Madame Derreulx Douvillé, † Madame Furtado, Madame Rolland, † Madame Victor Verdier, Mademoiselle Adèle Launay, Mademoiselle Bonnaire, † Maréchal Vaillant, † Marie Baumann, † Maurice Bernardin, † Monte Christo, Olivier Delhomme, Paul Néron, Pavillon de Prègny, † Pierre Notting, † Prince Camille de Rohan, Prince Léon Kotschubey, Princesse Clotilde, † Professor Koch, † Sénateur Vaisse, † Souvenir de Charles Montault, † Souvenir de William Wood, Thyra Hammerich, Triomphe d'Angers, † Triomphe de Caen, † Van Houtte.

Bourbonrosen: Apolline, Baron Gonella, Baronne de Noirmont, Catherine Guillot, Céline Gonod, Docteur Leprêtre, Duchesse de Thuringe, Émotion, Joseph Gourdon, Jules César, Louise Margottin, Louise Odier, Madame Charles Baltet, Mistress Bosanquet, Oeillet flambant, Reine de Castille, Souvenir de Malmaison, Souvenir de l'exposition de Londres.

Theerosen: Adam, Auguste Vacher, Bougère, Comtesse de Brossard, Devoniensis, Gloire de Dijon, Homère, Madame Bravy, Madame Falcot, Madame Margottin, Sombreuil, Sylphide, Triomphe de Bollwiller, Vicomtesse Decazes.

Noisetterosen! Aimée Vibert, Beauty of Greenmont, Caroline Marniesse, Céline Forestier, Isabelle d'Orléans, Le Pactole, Madame Deslongchamps, Margarita, Ophire, Solfatare, Triomphe de Rennes, Zilia Pradel.

Bengalrosen: Camélia panachée, Centifolia, Cramoisi supérieur, Ducher, Lucullus, Marjolaine de Luxembourg.

Für den Gartenfreund, welcher die Rosenkultur aufzunehmen die Absicht hat und mit dem blumistischen Werthe der großen Anzahl von Rosen wenig oder gar nicht bekannt ist, empfiehlt sich das nachstehende kleine Sortiment, worin die hauptsächlichsten Farben und Nüancen sich repräsentirt finden.

1) Aimée Vibert, Noisetterose, rein weiß.

2) Gloire de Dijon, Theerose, lachsfarbig gelb.

3) Souvenir de Malmaison, Bourbonroſe, fleiſchfarben.
4) Auguste Mie, remontirende Hybride, blaßroſa.
5) Louise Odier, Bourbonroſe, roſa.
6) Sénateur Vaisse, remontirende Hybride, dunkelkarmoiſin.
7) Marie Baumann, remontirende Hybride, leuchtend feuerroth.
8) Prince Camille de Rohan, remontirende Hybride, dunkelkarmoiſinbraun.
9) Souvenir de la Reine d'Angleterre, remontirende Hybride, dunkelroſa.
10) François Lacharme, remontirende Hybride, karmoiſin.
11) Prince Léon Kotshubey, remontirende Hybride, feurig kirſchrothkarmin.
12) Impératrice Eugénie, remontirende Hybride, weiß mit roſa Centrum, im Verblühen weiß.

Zur Treibkultur empfehlen ſich folgende Sorten: Auguste Mie, Claude Million, Eugène Appert, Géant des batailles, François Lacharme, Général Jacqueminot, Général Washington, Jean Touvais, Jules Margottin, La reine, Louise d'Autriche, Madame Boll, Madame Furtado, Madame Standish, Mademoiselle Adèle Launay, Victor Verdier, Marie Libaud, Monte Christo, Alexandre Dumas, Paeonia, Sénateur Vaisse, Baronne Prévost, Souvenir de Comte de Cavour (Margottin), Louise Odier, (Bourbon), Souvenir de la reine d'Angleterre, Rouge marbré, Marie Baumann und Pavillon de Prègny, Mistress Bosanquet, (Pauline Bonaparte), (Bourbon), Gloire de Dijon, (Thee), Souvenir de Malmaison, (Bourbon).

Anhang.

Bezeichnung der Rosen.

Zur Bezeichnung der im freien Lande und in Töpfen stehenden Rosen bedient man sich verschiedener Arten sogenannter Etiquetten: von Holz, Porzellan, Zink, Schiefer, Papier mit Glas, Bleistreifen, und richtet sie entweder zum Anbinden an die Pflanze — besser an den dabei gesteckten Pfahl oder Stab — oder zum Dabeistecken in die Erde ein. Auf diese Etiquetten schreibt man entweder den vollen Namen der Rose, nebst Angabe der Gruppe, zu welcher sie gehört, oder blos die Nummer, unter der man sie in seinem Register, wo der volle Name, die Gruppe, zu welcher sie gehört, Charakteristik und sonstige Eigenschaften ꝛc. aufgezeichnet sind, führt. Beide Arten der Bezeichnung haben ihre Vorzüge und ihre Nachtheile. Will man den Namen einer Rose wissen, so ist es jedenfalls angenehm, ihn sogleich an der Pflanze lesen zu können. Hat man aber viele Rosen zu etiquettiren, besonders wenn man starke Vermehrungen zu machen hat, wo jedes Exemplar bezeichnet werden muß, so ist es weniger zeitraubend, wenn man sie blos mit den Nummern des Registers bezeichnet. Außerdem giebt man den Nummern noch in dem Falle den Vorzug, wenn die Pflanzen dem Diebstahl ausgesetzt sind, indem sie ohne Namen meistens weniger Werth für dergleichen ungebetene Gäste haben und daher vor ihnen sicherer sind.

Die sogenannten Anhängehölzer*) werden in der Regel aus Fichtenholz gearbeitet, etwa 9 Centim. lang, 3 Centim. breit und von entsprechender

*) Derartige Hölzer, (Etiquetten), sowie auch sogenannte Steckhölzer in verschiedenen Größen, Blumenstäbe, Rosenpfähle ꝛc. werden von armen Bewohnern des Thüringer Waldes sehr sauber in großen Massen zu äußerst billigen Preisen angefertigt und nehme ich Bestellungen darauf entgegen.

Stärke. An dem einen Ende wird ein Loch durchgebohrt, oder eine Kimme eingeschnitten, um ein Stück Bindfaden (welcher, wenn er längere Zeit halten soll, erst mit Firniß oder Oel getränkt werden muß), einen dünnen Lederstreifen, einen Kupferdraht, gut geglühten Eisen- oder Messingdraht, galvanisirten Eisendraht, oder Bleidraht daran befestigen zu können. Nachdem man mit gutem schwarzem Bleistift auf der frisch mit weißer oder gelber Oelfarbe ganz dünn überstrichenen Fläche den Namen der Rose, die Gruppe, zu der sie gehört, und die Nummer des Verzeichnisses, (oder blos letztere), aufgeschrieben hat, befestigt man es an der Pflanze oder dem dabeigesteckten Pfahl. Mit Bleistift Geschriebenes verlöscht jedoch nach kürzerer oder längerer Zeit, es sei denn, daß die Schrift mit einem durchsichtigen Lack überzogen werde. Man bedient sich daher in neuerer Zeit lieber der „Dr. Gräf'schen unauslöschlichen Etiquetten-Tinte," oder der vom Apotheker A. Lucas in Erfurt hergestellten neuen Etiquetten-Tinte, letztere sowohl in Schwarz als Violett und Roth. Man erhält in einem Blechkästchen mit 4 Fächern 1 Glas schwarze und 1 Glas rothe Tinte, 1 Glas Eisenlack und 1 Glas Terpentinöl. Letzteres dient zur Verdünnung des Eisenlacks, der zum Ueberziehen von gewöhnlichen und auch größeren Etiquetten sich ganz besonders eignet. Das Blechkästchen mit dem Inhalte und einigen zum Beschreiben der Etiquetten besonders passenden Stahlfedern und Pinselchen zum Eisenlack kostet 1 Thlr.*). Man kann auch die Hölzer, nachdem sie mit der Etiquetten-Tinte beschrieben und die Schrift einen Tag getrocknet ist, mit einer Spur gewöhnlichen Leinölfirnisses bestreichen und dann wieder zum Trocknen hinlegen, und zwar diesmal an der Luft.

Bei weitem dauerhafter und eleganter sind durchbohrte, etwa 3 bis 5 Quadratcentim. große Porzellantäfelchen von runder, ovaler oder viereckiger Form, auf denen in der Fabrik die Nummern des Verzeichnisses oder auch die ganzen Namen eingebrannt werden. Solche Etiquetten sind der Verwitterung nicht ausgesetzt und können leicht vom Schmutz gereinigt werden.

Sehr dauerhafte Etiquetten geben auch Zinkplatten, welche aber, ehe man darauf schreibt, 2 bis 3 Wochen einer feuchten Luft ausgesetzt

---

*) Bestellungen hierauf, sowie auf die auf der nächsten Seite angeführte Metz-Kober'sche Schlagnummerpresse nehme ich ebenfalls an und erlasse die Gräf'sche Tinte à Flacon nebst Gebrauchsanweisung zu 10 Sgr., 12 do. zu 3 Thlr 10 Sgr. und die Lucas'sche das Gläschen zu 5 Sgr., 10 Gläschen zu 1½ Thlr.

werden müssen, damit sie oxydiren. Sobald dieses geschehen, werden sie durch eine Mischung von 2 Theilen Salzsäure und 1 Theil Wasser gereinigt, dann trägt man die Schrift vermittelst eines Gänsekieles oder einer geeigneten Stahlfeder auf. Man bedient sich hierzu einer chemischen Tinte aus 33 Grm. krystallisirten Grünspans, 33 Grm. klar gestoßenen Salmiaks, 16½ Grm. geglühten Kienrußes und 333 Grm. destillirten Wassers. Die Schrift wird bald in tiefster Schwärze hervortreten und den Einflüssen der Witterung Jahre lang widerstehen; um aber die Haltbarkeit noch zu erhöhen, überzieht man die Platten mit Bernsteinlack. Man kann aber auch die Zinkplatten mit Oelfarbe bestreichen und darauf mit der Dr. Gräf'schen oder Lucas'schen Tinte schreiben.

Will man Täfelchen von Schiefer zu Etiquetten benutzen, so sind sie vor dem Beschreiben mit weißer Oelfarbe zu bestreichen. Nachdem diese trocken geworden ist, schreibt man darauf mit schwarzer Oelfarbe, indem man sich dazu eines feinen Malerpinselchens aus Dachshaaren bedient. Sie können aber eben so gut auch mit der Dr. Gräf'schen oder Lucas'schen Tinte beschrieben werden. Nachdem die Schrift trocken geworden ist, werden sie mit weißem Damarlack überzogen.

Etiquetten von großer Dauerhaftigkeit stellt man auch dadurch her, daß man die Namen auf ein Stück starkes Schreibpapier schön schreibt oder druckt, dieses mit Stärkekleister, flüssigem Gummi, (Dextrinlösung), Leim oder einer Auflösung von arabischem Gummi so auf einen Streifen dicken Glases klebt, daß das Glas die Schrift bedeckt. Die Rückseite des Papiers wird dann mit Asphalt, oder irgend einem anderen Firniß oder selbst nur mit Oelfarbe bestrichen, und nach dem Trocknen dieses Ueberzuges ist die Etiquette fertig, welche nun mittelst eines dünnen Messingdrahtes an Ort und Stelle befestigt wird.

Etiquetten, welche in die Erde gesteckt werden sollen, müssen auf einer Seite zugespitzt sein. Zum Gebrauch für in Töpfen stehende Rosen ist eine Länge von 13 bis 18 Centim. und eine Breite von 2 bis 4 Centim. hinreichend, für kleine Stecklingspflanzen schon 10 Centim. Länge. Dagegen nimmt man sie fürs Land von 25 bis 30 Centim. Länge und 5 bis 7 Centim. Breite. Bei hölzernen Etiquetten, wozu man sich im Freien, (besonders in Rosenschulen), auch 63 Centim. langer, oben breit geschnitzter Pfähle bedient, ist der in die Erde kommende Theil mit Theer zu bestreichen oder mit Eisenvitriol zu tränken; sehr starke Etiquetten können auch etwas angekohlt werden, damit sie der Fäulniß länger widerstehen.

Der Bleistreifen bedient man sich hauptsächlich zum Einschlagen von Nummern. Die älteren Vorrichtungen, deren man sich dabei bedient, als bekannt voraussetzend, erwähne ich hier nur die von dem Rosengärtner E. Metz und dem Mechaniker Kober in Erfurt erfundene und sehr zweckmäßig konstruirte „Metz-Kober'sche Schlag-Nummerpresse". (Preis 2½ Thlr.) Zwei kleine Platten aus Gußeisen sind durch Scharniere mit einander verbunden und werden mittelst zweier Federn klaffend erhalten. In der oberen Platte sind die Ziffern erhaben in den Stahl geschnitten, auf der untern Platte sind sie nahe dem Rande in der gleichen Reihenfolge eingegraben. Die Presse stellt man vor sich auf den Tisch, legt den Bleistreifen unter die betreffende Nummer, schlägt dann auf den Griff der oberen Platte und die Nummer ist dauernd in den Bleistreifen eingegraben.

Diese Bleistreifen wickelt man um einen Ast oder den Stamm der Rose und hat sich dadurch gegen jede Verwechselung gesichert, welche durch Verlöschen, Abreißen, Abfallen und Verwechselung anderer Etiquetten so häufig stattfindet. Auch kann man sie in derselben Weise wie die Anhängeetiquetten befestigen.

Eben so wie die Nummern lassen sich vermittelst einer solchen Schlag-Nummerpresse auch die ganzen Namen auf Bleitäfelchen einschlagen, wenn statt der Ziffern die Buchstaben, welche man zu einem Namen gebraucht, in diese Platten eingefügt werden. Damit die eingeschlagenen Namen besser hervorleuchten, überzieht man sie noch mit Mennigfarbe.

Register

sämmtlicher angeführter Rosen.

	Seite
Abbé Bramerel	160
Abbé de l'Épée	148
Abbé Giraudier	160
Abbé Mioland	227
Abd-el-Kader	160
Abel Carrière	157
Abel Grand	160. 232
A. Bouquet	219
Abraham Lincoln	160
Achille Gonod	160
Acidalie	209
A cinq couleurs	227
Adam	213. 219
Adélaïde d'Orléans	205
Adèle Maugé	160
Adèle Prévost	192
Adeline Patti	160
Adolphe	230
Adolphe Brongniart	160
Adrien Marx	160
Adrienne Christophle	219
Adrienne de Montebello	160
Aetna	227
Africaine	154
Aimée Vibert	108. 215. 233
Alba (R. multiflora)	203
Alba (R. damascena var. omnium calendarum) ſ. White	
Alba carnea	160
Alba floribunda	160
Alba plena (R. Banksiae)	202
Alba plena (R. ind. odoratissima)	219
Albion	161
Alexandre Dumas	161. 234
Alexandrine Backmeteff	161
Alexandrine de Belfroy	161
Alfred Colomb	161. 232
Alfred de Damas	157
Alfred de Rougemont	161

	Seite
A long pédoncule	154
Alpaïde de Rotalier	161
Alphonse Damaizin	161
Alphonse Fontaine	161
Alphonse Karr	161
Amabilis	219
Amadis	199
Amazone	219
Amélie de la Chapelle	209
America	215
Amiral Lapeyrouse	161
André Dunant	161
André Fresnoy	161
André Leroy	161
André Leroy d'Angers	161
Anemoniflora	227
Anette Seaut	219
Anna Alexieff	161
Anna Diesbach	162
Anna Maria	204
Anna Olivier	219
Anne de Melun	148
Annie Laxton	162
Anthérose	219
Antoine Alléon	162
Antoine Ducher	162
Apolline	209. 233
Archevêque de Paris	162
Archiduc Charles	227
Archimède	219
Ardoisée du Chalet	162
Aristide Dupuis	162
Aristides	154
Armide	162
Arthur Sansal	162
Aspasia	162
Atrolutea plenissima	202

	Seite
August Rigotard	162
Auguste Mie	162. 232. 234
Auguste Neumann	162. 232
Auguste Vacher	219. 233
Aurora (R. pimpinellifolia)	144
Aurore (R. bif. hybr.)	162
Aurore du matin	162
Baptiste Desportes	163
Baron Adolphe de Rothschild	163
Baron de Rothschild	163
Baron de Wassenaër	154
Baron Gonella	209. 233
Baron Hausmann	163
Baron Lassus de St. Geniez	163
Baronne de Maynard	163
Baronne de Hallez Claparède	163
Baronne de Noirmont	209. 233
Baronne Louise Oxkul	163
Baronne Prévost	108. 113. 163. 234
Béatrix	163
Beauté française	163
Beauty of Green mont	215. 233
Beauty of the prairies	204
Beauty of Waltham	163
Belle cuivrée	219
Belle de Baltimore	204
Belle de Lille	199
Belle des jardins	192
Belle fleur d'Anjou	219
Belle Lyonnaise	220
Belle Mâconnaise	220
Belle Marie	220
Belle Normande	163
Belle rose	163
Bernadotte	209
Bernard	148

	Seite
Bernard Palissy	163
Berthe Baron	163
Bessie Johnson	163
Bicolor (R. lutea)	150
Blairii	230
Blanc de Portemer	229
Blanche de Bath	154
Blanche de Méru	164
Blanche double	144
Blanche du roi ſ. Céline Dubos.	
Blanche fleur	192
Blanche Lafite, Lafitte ou Laffitte	209
Blanche Simon	155
Blanche virginale ſ. Blanche de Bath.	
Blush	144
Blush Boursault	199
Bougère	220. 233
Boule de Nanteuil	192
Boule de neige	164
Bouquet de Marie	164. 230
Bouquet d'or	215
Boursier de la Rivière	155
Bouton d'or	220
Brennus	230
Bürgermeister Carl Müller	164
Bullata	152
Camélie panachée	227. 233
Camille Bernardin	164. 232
Canari	220
Candide	164
Captain John Ingram	155
Capitain Lamure	164
Capitain Paul	164
Caprices des dames	229
Cardinal Patrizzi	164. 232
Carl Capelle	164
Carl Coërs	164
Carmin brillant	230
Carmin velouté	203
Carnea	208
Carnea grandiflora	206
Carnea plena	194
Caroline Marniesse	215. 233
Caroline Sansal	164
Catherine Guillot	209. 233
Celestial (R. alba)	195
Celestial (R. rubiginosa)	198
Celina	155
Céline Briont	147
Céline Dubos	148
Céline Forestier	215. 233
Céline Gonod	210. 233
Cels multiflora	227
Centifolia (R. pimpinellifolia)	144
Centifolia (R. semperfl.)	227. 233
Centimane	144
Césonie	157
Charles Duval	230
Charles Fontaine	164
Charles Lawson	230
Charles Lée	164. 232
Charles Lefebvre	164. 232
Charles Margottin	165. 232
Charles Rouillard	165
Charles Turner	165
Charles Verdier	165. 232
Charles Wood	165
Château Brussow	165
Chênedollé	230

	Seite
Chinensis	198
Christian Püttner	165. 232
Chromatella	215
Citoyen de Deux Mondes	227
Clares	147
Claude Levet	165
Claude Million	165. 234
Clémence Robert	157
Cloth of gold ſ. Chromatella.	
Clotilde	220
Colonel de Rougemont	165
Colonel Lory	148
Comble de gloire	227
Comices de Tarn-et-Garonne	210
Communis (R. centifolia)	152
Communis (R. centifolia muscosa)	155
Comte Alphonse de Serényi	165
Comte Bobrinsky	165
Comte de Cavour	165. 232
Comte d'Eldon ſ. Earl of Eldon.	
Comte de Nanteuil (R. hybrida bifera)	165
Comte de Nanteuil (R. gallica) ſ. Boule de Nanteuil.	
Comte de Paris	220
Comte de Raimbaud	165
Comte de Ribeaucourt	165
Comte Litta	166
Comtesse Cécile de Chabrillan	166. 232
Comtesse de Barbantane	210
Comtesse de Brossard	220. 233
Comtesse de Jaucourt	166
Comtesse de Labarthe	220
Comtesse de Murinais	155
Comtesse de Nadaillac	220
Comtesse de Ouwaroff	220
Comtesse de Ségur	152
Comtesse de Vallier	166
Comtesse de Woronzow	220
Comtesse d'Oxford	166. 232
Coquette de Lyon	220
Coquette des Alpes	166
Coquette des blanches	166
Coradori Allan	204
Cornélie	216
Coupe de Hébé	230
Couronne des pourpres	227
Cramoisi ſ. Violet cramoisi.	
Cramoisi supérieur	108. 113. 227. 233
Crimson (R. Damascena var. omnium calendarum)	147
Crimson ſ. Amadis.	
Crimson superbe ſ. Mogador.	
Cristata	152
Curé de Charantay	166
Cynthie	192
David Pradel	220
De Candolle (R. hybr.)	230
De Candolle (R. burb.)	210
Déesse de Flore	146
De la Grifferaye	203
Denis Hélye	166
Deuil du Prince Albert	166
Devienne Lami	166
Devoniensis	220. 233
Didon	147
Docteur Andry	166. 232
Docteur Guépin	166

	Seite
Docteur Henon	166
Docteur Leprêtre	210. 233
Docteur Spitzer	166
Dométille Becar	152
Dominique Daran	166
Donna Maria	206
Dorothea Krey	167
Double yellow (R. lutea)	150
Double yellow (R. pimpinellifolia) ſ. Jaune double des Anglais.	
Drummond's thornless	199
Du Luxembourg (R. indica Noisettiana)	216
Du Luxembourg (R. microphylla)	208
Du roi	108. 113. 148
Du roi strié	148
Duc Decazes	167. 233
Duc de Crillon	210
Duc de Harcourt	167. 233
Duc de Magenta	220
Duc de Rohan	167
Duc de Wellington	167
Ducher	227. 233
Duchesse d'Aoste	167
Duchesse de Cambacérès	167
Duchesse de Caylus	167
Duchesse de Magenta	167
Duchesse de Medina-Celi	167
Duchesse de Montpensier	167
Duchesse de Morny	167
Duchesse de Norfolk	167
Duchesse de Sutherland	167
Duchesse de Thuringe	210. 233
Duchesse d'Orléans	168
Duhamel du Monceau	168
Dundee Rambler	194
Dupetit Thouars	210
Dupuy Jamin	168
Earl of Eldon	216
Édith de Murat	210
Édouard Desfossés	210
Édouard Morren	168. 233
Élégance (R. alpina)	199
Élégance (R. rubifol.)	204
Élie Morel	168
Élisa Boelle	168
Élisabeth Vigneron	168
Élise Flory	227
Élise Lemaire	210
Élise Sauvage	220
Émilie Hausbourg	168
Émotion	210. 233
Empereur du Maroc	83. 168
Empereur du Mexique	168
Empereur Napoléon III.	83. 168
Enfant de France	168
Enfant de Lyon	221
Eremit	227
Ernest Boncenne	168
Esmeralda	168
Estelle	145
Eudoxie (R. Damasc.)	146
Eudoxie (R. ind. Noiset.)	216
Eugène Appert	168. 233. 234
Eugène de Beauharnais	227
Eugène de Savoye	157
Eugène Scribe	169. 233
Eugène Verdier	169
Eugène Verdier (R. centif. musc.)	155

Seite

Eugénie Desgâges 221
Eugénie Guinoisseau . . . 157
Eugénie Hardy 227
Eurydice 148
Eva Corinna 204
Exposition de Brie-Comte-Robert 169. 233
Exposition du Havre . . 169

Fabvier 227
Fairy 229
Fanny Petzold 169
Félicien David 169
Félicité Parmentier . . . 195
Félicité perpétuelle . . . 206
Félix Généro 169
Fellenberg 216
Feu brillant 169
Fille du printemps . . . 169
Fisher Holmes . . 169. 233
Florida ſ. Blush Boursault.
Fornarina 157
Forster 169
Fortun's double yellow . . 216
François Arago 169
François Fontaine . . . 169
François Lacharme . 169. 234
François Louvat 169
François I. 170
François Treyve 170
Frédéric Bihorel 170
Frédéric II. 231
Frères Soupert et Notting . 221
Fulgens ſ. Malton.

Gabrielle d'Estrées 195
Géant des batailles 108. 170. 234

Seite

Général Baral 170
Général Championnet . . 170
Général de la Martinière . 170
Général de Hautpoult . . 170
Général Drouot 157
Général Forey 170
Général Grant 170
Général Jacqueminot (R. hybrida) 230
Général Jacqueminot (R. hybrida remontante) 83. 108. 113. 170. 234
Général Lamarque . . . 230
Général Mirandol 170
Général Pélissier 170
Général Simpson 170
Général Washington . 170. 234
Génie de Chateaubriand . . 171
George Paul 171
George Prince 171
George Simon 171
George Vibert 192
Gerbe des roses 171
Globe yellow 150
Gloire de Dijon 108. 113. 221. 233. 234
Gloire de Ducher . . 171. 233
Gloire de France 171
Gloire de Monplaisir . . . 171
Gloire de Rosomène . . . 227
Gloire d'orient 157
Gloire de Santenay . . . 171
Gloire des amateurs . . . 171
Gloire des Lawrences . . 229
Gloire des mousseuses . . 155
Gracieuse (R. centifol. muscosa) 155

	Seite
Gracieuse (R. pimpinellifol.)	144
Gracilis (R. alpina) . . .	199
Gracilis (R. centif. muscosa)	155
Grand Capitain	171
Grandiflora (R. pimpinellifol.)	144
Grandiflora (R. microphylla)	208
Grandissima	192
Graulhié	203
Guilletta	210
Gustave Persin	171
Gustave Rousseau . . .	171
Harrisoni	150
H. Laurentius . . . 171.	233
Héliogabale	171
Henri Bernet	221
Henri Ledechaux	171
Henri Pajes	172
Hermosa	210
Hippolyte Flandrin . . .	172
Hippolyte Jamin	172
Homère . . . . . 221.	233
Horace Vernet	172
Hortense Vernet	157
Hortensia	221
Hyménée	221
Impératrice Charlotte . .	172
Impératrice Eugénie (R. centifol. muscosa bifera) . .	158
Impératrice Eugénie (R. bifera hybrida) 172. 233.	234
Impératrice Eugénie (R. ind. semperflorens	228
Impératrice Marie Alexandrine	172
Incarnate de la chine ſ. Fortune's double yellow.	
Isabella Gray	221
Isabelle d'Orléans . . 216.	233
Jacob Pereire	172
Jacob von Baden	195
Jacques Lafite, Lafitte ou Laffitte	172
Jacques Plantiers (R. bifera hybrida)	172
Jacques Plantier	228
James Dickson	172
James Veitch	158
Jäune d'or	221
Jaune double	151
Jaune double des Anglais .	144
Jean Baptiste Guillot . .	172
Jean Bodin	156
Jean Desprez . . . 59.	216
Jean Goujon	172
Jean Lambert . . . 172.	233
Jean Pernet	221
Jean Touvais . . . 172.	234
Jeanne Gros	172
Jeanne Sury	172
Jenny	229
Joasine Hanet	148
John Grier	173
John Hopper . . . 173.	233
John Keynes . . . 173.	233
John Laing	173
John Nesmith	173
Joseph Gourdon . . 210.	233
Joseph Fiala	173
Joséphine	156
Joséphine Antoinette . .	148
Joséphine de Beauharnais .	173
Joséphine Robert	148
Jules Calot	173

	Seite
Jules César	210. 233
Jules Chrétien	173. 233
Jules Lavay	173
Jules Margottin	108. 113. 173. 233. 234
Julie de Fontenelle	211
Julie d'Étange	147
Julie de Krudner	149
Julie Touvais	173
Julie Treyve	173
Juliette Halfen	173
Juno	231
Jupiter	211
Kings Acre	174
Koenigin von Daenemark	195
La belle distinguée ſ. Scarlet. (R. rubiginosa.)	
La boule d'or	221
La brillante	174
Lady Emilie Peel	211
Lady Hamilton	231
Lady Milton	221
Lady Stuart	152
Lady Warander	221
Laetitia la volupté	192
La Favorite	174
La fontaine	174
La Fraîcheur	228
La France	174. 233
Lamarque	59. 108. 216
Lamarque à fleurs jaunes	216
La miniature	229
La Motte Sanguin	174
La négresse	146
La Phocéenne	174
Lanei	156
La Quintinie	211
La reine	108. 174. 234
La reine de la pape	174
La reine de l'île Bourbon	211
Las Casas	231
La Séduisante	196
Latour d'Auvergne	192
La tour de Crouy	174
La tulipe	221
Laure Davoust	203
Laurent Descourt	174
Laurette	222
Lauriol de Barny	174
La ville de Bruxelles	146
La ville de St. Denis	174
Léda	146
Le florifère (R. indica burbonica)	211
Le florifère (R. ind. odoratissima)	222
Le gras St. Germain ſ. Madame Legras.	
Le lion des combats	174
Le météore	174
Le Mont Blanc	222
Léontine de Laporte	222
Léopold Hausbourg	174
Léopold II.	174
Léopoldine d'Orléans ſ. Adélaïde d'Orléans.	
Le Pactole	216. 233
Le premier essai	208
Le Président	222
Le Prince de Salm-Dyck	149
Le Rhône	175. 233
Le Roitelet	211

	Seite
Le Sueur	149
Lewison Gower	211
Lord Palmerston	175
Lord Raglan	175. 233
Louis Charlin	175
Louis Philippe ſ. Grandissima.	
Louis Philippe (R. ind. semperfl.)	228
Louis XIV	175
Louis van Houtte	157. 233
Louise Darzens	175. 233
Louise d'Autriche	175. 234
Louise Margottin	211. 233
Louise Odier	83. 211. 233. 234
Louise Peyronny	108. 175
Lucide duplex	207
Lucrèce	222
Lucullus	228. 233
Lutea	202
Lutea-alba plena	194
Lutea plena ſ. Double yellow (R. lutea).	
Lyonnaise	175
Mac Mahon	175
Madame Adèle Huzard	175
Madame Alfred de Rougemont	175
Madame Alice Dureau	175
Madame Ambroise Triollet	175
Madame André Leroy	175. 233
Madame Angelina	211
Madame Anne Bugnet	175
Madame Audot	196
Madame Azélie Imbert	222
Madame Baptiste Desportes	176
Madame Barillet-Deschamps	222
Madame Barriot	176
Madame Baronne de Rothschild	176
Madame Bellenden Ker	176
Madame Bellon	176
Madame Bérard	222
Madame Boll	176. 233. 234
Madame Bouttin	176. 233
Madame Bravy	222. 233
Madame Brémont	222
Madame Bréon	228
Madame Bruny	176
Madame Cadel	176
Madame Camille	222
Madame Campbel d'Islay	176
Madame Canrobert	176
Madame Céline Noirey	222
Madame Charles Baltet	211. 233
Madame Charles Crapelet	176
Madame Charles Salleron	158
Madame Charles Verdier	176
Madame Charles Wood	176
Madame Charlet	222
Madame Chaveret	222
Madame Chirrard	176
Madame Clémence Joigneaux	176
Madame Clert	176
Madame Collet	177
Madame Compatier	211
Madame Cornelissen	211
Madame Creyton	177
Madame Damaizin	222
Madame d'Arblay	194
Madame Daru	222
Madame de Cambacérès	177
Madame Décour	177
Madame de la Roche Lambert	156

	Seite
Madame Denis	222
Madame Deslongchamps 216.	233
Madame de Norbonne . .	222
Madame Derreulx Douvillé 177.	233
Madame de Reynies . . .	223
Madame de Staël	158
Madame de Vatry	223
Madame Dr. Jutte . . .	223
Madame Domage	177
Madame Dubus	177
Madame Édouard Ory . .	158
Madame Elisa Jaenisch . .	177
Madame Émile Dupuy . .	223
Madame Emma Combey . .	177
Madame Eugénie Appert .	177
Madame Falcot . 108. 223.	233
Madame Farfouillon . . .	177
Madame Ferray ſ. Bernard.	
Madame Fillion	177
Madame Forcade la Roquette	212
Madame François Janin . .	223
Madame Freeman . . .	177
Madame Fresnoy	177
Madame Furtado . 177. 233.	234
Madame Gaillard	223
Madame George Paul . .	177
Madame Georges Schwartz .	177
Madame Guillot de Mont Favet	178
Madame Gustave Bonnet .	178
Madame Hardy . 108. 113.	146
Madame Hector Jacquin .	178
Madame Hersilie Ortgies .	178
Madame Hippolyte Jamin .	223
Madame Hoste	178
Madame Jacquier	178
Madame James Gros . . .	178

	Seite
Madame Julie Daran . . .	178
Madame Just Ďetrey . . .	212
Madame Knorr	178
Madame Lacharme . . .	178
Madame la Comtesse Félicie Morgès	178
Madame la générale Decaen	178
Madame Lafaye	178
Madame la Princesse Henri des Pays-Bas	178
Madame Laurent	178
Madame Lauriol de Barny .	194
Madame Legras	196
Madame Levet	223
Madame Lierval	179
Madame Livia Frege . . .	179
Madame Louis Paillet . .	179
Madame Louise Garrique .	179
Madame Luiset	212
Madame Margottin . . 223.	233
Madame Marie Cirodde . .	179
Madame Marie de Villeboisnet	179
Madame Marius Coté . .	179
Madame Martin Debessé .	179
Madame Masson	179
Madame Maurin	223
Madame Mélanie Willermotz	223
Madame Moreau (R. centif. musc. bifera)	158
Madame Moreau (R. hybr. bifera)	179
Madame Nomann	179
Madame Pauline Labonté .	223
Madame Plantier	231
Madame Platz	158
Madame Ponctuée	158

	Seite
Madame Prud'homme . .	179
Madame Puissant	179
Madame Pulliat	179
Madame Renard	179
Madame Richer	179
Madame Rivers	179
Madame Rolland (Moreau)	180. 233
Madame Rolland (Rolland) .	179
Madame Schmidt	180
Madame Schulz	216
Madame Scipion Cochet . .	180
Madame Soëtmans	146
Madame Soubeyron . . .	180
Madame Soupert	158
Madame Standish	234
Madame Trifle	223
Madame Trotter	180
Madame Victor Verdier	180. 233
Madame William Paul . .	180
Madame William Paul (R. centif. musc. bifera) . .	158
Madame Zoutmann . . .	146
Madeleine	231
Madeleine Nonin	180
Mademoiselle Adèle Launay	180
Mademoiselle Aline Pierron	212
Mademoiselle Amélie Halfen	180
Mademoiselle Anne Wood .	180
Mademoiselle Aristide . .	217
Mademoiselle Berthe Channy	180
Mademoiselle Berthe Lévêque	180
Mademoiselle Bonnaire	180. 233
Mademoiselle Cécilie Berthod	223
Mademoiselle Éléonore Grier	181
Mademoiselle Emain . . .	212
Mademoiselle Eugène Savary	181

	Seite
Mademoiselle Eugénie Verdier	181
Mademoiselle Favart . . .	212
Mademoiselle Félicité Truillot	212
Mademoiselle Fernande de la Forest	181
Mademoiselle Jeanne Marx .	181
Mademoiselle Jenny Gay .	212
Mademoiselle Julie Péréard	181
Mademoiselle Marguerite Dombrain	181
Mademoiselle Marie Cointet	181
Mademoiselle Marie Larpin	212
Mademoiselle Marie Rady .	181
Mademoiselle Polonie Bourdin	223
Mademoiselle Thérèse Coummer	181
Mademoiselle Thérèse Levet	181
Maheka	199
Maiden's blush (R. alba) .	196
Maiden's blush (R. rubiginosa)	198
Malton	231
Marcel Gramont	181
Marcella	181
Marceline Rosa	224
Maréchal Bugeaud . . .	224
Maréchal Forey	181
Maréchal Niel	224
Maréchal Suchet	181
Maréchal Vaillant . .	181. 233
Margarita	217. 233
Marguerite Bonnet	212
Marguerite de Saint-Amand	182
Marguerite Lecureux . . .	182
Maria Léonida	207

	Seite
Maria Leszinska	158
Marie Accary	217
Marie Arnaud	224
Marie Baumann	182. 233. 234
Marie Boisé	182
Marie de Blois	156
Marie Ducher	224
Marie Gonod	182
Marie Joly	212
Marie Libaud	234
Marie Sisley	224
Marjolaine du Luxembourg	228. 233
Marmorea plena	194
Maupertuis	158
Maurice Bernardin	182. 233
Mère de St. Louis	182
Merveille d'Anjou	182
Micaëla	158
Milledgeville prairies	204
Miller's Climber ſ. Rubra plena.	
Minerve	182
Minor (R. centifolia)	152
Minor (R. centifol. muscosa) ſ. gracilis.	
Miss Hovey	204
Mistress Bosanquet	108. 113. 212. 233. 234
Mistress Laing	182
Mistress Weitch	182
Modèle de perfection ſ. Céline Gonod.	
Mogador	149
Mon plaisir	224
Monsieur Barilet-Dechamps	182
Monsieur Boncenne	182
Monsieur Chaix d'Estang	182
Monsieur Cordier	182
Monsieur Furtado	224
Monsieur Journeaux	183
Monsieur Lierval	183
Monsieur Nomann	183
Monsieur Ravel	183
Monsieur Thiers	183
Mont Rosa	224
Monte Christo	183. 233. 234
Mossy	198
Multiflora (R. ind. minima)	229
Multiflora (R. ind. Noissettiana)	217
Multiflora (R. centif. muscosa)	156
Nana minor ſ. Sulphurea pumila.	
Napoléon III.	183
Nardy frères	183
Narcisse ſ. Enfant de Lyon.	
Nigra	229
Niphetos	224
Noisette jaune ſ. Jean Desprez.	
Notaire Bonnefond	183
Nuit de Young	156
Octavie Choquet	183
Oeillet fantasie	183
Oeillet flambant (R. indica borbonica)	212. 233
Oeillet flambant (R. gallica)	192
Oeillet panaché	146
Oeillet parfait	192
Olivier Delhomme	183. 233

	Seite
Omer Pacha	212
Ophire	217. 233
Oriflamme de St. Louis	183
Ornement des bosquets	194
Ornement des jardins	83
Paeonia	183. 234
Palais de cristal	183
Pallida	228
Panachée de Luxembourg	183
Panachée d'Orléans	184
Parviflora	153
Parvula	203
Paul Dupuy	184
Paul Joseph	212
Paul Néron	184. 233
Paul Perras	232
Paul Ricault	232
Paul Verdier	184
Pauline Bonaparte ſ. Mistress Bosanquet.	
Pauline Labonté	223
Pauline Lancezeur	184
Pavillon de Prègny	184. 233. 234
Paxton	212
Perfection	232
Perfection de Lyon	184
Perle blanche	184
Perle de Lyon	224
Perle des panachées	193
Perpetual	144
Perpetual Pink	205
Perpetuelle Mauget	158
Persian yellow	108. 150
Persica lutea ſ. Persian yellow.	
Peter Lawson	184
Petite Amante	212
Pholoë	217
Picturata	144
Pie IX	184
Pierre Notting	184. 233
Pierre Seletzsky	184
Pitord	184
Pline	184
Pointed Damask ſ. Léda.	
Pompon bijou	229
Pompon carné	153
Pompon de Bourgogne à fleurs blanches	153
Pompon jaune	151
Pompon perpétuelle	158
Pourpre d'Orléans	184
Praire de Terre-Noire	184
Président	205
Président Grevy	185
Président Lincoln	185
Président Mas	185
Président Porcher	185
Président Thiers	185
Président Willermotz	185
Pride of Washington	205
Prince Albert	185
Prince Camille de Rohan	185. 233. 234
Prince Chimay	213
Prince de Porcia	185
Prince Eugène	228
Prince Eugène de Beauharnais	185
Prince Henri des Pays-Bas	185
Prince Humbert	185
Prince impérial (R. hybrid. bif.)	185
Prince impérial (R. ind. burb.)	213

	Seite
Prince Léon Kotshubey	185. 233 234
Prince Napoléon	213
Prince noir	185
Princesse Adélaïde (R. muscosa)	156
Princesse Adélaïde (R. ind. odoratissima	224
Princesse Caroline	153
Princesse Clotilde	186. 233
Princesse de Joinville	186
Princesse Louise	206
Princesse Marie	206
Princesse royale	156
Professeur Duchartre	186
Professor Koch	186. 233
Prolifique f. gracilis (R. muscosa).	
Prudence Besson	186
Purple Scotch	145
Purpurea	208
Purpurine	186
Quatre saisons mousseuse blanche	159
Queen of the prairies	205
Queen Victoria	186
Rampante	206
Régulus	224
Reine blanche (R. centifol. musc.)	156
Reine blanche (R. bifera hybr.)	186
Reine de Castille	213. 233
Reine de Danemark	186
Reine de Portugal	224
Reine des beautés	186
Reine des vierges	213
Reine des violettes	186
Reine du Midi	186
Reine Mathilde	186
Reine Victoria	213
René d'Anjou	159
Requiem	149
Réveil	213
Révérend H. Dombrain	213
Rêve d'or	217
Reynold Hole	186
Richard Schmidt	186
Robin Hood	232
Rosa mundi	186
Rosea (R. Banksiae)	202
Rosea (R. ind. minima)	229
Rose de Puebla	186
Rose Fortuné	202
Rose perfection	186
Rose rouge	194
Rosine Ravaux	187
Rouge marbré	187. 234
Rubens	224
Rubra	208
Rubra plena	194
Rubra violacea f. Violet cramoisi.	
Rushton Radcliffe	187
Russeliana	203
Safrano	108. 113. 224
Safrano à fleurs rouges	225
Salet	159
Scandens f. splendens.	
Scarlet (R. rubiginosa)	198

Seite

Scarlet (R. Damasc. var. omnium calendarum) . . . 147
Scarlet Maria Léonida . . 207
Scotch perpetual 145
Sénateur Favre 187
Sénateur Vaisse . 187. 233. 234
Sidonie (R. damasc. bifera) 149. 187
Sidonie (R. hybr. bifera) . 187
Simon Oppenheim 187
Simon St. Jean 187
Smith's yellow 225
Socrate 225
Soeur des anges 187
Soeur Marthe 156
Solfatare . . . 59. 217. 233
Sombreuil 225. 233
Sophie de la Villeboinet . 187
Sophie Marsilly (R. centif. muscosa bif.). 159
Sophie Marsilly (R. alba) . 196
Souvenir d'Abraham Lincoln 187
Souvenir d'Adèle Launay . 213
Souvenir d'Adrien Bahivet . 187
Souvenir de Bellanger . . 187
Souvenir de Bordeaux . . 187
Souvenir de Caillat . . . 187
Souvenir de Charles Montault 187. 233
Souvenir de Comte de Cavour 188. 234
Souvenir de Coulommiers . 188
Souvenir de François Ponsard 188
Souvenir de Henri Clay . . 145
Souvenir de Jenny Pernet . 225
Souvenir de John Gould Weitch 188

Seite

Souvenir de Lady Cardelay 188
Souvenir de la Princesse Amélie des Pays-Bas . . . 188
Souvenir de la reine d'Angleterre 108. 188. 234
Souvenir de la reine des Belges 188
Souvenir de Lewison Gower 188
Souvenir de l'exposition de Darmstadt 188
Souvenir de l'exposition de Londres 213. 233
Souvenir d'Élise 225
Souvenir de Louis Gaudin . 213
Souvenir de Madame Charlet 213
Souvenir de Madame Hennecart 188
Souvenir de Malmaison 108. 113. 213. 233 234.
Souvenir de Monsieur Boll . 188
Souvenir de Nemours . . . 213
Souvenir de Pierre Vibert . 159
Souvenir de Président Lincoln 213
Souvenir de Romain Desprez 188
Souvenir de William Wood 189. 233.
Souvenir du baron de Rothschild 214
Souvenir du Dr. Davier . . 189
Souvenir du général Douai . 189
Souvenir d'un ami 225
Speciosa f. Princesse Caroline.
Spectabilis 206
Splendens 194
Splendid garland 194
Stanwell 145

	Seite
Striata	208
Sulphurea pumila	151
Sulphureux	225
Superbe	198
Surprice	196
Sylphide	225. 233
Thomas Methven	189
Thoresbiana	194
Thorin	189
Thyra Hammerich	189. 233
Tombeau de Napoléon	193
Tournefort	189
Tricolor	203
Tricolore de Flandre	193
Triomphante (R. rubifolia)	205
Triomphante (R. ind. semperfl.)	228
Triomphe d'Alençon	189
Triomphe d'Amiens	189
Triomphe d'Angers	189. 233
Triomphe de Bagatelle	189
Triomphe de Bollwiller	225. 233
Triomphe de Caen	189. 233
Triomphe de Gand	189
Triomphe de Gouillot fils	225
Triomphe de l'exposition	108. 113 189
Triomphe de Luxembourg	225
Triomphe de Montrouge	189
Triomphe de Paris	190
Triomphe de Rennes	217. 233
Triomphe des beaux-arts	190
Triomphe des Français	189
Triptolème	190
Unica	153
Unique (Rosa pimpinellifolia)	144
Unique (R. ind. odoratissima)	225
Unique blanche ſ. Unica.	
Unique jaune	217
Unique de Mauget	228
Unique de Provence	156
Unique panachée	153
Vainqueur de Goliath	190
Valée de Chamonix	225
Van Houtte	190. 233
Velours pourpre	190
Venusta pendula	194
Vicomte Maison	190
Vicomte Vigier	190
Vicomtesse d'Avesne	217
Vicomtesse Decazes	226. 233
Vicomtesse de Vézins	190
Victor de Bihan	190
Victor de Magenta	214
Victor Emanuel	214
Victor Pulliat	226
Victor Trouillard père	190
Victor Verdier	190. 234
Victor Verne	190
Violet cramoisi	208
Ville de Laon	190
Virginale	190
Virgilie	190
Virginalis superbissima	194
Virginie Lébon	228
Viridiflora	228
Vivid	232
Vulcain	190

	Seite
White	147
White Bath s. Blanche de Bath.	
Wilhelm Pfitzer	191
William Jesse	108. 190
William Lobb	157
William Paul	190
William Rollisson	190
Xavier Olibo	190
Yellow borde rouge	226
Yolande d'Aragon	149
Zilia Pradel	217. 233

P. P.

Die Rosen bilden einen Hauptkulturzweig meines Geschäftes und werden theils hoch- und niederstämmig, theils auf Wurzelhals von Sämlingen der Rosa canina veredelt, sowie auch wurzelächt herangezogen! Von den harten, einmal blühenden — sogenannten Sommerrosen — führe ich nur die begehrtesten Sorten; dagegen sind die meisten der in diesem Buche in den Gattungen der öfterblühenden Hybriden-, Bourbon-, Thee-, Noisette- und Bengal-Rosen aufgeführten Arten in meiner Schule vertreten. Das Verzeichniß meiner Rosensammlung, sowie der jedes Jahr im Januar erscheinende Samen- und Pflanzen-Katalog, welcher bis zum Erscheinen eines neuen Rosenverzeichnisses blos einen Nachtrag der neu hinzugekommenen Rosen, sowie etwaige Preisveränderungen enthalten wird, steht auf Verlangen franco und unentgeltlich zu Diensten. — Von Gemüse- und Blumensämereien sind bei mir alle gangbaren und der Kultur werthen Species in bester keimfähiger Qualität zu haben. — Von Gewächshaus-Pflanzen werden die zur Zimmer- und Gartenverzierung am meisten beliebten gezogen. — Ebenso sind alle Arten Gemüse und Sommerblumen, sowie zu Blattpflanzen-Gruppen passende Gewächse in kräftigen Pflanzen zur geeigneten Pflanzzeit bei mir zu haben. — Von Anfang September bis November halte ich Lager von allen Sorten holländischer Blumenzwiebeln für Töpfe und für's freie Land; desgleichen allezeit Lager von sauber geschnitzten Holzwaaren (Blumenstäbe und Pflanzen-Etiquetten) und von feinem Bindebaste aus Archangel, sowie von noch feinerem und haltbarerem aus Australien (Raphia taedigera) zum Anbinden der Pflanzen und als Bindemittel beim Veredeln. — Auch sind Rosenscheeren und alle Sorten Gartenmesser zu soliden Preisen zu jeder Zeit bei mir zu haben, resp. durch mich zu beziehen.

Langensalza in Thüringen im Juni 1873.

J. Wesselhöft,
Kunst- und Handelsgärtner.

(Langensalza ist Station an der Gotha-Leinefelder Eisenbahn.)

3 2044 102 809 993